

Question 1 : Les études cas témoins sont (Les RJ)

- b. Analytiques
- c. Observationnelles
- d. Rétrospectives

Question 2 : Dans les enquêtes analytiques prospectives (Les RJ)

a. Les sujets de l'étude sont inclus avant qu'ils ne développent la maladie

c. L'étude porte sur des Cohortes

Question 3 : On étudie l'incidence du cancer de l'œsophage en fonction d l'ancienneté du tabagisme (anciens, fumeurs actuels) chez les hommes, les résultats indiquent que 20% des anciens fumeurs développent un cancer contre 2% pour les non-fumeurs, et que 8 % des fumeurs actuels développent du cancer contre 2% pour les non-fumeurs. (Les RJ)

- d. Les anciens fumeurs ont 10 fois plus de risque de développer ce cancer que les hommes non-fumeurs.
- e. Le taux d'incidence du cancer de l'œsophage est de 8% pour les fumeurs actuels.

Question 4 : Une maladie infectieuse qui se propage à plusieurs régions du monde est appelée... (la RJ)

e. Une pandémie.

Question 5 : L'Epidémiologie Analytique :(Les RJ)

a. Confirme la relation entre les facteurs de risque et les maladies.

e. Mesure des associations épidémiologiques.

Question 6 : Dans l'essai thérapeutique, la comparabilité des groupes de patients est garantie par :(la RJ)

c. La randomisation.

Question 7: La valeur prédictive positive du test (la RJ)

c. la probabilité d'être malade lorsque le résultat du test est positif.

Question 8 : La sensibilité du test est (la RJ)

b. la proportion de vrais positifs sur le nombre total de cas

d. la capacité du test à identifier correctement les individus malades

e. un nombre compris entre 0 et 1, on l'exprime généralement en pourcentage

Question 9 : Si le taux de mortalité de la maladie coronarienne est 22.0 pour 1000 chez les hommes et de 18.6 pour 1000 chez les femmes, le risque de décéder d'une maladie coronarienne chez les hommes, par rapport aux femmes, est multiplié par : (La RJ)

ResiPharmaTM

e. 1.18

Question 10 : Si le risque relatif d'une maladie associé à un facteur est égal à 1.25, cela signifie : (La RJ)

a. qu'il y'a une augmentation de 25 % du risque de la maladie

Question 11 : lorsque l'intervalle de confiance à 95% du risque relatif contient la valeur 1, exprime que : (La RJ)

e. la relation entre le facteur de risque et la maladie n'est pas significative au risque 5%.

Question 12 : si le taux d'incidence du cancer du poumon est de 285 pour 100 000 chez les gros fumeurs et de 15 pour 100 000 chez les non-fumeurs, le risque relatif de faire un cancer du poumon chez les gros fumeurs par rapport aux non-fumeurs est de (La RJ)

c. 19

ResiPharmaTM

Question 13 : De 2020 à 2024, 500 ouvriers exposés au disulfure de carbone ont été suivis et 25 décès par infarctus du myocarde ont été enregistrés. Ces ouvriers ont été comparés à un groupe témoin de 500 travailleurs non exposés au disulfure de carbone. 5 décès par infarctus ont été constatés dans le groupe témoin, le risque relatif est de : (La RJ)

d. 5

Question 14 : Une maladie infectieuse qui se propage seulement à certaines régions du monde est appelée...

b- Une endémie

Question 15 : Un risque relatif supérieur à 1 signifie : (La RJ)

a - Que la fréquence de la maladie étudiée dans le groupe exposé est supérieure à la fréquence de cette maladie dans le groupe non exposé

Question 16 : On a évalué un nouveau test diagnostique : les résultats sont sur le tableau ci-dessous : (Les RJ)

		Test de référence		Total
		malade	non malade	
Nouveau test	positif	90	15	105
	négatif	10	85	95
	Total	100	100	200

Quelles sont les propositions justes ? (Les RJ)

d. Dans ce tableau, il y a 85 vrais négatifs
e. Dans ce tableau, il y a 90 vrais positifs
Question 17 : la sensibilité du nouveau test : (Les RJ)

b. La sensibilité s'exprime en pourcentage.
c. La capacité du test à détecter les malades
d. La sensibilité est 90/100

Question 18 : la spécificité du nouveau test (Les RJ)

c. La spécificité est 85/100

e. La capacité du test à détecter les non malades
Question 19 La valeur prédictive positive (Les RJ)

a. est la probabilité d'être malade lorsque le test est +

c. elle s'exprime en pourcentage

e. La valeur prédictive positive du test est 90/105

Question 20 La valeur prédictive négative (Les RJ)

b. est la probabilité d'être sain lorsque le test est -

e. La valeur prédictive négative du test est 85/95