

Nom et prénom : ..... date de naissance : .../.../....

(Cochez la ou les réponses justes)

### QCM

#### 1. La maladie de Parkinson :

- A. Est une maladie neurodégénérative réversible.
- B. Est une maladie neurodégénérative irréversible.
- C. Est une atteinte spécifique des neurones cholinergiques.
- D. Est une atteinte spécifique des neurones dopaminergiques.
- E. Est une atteinte spécifique des neurones cholinergiques et dopaminergiques.

#### 2. La maladie d'Alzheimer :

- A. Constitue la forme la plus fréquente de la démence.
- B. Est caractérisée parfois par une perte de conscience.
- C. Est une maladie neurodégénérative qui résulte d'une destruction sélective des neurones cholinergiques.
- D. Est une maladie neurodégénérative qui résulte d'une destruction sélective des neurones dopaminergiques.
- E. Est une maladie neurodégénérative qui résulte d'une destruction non sélective des neurones cholinergiques.

#### 3. La maladie d'Alzheimer résulte :

- A. De La formation des plaques séniles responsables de la destruction des neurones.
- B. De La formation de protéine TAU responsable de la perturbation du transport axonal et de la stabilité des microtubules
- C. De la destruction de la protéine TAU nécessaire pour la stabilité des microtubules.
- D. D'une diminution de l'acétylcholine au niveau des synapses cholinergiques.
- E. D'une diminution du calcium intracellulaire neuronale responsable de la diminution de la transmission de l'influx nerveux.

#### 4. L'anxiété:

- A. Est caractérisée par des Troubles obsessionnels-compulsifs (TOC)
- B. Est caractérisée par des troubles Psychotiques aigus ou chroniques
- C. Résulte d'une hyperactivité des neurones gabaergiques
- D. Résulte d'une hyperactivité des neurones adrénergiques
- E. Résulte d'une hyperactivité des neurones sérotoninergiques

#### 5. A propos de la conduite du traitement de l'épilepsie :

- A. Tous les antiépileptiques doivent être prescrits d'emblée à la dose maximale tolérée.
- B. En cas d'échec d'une monothérapie ; on passe directement à une bithérapie.
- C. En cas d'échec du traitement, la stimulation du nerf vague peut être exploitée.
- D. En cas d'épilepsie partielle pharmaco résistante ; la chirurgie doit être explorée.
- E. L'arrêt du traitement antiépileptique doit être progressif.

#### 6. Les médicaments suivants peuvent être responsables d'une constipation :

- A. Antidépresseurs à propriété anticholinergique
- B. Paracétamol
- C. La codéine
- D. Antalgiques opioïdiques
- E. L'amoxicilline

#### 7. A propos de la diarrhée

- A. Elle peut être d'origine virale
- B. Elle peut être d'origine médicamenteuse
- C. Le lopéramide est le traitement de choix quel que soit son origine
- D. Les diarrhées virales peuvent être traitées par un adsorbant
- E. Les diurétiques sont le traitement de choix des diarrhées infectieuses

8. Pour le traitement de l'ulcère gastroduodénal :

- A. Le traitement classique repose sur l'utilisation d'une trithérapie de 7 jours : amoxicilline + métronidazole + IPP à double dose.
- B. Le traitement séquentiel est à la base d'amoxicilline, de clarithromycine et métronidazole, associés à un IPP double dose, utilisés en association pendant 10 jours
- C. La quadrithérapie associe pendant 10 jours : 3 gélules de la spécialité PYLERA 4x/j + oméprazole à dose usuelle.
- D. Si échec au traitement séquentiel et à la quadrithérapie, une trithérapie à base d'amoxicilline, d'IPP à double dose et de lévofloxacine est proposée.
- E. La poursuite du traitement par IPP à double dose pendant 3 à 7 semaines est recommandée pour une meilleure cicatrisation.

9. Concernant la lipodystrophie chez les patients sous insuline :

- A. Il s'agit d'une diminution de la masse graisseuse seulement.
- B. Elle se manifeste suite à l'injection de l'insuline au même endroit.
- C. Elle entraîne une variation de l'absorption de l'insuline à son niveau.
- D. Elle augmente toujours l'activité de l'insuline.
- E. La fabrication de l'insuline par génie-génétique a réduit le risque de dystrophie.

10. La polychimiothérapie :

- A. L'association de plusieurs drogues cytotoxiques avec un mécanisme d'action similaire
- B. L'association de plusieurs drogues cytotoxiques avec une synergie d'action
- C. L'association de plusieurs drogues cytotoxiques avec un profil de tolérance différent
- D. Permet d'obtenir plus de réponse objective
- E. Ne permet pas d'obtenir une réponse objective

11. Parmi les critères de choix du traitement de l'asthme :

- A. Le choix du traitement de la crise d'asthme est indépendant de la sévérité de la crise.
- B. Le choix du traitement de fond de l'asthme chronique est en fonction du niveau de sa gravité.
- C. Les beta 2 mimétiques à courte durée d'action par voie inhalée sont réservés que pour le traitement de fond de l'asthme
- D. Les beta 2 mimétiques à longue durée d'action par voie inhalée ne sont réservés que pour le traitement de la crise de l'asthme
- E. Les beta 2 mimétiques à courte durée d'action par voie inhalée sont réservés pour le traitement de la crise d'asthme et beta 2 mimétiques à longue durée d'action pour le traitement de fond de l'asthme

12. Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) contre-indiqué(s) chez le nouveau-né ?

- A. Tetracyclines
- B. Fluoroquinolones
- C. Cephalosporines
- D. Phenicolés
- E. Aminosides

13. Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) peut (peuvent) entraîner une toxicité hépatique nécessitant une surveillance des transaminases ?

- A. Glycopeptides
- B. Rifampicine
- C. Fluoroquinolones
- D. Acide fusidique
- E. B-lactamines

14. Chez l'insuffisant rénal l'adaptation posologique des médicaments se fait en estimant :

- A. La créatinine sérique
- B. La glycémie
- C. La créatinine sérique durant 4 heures
- D. La clairance à la créatinine
- E. Les transaminases hépatiques

15. Parmi les règles de prescription en pédiatrie : (cochez la ou les réponses justes)

- A. La dose prescrite doit être compatible avec la forme galénique disponible
- B. La posologie utilisée est la moitié de la posologie adulte



- C. La posologie utilisée est en fonction du poids ou de la surface corporelle de l'enfant.
- D. Tous les médicaments utilisés en pédiatrie ont l'AMM
- E. En pédiatrie une grande partie des médicaments sont prescrits en dehors de l'AMM par rapport aux indications, posologies, forme galénique et âge de l'enfant
16. Parmi les critères de choix thérapeutique dans la maladie thromboembolique
- A. Danaparoiide (Orgaran) est réservé aux patients ayant une thrombopénie à l'héparine
- B. Héparine de bas poids moléculaire (HBPM) est indiquée chez les patients avec insuffisance rénale.
- C. Les anti vitamine K sont utilisés d'emblée à la phase aiguë du traitement
- D. Les anti vitamine K sont débutés après l'arrêt de l'héparine
- E. Héparine non fractionnée (HNF) est indiquée chez les patients avec insuffisance rénale.
17. Chez un patient hypertendu présentant un syndrome néphrotique, on opte pour le(les) médicament(s) suivant(s) :
- A. Un inhibiteur calcique
- B. Un bêtabloquant
- C. Un inhibiteur de l'enzyme de conversion
- D. Un alpha-bloquant
- E. Un diurétique
18. Lors du traitement de l'HTA, quel(s) critère(s) oblige(ent) le passage au stade 2 :
- A. Effets indésirables
- B. Manque d'observance
- C. La monothérapie
- D. Posologie mal adaptée
- E. Interactions médicamenteuses
19. L'hypertension artérielle de stade 2 est caractérisée par une pression systolique (PAS) et une pression diastolique(PAD) en mmHg :
- A. PAS < 130 - PAD < 85
- B. PAS [130-139] - PAD [85-89]
- C. PAS [140-159] - PAD [90-99]
- D. PAS [160-179] - PAD [100-109]
- E. PAS ≥ 180 - PAD ≥ 110

# ResiPharma<sup>TM</sup>

## Cas cliniques

20. Un patient X.Y âgé de 63 ans se plaint de reflux gastro-œsophagien accompagné de douleurs thoraciques et de gingivites. Quelle sera la conduite à tenir ?
- A. Réalisation d'une fibroscopie oeso-gastro duodénale (FOGD) en première intention.
- B. Mise d'emblée sous alginates.
- C. Mise sous inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) à demi-dose si la FOGD révèle une œsophagite au grade A.
- D. Mise sous IPP à pleine dose si la FOGD révèle une œsophagite au grade B.
- E. Traitement par IPP à dose minimale pendant 2 mois si les rechutes du RGO sont fréquentes.

Nom

Prénom

Date de naissance

CORRECTION

Exemple : Si B et D sont justes, cochez par un  
REPLISSAGE OU par une CROIX:

Q4 : A B C D E  
☐ ☒ ☐ ☒ ☐

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, annulera la correction automatique de la question.

|     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Q1  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q2  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q3  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q4  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q5  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q6  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q7  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q8  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q9  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Q10 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q11 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q12 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q13 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q14 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q15 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q16 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q17 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q18 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q19 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Q20 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

