

2ème EMD de Pharmacie Clinique/5^{ème} année pharmacie

Durée : 60 min

Partie EMD

Cochez la ou les bonnes réponses :

- 1- Après l'oubli de MICROVAL (Levonorgestrel 0.03 mg) de 5 heures, quelle est la conduite à tenir :
 - A- Rien de particulier
 - ☒ B- Prendre immédiatement le comprimé oublié
 - C- Prendre immédiatement deux comprimés
 - ☒ D- Utiliser un autre moyen de contraception physique durant les 7 jours qui suivent
- 2- La pilule connue sous le nom d'Adépal (EE/P : J1 - J7 : 30 µg/150 µg, J8 : J 21: 20µg/ 200 µg)
 - ☒ A- Est un contraceptif œstre-progestatif biphasique
 - B- Est prise durant les 28 jours du cycle sans interruption
 - ☒ C- Expose à un risque d'athérosclérose
 - D- Expose à un risque de grossesse extra-utérine
- 3- La contraception d'urgence :
 - A- Se fait par voie injectable
 - B- Doit débiter dans les 12 heures suivant un rapport sexuel
 - C- Implique l'utilisation de faible dose de progestérone
 - ☒ D- Peut impliquer l'utilisation de l'ulipristal dans les 5 jours suivant le rapport sexuel
- 4- Concernant les inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) :
 - ☒ A- Ils sont indiqués dans le traitement du syndrome de Zollinger Ellison
 - B- Ils sont des molécules acides faibles
 - C- Ils inhibent la pompe à proton de façon irréversible mais ils donnent lieu au phénomène de tolérance
 - D- Toutes les réponses justes
- 5- A propos de la trithérapie de l'ulcère gastroduodénal :
 - ☒ A- Son objectif est l'éradication de l'*Helicobacter pylori* et la cicatrisation de la muqueuse gastroduodénale

ResiPharmaTM

- B- L'une de ces trithérapies est l'association : oméprazole+ métronidazole+ amoxicilline
 - C- Les tétracyclines sont contre-indiqués en cas d'ulcère gastroduodéal HP+
 - D- Toutes les réponses justes
- 6- A propos de la maladie de crhon :
- A- C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui touche exclusivement les intestins
 - B- L'objectif du traitement médicamenteux est d'avoir une rémission totale
 - C- Les anti TNF alpha sont l'un de ses traitements
 - D- Parmi ses complications une malabsorption.
- 7- Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) juste (s) ?
- A- Les hyperthyroïdies se caractérisent par des thyrotoxicoses
 - B- La chirurgie constitue l'une des thérapies des hyperthyroïdies
 - C- Une monothérapie à base des hormones thyroïdiennes est la pierre angulaire du traitement des hyperthyroïdies
 - D- Parmi les complications d'une hypothyroïdie le coma myxœdémateux
- 8- A propos des hormones thyroïdiennes :
- A- La T₄ est une forme active mais la T₃ est une forme de réserve
 - B- La T₄ est une forme de réserve mais la T₃ est une forme active
 - C- L'origine principale de la T₃ est la désiodation périphérique de la T₄
 - D- L'origine principale de la T₃ est une synthèse au niveau de la thyroïde
- 9- Concernant les antithyroïdiens de synthèse :
- A- Ils constituent le traitement de référence des hyperthyroïdies
 - B- Ils sont des inhibiteurs de la thyroperoxydase
 - C- Ils constituent le traitement de choix des cancers thyroïdiens TSH dépendant
 - D- Toutes les réponses justes
- 10- Parmi les examens suivant lequel (lesquels) permet (permettent) le diagnostic des dysthyroïdies ?
- A- Bilan thyroïdien : TSH, T₄
 - B- Scintigraphie
 - C- Echodoppler
 - D- Recherche des auto-anticorps anti TPO
- 11- A propos des hypolipémiants :
- A- Tous les hypolipémiants présentent des effets pléiotropes
 - B- Ils sont indiqués en prévention primaire ou en prévention secondaire

ResiPharmaTM

- C- Ils entraînent une perturbation du bilan glucidique
 - D- Ils modifient les paramètres du bilan lipidique
- 12- Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste (s) ?
- A- Les fibrates sont des inhibiteurs de l'HMGCoA
 - B- Les statines entraînent une rhabdomyolyse et une hépatotoxicité
 - C- Les résines séquestrants des sels biliaires ont une action prononcée sur le LDL cholestérol
 - D- Les fibrates sont des inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol
- 13- Parmi les situations suivantes laquelle (lesquelles) permet de poser le diagnostic du diabète sucré ?
- A- HGPO à la 2^{ème} heure ≥ 2 g/L
 - B- Taux d'HbA_{1c} $\geq 6\%$
 - C- Polydipsie, polyphagie et polyurie
 - D- Une glycémie à jeun > 1.26 g/L confirmée par une deuxième mesure
- 14- Parmi les molécules suivantes lesquelles sont des cibles des antidiabétiques ?
- A- Alpha glucosidases intestinales
 - B- Transporteurs de type GLUT₁ et GLUT₄
 - C- Les récepteurs PPAR alpha
 - D- Toutes les réponses justes
- 15- Concernant les insulines :
- A- L'insuline glargine est une insuline basale
 - B- Les insulines ont une action sur la glycémie post prandiale et la glycémie basale
 - C- Elles constituent le traitement de référence du coma hyperosmolaire
 - D- Toutes les insulines peuvent être administrées par voie IV
- 16- Parmi les antibiotiques suivants lesquels sont néphrotoxiques ?
- ~~A~~ A- Les pénicillines A
 - B- Les phénicolés
 - C- Les aminosides
 - D- Les glycopeptides
- 17- A propos de la durée d'une antibiothérapie dépend de :
- A- Elle est prolongée si le malade est un immunodéprimé
 - B- Elle est indépendante du site d'infection
 - C- Elle dépend du germe à éradiquer
 - D- Toutes les réponses justes

ResiPharmaTM

18- En cas d'une allergie à la pénicilline G ; quel (s) est (sont) les antibiotiques qu'il faut éviter ?

A- Ciprofloxacine

~B- L'ampicilline

C- Vancomycine

D- Erythromycine

ResiPharmaTM

19- A propos de l'activité temps dépendante d'un antibiotique :

A- L'effet antibactérien dépend essentiellement de la dose administrée

B- En général, elle est associée à un effet post antibiotique important

~C- L'effet dépend essentiellement de la fréquence des administrations

D- Elle concerne souvent les antibiotiques bactériostatiques

20- Concernant l'effet bactéricide d'un antibiotique :

~A- Il dépend de la CMI et de la CMB

B- Il est exclusivement associé à un effet dose dépendant

~C- Les aminosides et les glycopeptides sont bactéricides

D- Toutes les réponses fausses



Université Médicale Mohammed VI de Tunis
FACULTE DE MEDECINE

Epreuve Cinquième (5ème) Année PHARMACIE _Pharma Clinique_EMD2

Date de l'épreuve : 06/10/2020

Corrigé Type

10 question(s) retirée(s) - Barème par question : 1,00000000 (au lieu de 0,67)

N°	Rép.
1	BD
2	AC
3	D
4	A
5	AB
6	CD
7	ABD
8	BC
9	AB
10	ABD
11	BD
12	BC
13	AB
14	AB
15	ABC
16	CD
17	AC
18	B
19	C
20	AC
21	X
22	X
23	X
24	X
25	X
26	X
27	X
28	X
29	X
30	X

