

Partie TD :

Cochez la ou les bonnes réponses :

Une jeune femme de 35 ans consulte pour une agitation, une fatigue extrême; un tremblement de fin des extrémités; une exophtalmie; de plus elle présente des palpitations au repos; la maladie de Basedow est suspectée.

- 1- Comment peut-on confirmer ce diagnostic par examen biologique ?
 - A- Dosage de la TSH
 - B- Dosage de la T₄
 - C- Dosage des anticorps anti TPO
 - D- Dosage de la TRH
- 2- Le diagnostic de la maladie de basedow est confirmé; quel est traitement à instaurer initialement chez cette patiente ?
 - A- Levothyroxine
 - B- Liothyronine
 - C- Itrathérapie
 - D- Carbimazole
- 3- Quel (s) traitement (s) symptomatique (s) à instaurer ?
 - A- Amiodarone
 - B- Diltiazem
 - C- Propranolol
 - D- Lidocaine
- 4- Sachant que la patiente est sous carbimazole depuis quatre semaines, quels sont les effets indésirables éventuels liés à son administration ?
 - A- Agranulocytose
 - B- Neutropénie
 - C- Thrombose
 - D- Hypothyroïdie
- 5- Après 6 semaines de traitement à base du carbimazole, quelle (s) est (sont) la (les) conduite (s) à tenir pour assurer l'euthyroïdie ?
 - A- Réduction de la posologie du carbimazole
 - B- Réduction de la posologie du carbimazole et association au levothyrox
 - C- Maintien de la posologie du carbimazole avec association au levothyrox
 - D- Augmentation de la posologie du carbimazole

ResiPharmaTM

Mr D K, 63 ans, 90kg, 1,70m, vous présente l'ordonnance de son cardiologue :
Atorvastatine Cp 40 mg 1 Cp/ le soir. (Pas d'anomalie dans le bilan lipidique)

Ce patient vous dit qu'il a un ulcère gastrique et qu'il prend actuellement de l'OMEPRAZOLE 40mg/01 fois par jour.

1- Quel est l'intérêt de l'atorvastatine chez ce patient ?

- A- Traitement d'une dyslipidémie
- B- Indiqué en prévention primaire des maladies cardiovasculaire
- C- Instaure en prévention secondaire des maladies cardiovasculaire
- D- Toutes les réponses justes

2- Quel (s) facteur (s) de risque cardio-vasculaire (s) présente -t-il ce patient ?

- A- Age et le sexe
- B- Age et l'obésité
- C- Obésité, âge et maladie gastrique
- D- Obésité et maladie gastrique

ResiPharmaTM

3- Concernant le traitement de l'ulcère à base de l'oméprazole chez ce patient :

- A- Traitement suffisant en monothérapie
- B- Traitement insuffisant en monothérapie
- C- Il faut se renseigner sur le statut HP avant de juger la thérapie
- D- Aucune réponse juste

4- Suite à un problème eosophagien la fibroscopie est impossible chez ce patient, sachant que les symptômes de l'ulcère persistent malgré le traitement par oméprazole ; quelle (s) est (sont) la (les) conduite (s) à tenir ?

- A- Instauration de la Ranitidine en monothérapie
- B- Instauration d'une trithérapie d'éradication d'*Helicobacter pylori*
- C- Instauration de la trithérapie :
metronidazole+aloxicilline+oméprazole
- D- Changer l'oméprazole par un autre IPP

- 5- Le malade est sous clarithromycine, dans ce cas y-a-t-il un problème concernant son traitement à base de l'atorvastatine ?
- A- Y a risque de diminution des concentrations plasmatiques de l'atorvastatine
 - B- Y a risque de l'augmentation des concentrations plasmatiques de l'atorvastatine
 - C- Y a risque de potentialisation de survenue d'une rhabdomyolyse
 - D- Aucune réponse juste.

ResiPharmaTM



Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
FACULTÉ DE MEDECINE

Epreuve Cinquième (5ème) Année PHARMACIE _Pha Clinique_EMD2

Date de l'épreuve : 06/10/2020

Corrigé Type

20 question(s) retirée(s) - Barème par question : 2,00000000 (au lieu de 0,67)

N°	Rép.
1	X
2	X
3	X
4	X
5	X
6	X
7	X
8	X
9	X
10	X
11	X
12	X
13	X
14	X
15	X
16	X
17	X
18	X
19	X
20	X
21	AB
22	D
23	C
24	ABD
25	B
26	B
27	B
28	C
29	BC
30	BC

