

8. Au cours de la grossesse :
- A. L'effet du médicament n'est pas influencé.
 - B. L'hypoalbuminémie peut favoriser le passage transplacentaire.
 - C. Le placenta empêche le passage vers le fœtus de tout médicament administré.
 - D. L'utilisation de tout médicament est contre-indiquée.
 - E. La pharmacocinétique du médicament peut être modifiée.

9. Au cours de l'allaitement maternel, il est essentiel de choisir les médicaments :
- A. A métabolites actifs.
 - B. A métabolites inactifs.
 - C. Contenant plusieurs principes actifs.
 - D. A demi-vie courte.
 - E. Dont le passage dans le lait maternel est faible.

10. Les parasympathomimétiques peuvent être indiqués dans le traitement de :
- A. L'hypertension artérielle « HTA ».
 - B. L'asthme.
 - C. L'ulcère gastroduodénal.
 - D. L'insuffisance cardiaque.
 - E. Glaucome.

11. Les parasympatholytiques (antimuscariniques) peuvent entraîner :
- A. Une constipation.
 - B. Un bronchospasme.
 - C. Une mydriase.
 - D. Une sécheresse buccale.
 - E. Des crises d'asthme.

ResiPharmaTM

12. Les sympathomimétiques B2 stimulants peuvent être indiqués dans le traitement de :
- A. L'asthme.
 - B. Le diabète.
 - C. La thyrotoxicose.
 - D. L'HTA.
 - E. La menace d'accouchement prématuré.

13. Les B bloquants peuvent :
- A. Induire une hypoglycémie.
 - B. Induire une tachycardie.
 - C. Diminuer la conduction auriculo ventriculaire.
 - D. Être arrêtés brutalement.
 - E. Augmenter les crises d'asthme.

14. Les Bêta-bloquants peuvent être indiqués dans le traitement de :
- A. L'asthme.
 - B. L'HTA.
 - C. Troubles du rythme cardiaque.
 - D. Syndrome de Raynaud.
 - E. Hypercholestérolémie.

15. La cardiosélectivité est une caractéristique de choix des B bloquants chez :
- A. L'asthmatique.
 - B. Le diabétique.
 - C. La femme enceinte.
 - D. La femme qui allaite.
 - E. Le patient présentant un phéochromocytome.

16. Parmi les propriétés pharmacologiques suivantes, laquelle (lesquelles) ne s'applique (ent) pas aux anti-inflammatoires non stéroïdiens « AINS » ?

- A. Antalgiques.
- B. Antipyrétiques.
- C. Hypocalcémiants.
- D. Hyperglycémiants.
- E. Immunosuppresseurs.

17. Parmi les effets indésirables suivants, quel (s) est (sont) celui (ceux) qui peut (peuvent) être du(s) aux traitements au long cours par les AINS :

- A. Hypoglycémie.
- B. Ulcère gastroduodénal.
- C. Hypotension.
- D. Ostéoporose.
- E. Hyperkaliémie.

18. A propos des anti-inflammatoires stéroïdiens :

- A. Ils sont contre-indiqués en cas d'asthme.
- B. Ils sont antipyrétiques.
- C. Certains peuvent être utilisés comme antiagrégants plaquettaires.
- D. Ils peuvent perturber la glycémie.
- E. Ils peuvent augmenter la tension artérielle.

19. Les corticoïdes peuvent :

- A. Altérer la fonction rénale.
- B. Entraîner un état psychotique.
- C. Favoriser l'apparition de l'acné.
- D. Engendrer un glaucome.
- E. Augmenter la kaliémie.

20. Les corticoïdes peuvent être utilisés :

- A. Dans le traitement de l'insuffisance surrénalienne.
- B. Dans la prévention du risque de rejet de greffe d'organe.
- C. En cas d'infection virale.
- D. En cas grossesse.
- E. En cas de vaccination par un vaccin vivant atténué.

21. L'halopéridol :

- A. Est un antipsychotique.
- B. Est sédatif.
- C. Est antiémétique.
- D. Peut provoquer un syndrome extrapyramidal.
- E. Augmente la recapture de la dopamine.

ResiPharmaTM

22. Le syndrome malin est l'effet indésirable des:

- A. Antidépresseurs tricycliques.
- B. Antidépresseurs non tricycliques- non IMAO.
- C. IMAO.
- D. Anxiolytiques.
- E. Neuroleptiques.

23. Les benzodiazépines :

- A. Sont des agonistes des récepteurs du GABA.
- B. Sont des agonistes des récepteurs de la sérotonine.
- C. Sont anxiolytiques.
- D. Augmentent la fréquence de la fermeture du canal chlore.
- E. Possèdent une action anticonvulsivante.

24. L'Anéxate (Flumazénil) est un antagoniste des :
- A. Antidépresseurs non tricycliques-non IMAO sédatifs.
 - B. Antidépresseurs non tricycliques-non IMAO mixtes.
 - C. Antidépresseurs non tricycliques-non IMAO psychotoniques.
 - D. Benzodiazépines.
 - E. Phénothiazines.

25. La Clonidine :
- A. Est un antihypertenseur d'action centrale.
 - B. Est un agoniste des récepteurs imidazoliniques.
 - C. Provoque une diminution du tonus sympathique.
 - D. Possède des effets antidépresseurs.
 - E. Possède des effets antipsychotiques.

26. Parmi les propositions suivantes concernant les contre-indications des inhibiteurs de l'enzyme conversion, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
- A. Hypokaliémie.
 - B. Sténose de l'artère rénale.
 - C. 2^{ème} et 3^{ème} trimestre de grossesse.
 - D. Allaitement.
 - E. Néphropathie du diabétique.

27. Les diurétiques thiazidiques :
- A. Sont très efficaces chez l'insuffisant rénal.
 - B. Sont indiqués dans le traitement d'hypercalcémie.
 - C. Peuvent engendrer un trouble lipidique.
 - D. Peuvent diminuer l'excrétion de l'acide urique.
 - E. Sont ototoxiques.

28. Les diurétiques de l'anse :
- A. Ont un effet indépendant de la dose.
 - B. Peuvent augmenter la glycémie.
 - C. Sont ototoxiques.
 - D. Sont contre-indiqués en cas d'hypercalcémie.
 - E. Sont contre-indiqués en cas de lithiase urinaire calcique.

29. Une intoxication digitalique peut être aggravée par :
- A. Une hyperkaliémie.
 - B. Une hypokaliémie.
 - C. Une hypocalcémie.
 - D. Une hypercalcémie.
 - E. Une insuffisance rénale.

ResiPharmaTM

30. La digoxine est formellement contre-indiquée en association avec :
- A. Le millepertuis
 - B. La rifampicine
 - C. Le calcium par voie orale
 - D. Le calcium par voie intraveineuse.
 - E. La colestyramine.