

Pour toutes les questions cocher la ou les réponses justes.

13h → 15h

1/ les prélèvements poly microbiens sont :

(a) Crachat

b/ LCR

c/ Hémoculture

d/ Liquide pleural

(e) Prélèvements génitaux

2/ le moment du prélèvement Bactériologique :

(a) Se fait avant toute antibiothérapie

b/ Se fait après antibiothérapie

(c) Doit être effectué le plus précocement possible

(d) Doit être effectué après le début des signes cliniques

e/ aucune réponses juste

3/ La température de conservation du prélèvement bactériologique est :

(a) à 37 °C

(c) 4 °C

b/ 42 °C

d/ -4 °C

4/ la concentration minimale inhibitrice (CMI) : E test est caractérisé :

(a) Par sa facilité de réalisation

b/ Par sa difficulté de réalisation

(c) Par sa précision

d/ toutes les réponses sont justes

e/ toutes les réponses sont fausses

5/ L'hémoculture est faussement négative en cas :

(a) D'infection décapitée par l'antibiothérapie

(b) Fièvre non infectieuse

(c) Infection virale

(d) infection tuberculose

(e) toutes les réponses sont justes

ResiPharmaTM

6/ les bactéries pathogènes spécifiques responsables de septicémies. (a) Salmonella typhi ✓

~~(b) Listeria monocytogenes~~ c/ Pseudomonas sp d/ Acinobacter Baumannii

(e) Haemophilus influenzae

1-6-10

7/ Le repiquage systématique des bouillons d'hémoculture se fait. (a) au 6^{ème} jour d'incubation ✓

~~(b) au 5^{ème} jour d'incubation~~ (c) au 10^{ème} jour d'incubation (d) au 1^{er} jour d'incubation

d/ toute les réponses sont justes

e/ d/ toute les réponses sont fausses

8/ les portes d'entrée d'une infection urinaire. a/ la voie descendante est la plus fréquente ✓

~~(b) la voie hématogène peut exister~~ (c) souvent les germes cheminent de l'urètre vers la vessie

(d) exceptionnellement par effraction de l'arbre urinaire

9/ L'ECBU est indiqué dans toutes ces situations sauf. a/ troubles fonctionnelles de la miction ✓

(b) température inexpiquée chez l'adulte c/ aspect anormal des urines d/ chez la femme enceinte

10/ les germes suivants sont incriminés dans les méningites bactériennes. a/ Neisseria gonorrhoeae

(b) Streptococcus pneumoniae (c) Streptococcus agalactiae (d) Listeria monocytogenes

11/ les Antibiotiques suivants ont une diffusion correcte dans le LCR. a/ les aminosides ✓

b/ Pénicillines G (c) quinolones (d) chloramphénicol

12/ dans un examen microscopique d'une selle normale on trouve. a/ 3/5 bacilles et 2/5 de cocci

b/ 50% de bactéries Gram négatif et 50% de bactéries Gram positif

c/ 4/5 de cocci et 1/5 de bacilles

(d) 4/5 bacilles et 1/5 de cocci ✓

13/ les germes responsables d'infections entériques. a/ Streptococcus

(b) Salmonelles c/ Listeria (d) Shigella e/ acinetobacter (f) vibron

14/ cocher les milieux de culture utilisés lors de coproculture. a/ gélose nutritive (b) GNAB

(c) Hechtoene d/ chapman (e) EPA ✓

15/ cocher les germes enterotoxinogènes. a/ Salmonella typhi b/ Salmonella enteritidis

(c) vibron cholerae d/ staphylococcus saprophyticus

16/ ces germes sont isolables à partir d'un liquide articulaire. (a) Neisseria gonorrhoeae ✓

(b) Neisseria meningitidis c/ Streptococcus D (d) Haemophilus influenzae

e/ Streptococcus pneumoniae

ResiPharmaTM

- 17/ *Streptococcus pneumoniae* est retrouvé dans les prélèvements suivants : a/ prélèvements vaginal b/ prélèvements urétral ☒ c/ liquide pleural d/ liquide articulaire ☒ e/ liquide péritonéal
- 18/ les suppurations sont classées : ☒ a/ en trois groupes b/ deux groupes c/ plusieurs groupes ☒ d/ aucune réponse
- 19/ ces germes sont suppuratifs par excellence : ☒ a/ *Staphylococcus aureus* b/ *Listeria monocytogenes* c/ *Streptococcus* de groupe C ☒ d/ *Streptococcus* de groupe A ☒ e/ *E-coli*
- 20/ la concentration minimale inhibitrice : ☒ a/ 10^{-7} b/ / est la plus forte concentration d'antibiotique qui inhibe la culture c/ est la plus faible concentration bactéricide d'antibiotique ☒ d/ est la plus faible concentration d'antibiotique qui inhibe la culture qui définit la bactériostase

ResiPharmaTM

- 21/ l'examen direct d'un prélèvement de pus est plus important notamment : a/ pour les liquides de dialyse ☒ b/ pour les prélèvements où le BK est suspecté ☒ c/ pour les pus d'abcès de cerveau ☒ d/ pour les pus de fistule
- 22/ ces milieux de cultures sont utilisés lors d'un ECB de pus : a/ ADH b/ ODC ☒ c/ gélose au sang cuit ☒ d/ Hechtène ☒ e/ Chapman X

pus
30