

Nom et Prénom :

Deuxième Examen de Moyenne durée
(1H)

Cocher la ou les réponse(s) correcte(s) :

1. Le syndrome de Loeffler traduit :
 - A. Le passage des larves de *Trichinella spiralis* par les alvéoles.
 - B. L'apparition d'une fièvre en plateau associée à une hyper éosinophilie.
 - C. L'association de toux , de fièvre, d'hyperéosinophilie et des images radiologiques labiles.
 - D. Le passage des larves d'*Ascaris lumbricoides* par le cartefour aérodigestif.
2. Parmi ces propositions quels sont les helminthes ovipares que vous reconnaissez :
 - A. *Ascaris lumbricoides*
 - B. *Trichinella spiralis*.
 - C. *Trichuris trichura*.
 - D. *Dracunculus medinensis*.
3. La trichinellose est une pathologie qui se distingue par :
 - A. La fièvre qui est oscillante.
 - B. Les localisations erratiques fréquentes.
 - C. Un hôte intermédiaire et définitif identique.
 - D. Un traitement strictement chirurgical.
4. Un septomycète se caractérise par :
 - A. Des filaments mycéliens cloisonnés.
 - B. Par des chlamydospores terminales.
 - C. Par des filaments en raquettes.
 - D. Par des vrilles.
5. L'onyxis à *Candida* sp est décrit comme suit :
 - A. Une atteinte de la partie proximale de l'ongle accompagnée d'une inflammation du pourtour.
 - B. Une décoloration de l'ongle avec un épaissement de son pourtour.
 - C. Un décollement du lit de l'ongle associé à une hyperkératose.
 - D. Une atteinte des ongles palmaires exclusive avec du pus.
6. La teigne favique ou le favus a une origine :
 - A. Tellurique.
 - B. Zoophile.
 - C. Anthropophile.
 - D. Anthrozoophile.
7. Les teignes ectoendothrix sont dues au :
 - A. Genre *Microsporum*.
 - B. Genre *Trichophyton*.
 - C. Genre *Chrysosporium*.
 - D. Genre *Epidermophyton*.
8. L'alopecie observée au cours des teignes est due à :
 - A. L'invasion des spores fongiques vers le follicule pileux.
 - B. L'extension centrifuge des dermatophytes.
 - C. La pénétration des levures l'ontium folliculaire.
 - D. Toutes les propositions sont incorrectes.

ResiPharmaTM

9. Lors du diagnostic mycologique d'une epidermatophytie, à l'examen direct retrouvez :
- A. Des chlamydospores intercalaires.
 - B. Des filaments mycéliens.
 - C. Des filaments mycéliens courts associés à des chlamydospores.
 - D. Des macroconidies en barquettes.
10. L'image en Halo définit :
- A. La pénétration alvéolaire des spores.
 - B. L'hémorragie locale due à l'invasion des filaments.
 - C. La truffe aspergillaire.
 - D. Le croissant gazeux de l'aspergillome.
11. Parmi les espèces pathogènes du genre *Aspergillus* incriminées dans l'aspergillose auriculaire vous connaissez :
- A. *Aspergillus* du groupe *flavus*.
 - B. *Aspergillus* du groupe *fumigatus*.
 - C. *Aspergillus* du groupe *glaucus*.
 - D. *Aspergillus* du groupe *ornithosporus*.
12. Le diagnostic de l'aspergillose invasive repose sur :
- A. la recherche des filaments mycéliens dichotomiques et le galactomannane aspergillaire.
 - B. La recherche des têtes aspergillaires dans le LBA.
 - C. La recherche des antigènes aspergillaires dans le sang.
 - D. Toutes les propositions sont incorrectes.
13. Parmi les facteurs favorisants de la cryptococcose :
- A. Transplantation d'organes.
 - B. Chirurgie cérébrale.
 - C. Sujets âgés.
 - D. HIV.
14. Le diagnostic de la rytosporidiose repose sur :
- A. La coloration de Weber.
 - B. La coloration de Musto.
 - C. La coloration de Ziehl Neelsen modifiée.
 - D. La technique de Vangool.
15. La culture des amibes se fait :
- A. En routine pour confirmer le diagnostic.
 - B. Sur milieu de Dobell et Laidlaw.
 - C. Sur milieu de Courtieu.
 - D. Les deux premières questions sont justes.
16. Parmi les facteur(s) de risque de la paracoccidiose :
- A. La grossesse.
 - B. La prise d'antibiotiques.
 - C. L'infection par le VIH.
 - D. Le tabagisme.
17. La technique de concentration de *Formann* est utilisée pour la recherche de :
- A. *Oxyure*.
 - B. *Taenia*.
 - C. *Anguillule*.
 - D. *Microfilaires*.

ResiPharmaTM

...ologie, à l'examen direct vous

...épidémiologie
...on de GR
...athologie
...bation de l'hémiabdomen cutané
...du roide

18. L'identification des champignons filamenteux est basée sur :
- A. L'étude des sérotypes.
 - B. Les critères macroscopiques des cultures uniquement.
 - C. Les critères macroscopiques et microscopiques des cultures.
 - D. Toutes les propositions sont justes.
19. Parmi les milieux d'identification des dermatophytes on a :
- A. Pomme de terre carotte bile (PCB).
 - B. Milieu Lactrimel (Borelli).
 - C. Corn meal agar.
 - D. Rice-cream.
20. Les organes d'ornementation des dermatophytes sont :
- A. Vrilles.
 - B. Macroconidies.
 - C. Filaments en bois de cerfs.
 - D. Chlamydospores.
21. Milieu de Czapek
- A. Est valable pour tous les champignons filamenteux.
 - B. Permet l'identification des dermatophytes.
 - C. Permet l'identification des *Aspergillus*.
 - D. Toutes les propositions sont justes.
22. La culture en helminthologie
- A. Est idéale pour les helminthes qui subissent une évolution larvaire.
 - B. Est utilisée uniquement pour les trématodes.
 - C. Est dangereuse et requiert un personnel qualifié.
 - D. Est valable pour tous les helminthes.
23. Sur le Rice-cream vous identifiez le *Candida albicans* par :
- A. La présence des filaments mycéliens.
 - B. La présence des chlamydospores intercalaires sur les filaments mycéliens.
 - C. Par la présence des chlamydospores terminales sur les filaments mycéliens.
 - D. Par la présence de spores bourgeonnantes.
24. L'étude parasitologique des selles en Algérie est sans intérêt dans les situations suivantes :
- A. Lors d'une Trichurose.
 - B. Dysenterie amibienne.
 - C. Schistosomiase.
 - D. Oxyurose.
25. L'étude microscopique du LCR permet de retrouver les agents pathogènes suivants :
- A. *Cryptosporidium gatti*.
 - B. *Trypanosoma cruzi*.
 - C. *Cryptococcus neoformans*.
 - D. *Candida albicans*.
26. Lors de la représentation graphique des variations de l'hyperboémie au cours des helminthiases vous obtenez :
- A. Une courbe de Gausse.
 - B. Une courbe en dents de scie.
 - C. Une courbe en plateau.
 - D. Une courbe de Lavie.

ResiPharmaTM