

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE - DEPARTEMENT DE PHARMACIE
EXAMEN DE RATTRAPAGE - 4^e ANNEE PHARMACIE- 2015

NOM.....

PRENOM.....

DUREE : 40

Cochez la ou les bonnes réponses :

1-Parmi les parasites suivants le(s)quel(s) est (sont) à transmission transcutanée :

- a-*Trichomonas intestinalis*
- b-*Trichomonas vaginalis*
- c-*Ankylostoma duodenale*
- d-*Dientamoeba fragilis*
- e-*Diphyllobotrium latum*

2-L'amœbose colique est dite d'infestation, si l'examen parasitologique retrouve :

- a-le trophozoite d'*Entamoeba histolytica histolytica*
- b-le trophozoite d'*Entamoeba histolytica minuta*
- c-les trophozoites d'*Entamoeba histolytica* et d'*Entamoeba dispar*
- d-le kyste d'*Entamoeba histolytica minuta*
- e-le kyste d'*Entamoeba hartmanni*

3-La planorbe est un mollusque hôte intermédiaire de *Schistosoma* :

- a-mekongi
- b-japonicum
- c-intercalatum
- d-haematobium
- e-mansoni

4-Dans la Bilharziose la contamination de l'homme se fait par l'intermédiaire de:

- a-miracidiums.
- b-oeufs.
- c-sporocystes.
- d-Furcocercaires.
- e-Rédies

ResiPharma[®]

5- le(s)quel(s) des nématodes suivants est (sont) transmis par l'ingestion d'œufs infestants ?

- a- *Strongyloides stercoralis*
- b- *Trichuris trichiura*
- c- *Trichinella spiralis*
- d- *Necator americanus*
- e- *Ascaris lumbricoïdes*

6- Quelles sont les caractéristiques des larves strongyloïdes ?

- a- retrouvées dans les selles fraîches
- b- infestantes
- c- sont de stade L (larve) 4
- d- se nourrissent de végétaux
- e- sont munies de protéases.

7- *Histoplasma capsulatum* variété *capsulatum* est une espèce dimorphique :

- a- à tropisme cutané et osseux
- b- présente sur le continent africain
- c- opportuniste
- d- dite à « grandes formes »
- e- caractérisée par une forte uréase.

NOM.....PRENOM.....DUREE : 40 min

8- Le colorant de Giemsa:

- a- se fixe sur l'ADN
- b- colore le kinétoplaste en rouge
- c- se fixe sur les particules de glycogène
- d- colore en brun les vacuoles
- e- colore en rouge la membrane cellulaire externe.

9- Les distomes sont des :

- a. plathelminthes à sexes séparés
- b. nématodes à sexes séparés
- c. cestodes hermaphrodites
- d. trématodes hermaphrodites
- e. trématodes à sexes séparés

10- Le milieu de Czapek est spécifique pour l'identification de :

- a. *Sporothrix schenckii*
- b. *Trichophyton rubrum*
- c. *Malassezia furfur*
- d. *Aspergillus sp.*
- e. *Candida albicans*

ResiPharmaTM

11- *Trypanosoma gambiense* :

- a. est un protozoaire
- b. appartient à la section stercoraria
- c. est un rhizopode
- d. possède un kinétoplaste
- e. est une sous espèce de *Trypanosoma cruzi*

12- Les Anophèles vecteurs du paludisme sont des :

- a- psychodidés b- ectoparasites c- diptères d- hémiptères e- acariens

13- les leishmanies :

- a- sont des sporozoaires
- b- donnent des formes immobiles et non flagellés en milieu de culture
- c- se cultivent uniquement sur milieu de Sabouraud
- d- se cultivent uniquement sur milieu de Brumpt
- e- se cultivent sur milieu NNN

14- la méthode de Kato :

- a- est utilisée en helminthologie
- b- est une technique de concentration des parasites sanguins
- c- est une technique de concentration des toxoplasmes
- d- utilise le vert de malachite
- e- utilise le Bleu de méthylène

15- *Candida albicans* :

- a- provoque des mycoses des plis cutanés
- b- provoque des mycétomes
- c- est recherché par la technique du scotch test
- d- est recherché uniquement par la sérologie
- e- est recherché uniquement dans les crachats

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE - DEPARTEMENT DE PHARMACIE
EXAMEN DE RATRAPAGE - 4^e ANNEE PHARMACIE- 2015

NOM.....PRENOM.....DUREE : 40 min

16-Le « sérum de cheval » est un composé ajouté dans le milieu de :

- a-Borelli
- b-Sabouraud
- c-Brumpt
- d-Dobell-Laidlaw
- e-Dixon

17-*Tenia saginata* :

- a- Mesure 20 mètres de long
- b- Possède un rostre muni de 4 ventouses et une couronne de crochets
- c- Provoque une cestodose larvaire chez l'homme
- d- Présente un orifice de ponte au niveau de chaque segment
- e- Présente des pores génitaux latéraux irrégulièrement alternés

18-La sparganose :

- a- Est due à la présence de la larve de *spirometra mansoni* dans l'intestin de l'homme
- b- Est une parasitose cosmopolite
- c- Est une parasitose transmise à l'homme par piqure d'insecte
- d- est une cestodose larvaire chez l'homme
- e- Est de diagnostic sérologique

19-*Cystisercus bovis* :

- a- Est la larve de *Tenia solium*
- b- Contient plusieurs protoscolex
- c- Est la forme infestante pour l'homme
- d- Est retrouvée dans les selles
- e- Est retrouvée dans la viande porcine

20-Les arthropodes holométaboles sont :

- a- *Sarcoptes scabiei*
- b- Réduves
- c- Puces
- d- Diptères brachycères
- e- Les tiques

ResiPharmaTM

: 40 min



Université de Constantine 3

Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

Sujet A

Département de Pharmacie-Contrôle de Rattrapage de
PARASITOLOGIE-A-4ème ANNEE-Sept 2015

Date de l'épreuve : 31/08/2015

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 1,000000

N°	Rép.
1	C
2	BD
3	E
4	D
5	BE
6	BE
7	CE
8	AB
9	D
10	D
11	AD
12	C
13	E
14	AD
15	A
16	D
17	E
18	DE
19	C
20	CD

