

1. la schistosomiase intestinale (la ou les réponses justes)
 - A Due à la consommation de crevisses parasitées
 - ☒ B responsable de diarrhée glairo-sanglantes
 - C l'hôte intermédiaire est un mollusque à ouverture senestre
 - D les œufs sont embryonnés à la ponte
2. Schistosomiose uro génitale est caractérisée (la ou les réponses fausses)
 - A. une hématurie terminale spontanée
 - ☒ B. une atteinte rénale
 - C. une atteinte génitale
 - ☒ D. le diagnostic repose sur l'examen parasitologique des selles
3. concernant la toxoplasmose congénitale : (la ou les réponses fausses)
 - A elle peut entraîner des atteintes cérébrales chez l'enfant
 - B il faut que la primo-infestation de la mère ait lieu au cours de la grossesse
 - ☒ C La fréquence de transmission est d'autant plus grande que la grossesse est plus avancée
 - ☒ D L'atteinte foetale est d'autant plus sévère qu'elle est tardive
4. La contamination par *Toxoplasma gondii* peut avoir lieu par : (la ou les réponses justes)
 - ☒ A - Ingestion de viande de boeuf insuffisamment cuite
 - B - Ingestion de poisson cru
 - C - Ingestion de végétaux crus
 - D - Contact avec des chiens
5. schistosomiase a *Schistosoma heamatobium* : (la ou les réponses fausses)
 - A. due à un parasite anthroponotique
 - ☒ B. l'hôte intermédiaire est un le mollusque est un bulin « *Bulinus truncatus* »
 - C. responsable de la bilharziose uro-génitale
 - D. la contamination se fait par voie orale
6. concernant la toxoplasmose, la ou lesquelles sont justes ?
 - ☒ A. La présence d'IgM spécifiques permet d'affirmer une infection récente.
 - ☒ B. Chez l'immunocompétent, le diagnostic repose sur la sérologie.
 - C. Le suivi sérologique mensuel est obligatoire pour la femme enceinte séronégative.
 - D. Le dépistage sérologique peut se limiter à la recherche des seules IgG
7. *Naegleria fowleri* (la ou les réponses justes)
 - ☒ A Une espèce thermophile
 - B Une espèce bactériophage
 - ☒ C Responsable d'atteinte neurologique grave
 - D Existe sous trois formes
8. La balantidiose est : (donnez les bonnes réponses)
 - ☒ A. une parasitose due à *Balantidium coli*
 - ☒ B Le porc constitue le principal hôte réservoir
 - C Se manifeste par des troubles du transit
 - D Est transmise à l'homme par la piqûre d'insecte.
9. Le vecteur du paludisme est (donnez la bonne réponse) :
 - a- est un moustique, mâle, du genre Anopheles
 - b- est un moustique, femelle, du genre Aedes
 - ☒ c- pique à partir du coucher du soleil
 - d- pique à partir du lever du soleil
10. Dans une infection à plasmodium, quelle forme du parasite pénètre les érythrocytes ? (donnez la bonne réponse)
 - a. Sporozoïtes ;
 - b. Mérozoïtes ;
 - ☒ c. Trophozoïte ;
 - d. Schizonte.
11. Quelle est le Schéma de la chimio-prophylaxie (sauf mefloquine) pour une personne voyageant en zone d'endémie palustre : (donnez la bonne réponse)
 - a- Commencer le jour du départ Poursuivre pendant tout le séjour et 6 à 8 semaines après le retour.
 - b- Commencer une semaine avant le départ, arrêter le jour du retour.
 - c- Commencer le jour du départ, arrêter le jour du retour.
 - ☒ d- Commencer 2 semaines avant le départ, poursuivre 2 semaines après le retour.
12. Dans quel organe retrouve-t-on la forme adulte des parasites qui causent les distomatoses (donnez la ou les réponses).
 - a- Pancréas
 - ☒ b- Intestin
 - ☒ c- Voies hépatobiliaires
 - ☒ d- poumon
13. Le diagnostic de la sarcocystose intestinale se fait par : (donnez la bonne réponse)
 - a- L'examen du sang
 - ☒ b- L'examen des selles
 - c- L'examen immunologique
 - d- Biopsie musculaire

ResiPharmaTM

14. Concernant l'amibiase : (les réponses justes)
- ☒ A. est due à *Entamoeba dispar*
 - B. peut se manifester par une hépatomégalie fébrile et douloureuse
 - C. le cycle pathogène s'effectue chez les porteurs sains
 - ☒ D. la forme infestante est la forme végétative *Entamoeba histolytica type minuta*
 - E. Le diagnostic direct se fait par examen parasitologique des selles
15. Concernant la leishmaniose viscérale en Algérie : (les réponses justes)
- ☒ A - est due à *Leishmania infantum*
 - B - Le vecteur de *Leishmania infantum* est *Phlebotomus papatasi*
 - C - la forme infestante est la forme promastigote métacyclique
 - D - *Leishmania infantum* est un parasite monoxène
 - ☒ E - *Leishmania infantum* est un agent opportuniste au cours de l'infection par le VIH
16. Le téniasis à *Taenia saginata* : (la réponse fausse)
- A - est cosmopolite
 - B - dû à l'ingestion de viande bovine contaminée par des larves *Cysticercus bovis*
 - C - l'hôte définitif est l'homme
 - ☒ D - en général l'infestation est massive
 - E - l'émission des anneaux se fait en dehors de la défécation
17. L'oxyurose : (les réponses justes)
- A. Est une nématodose cosmopolite due à *Enterobius vermicularis*
 - ☒ B. Se transmet par la viande non cuite.
 - C. Récidive facilement.
 - D. Le cycle est direct avec une étape de migration tissulaire
 - ☒ E. se manifeste essentiellement par un prurit anal nocturne
18. Le test de Graham peut permettre le diagnostic des parasitoses suivantes: (les réponses justes)
- A. Taeniasis à *Taenia saginata*
 - B. le Taeniasis à *Taenia solium*
 - ☒ C. La trichomonose
 - ☒ D. L'oxyurose
 - ☒ E. L'ascaridiose
19. La giardiose: (les réponses justes)
- A - peut être contractée par l'eau de boisson
 - B - peut être contractée par voie sanguine
 - C - se manifeste par une fièvre élevée ($> 39^{\circ}\text{C}$)
 - ☒ D - se manifeste par des troubles digestifs associés à une malabsorption intestinale
 - ☒ E- est dû à un parasite monoxène *Giardia intestinalis*
20. Trichomonas vaginalis : (les réponses justes)
- A - est un parasite résistant dans le milieu extérieur
 - ☒ B - se contracte par ingestion de kyste
 - C - provoque une IST
 - D - n'existe que sous la forme kystique
 - E - nécessite un traitement du ou des partenaire(s)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X		X	X	X						X	X	

01	B
02	A
03	D
04	AC
05	D
06	AB
07	ACD
08	AB
09	C
10	B

11	A
12	B
13	B
14	BD
15	ACE
16	X
17	B
18	X
19	A
20	AE

