



1-l'amibiase intestinal peut être contracté (les bonnes réponses)

- A- Par l'eau de boisson
- B- Par voie transplacentaire
- C- Par l'ingestion d'aliments crus
- D- Par voie sanguine
- E- Par un arthropode

ResiPharmaTM



- C. Leucopénie
D. Hyperéosinophilie
E. accélération de la vitesse de sédimentation
- Q 6. Parmi les propositions suivantes concernant les signes cliniques et biologiques caractéristiques d'une leishmaniose à *Leishmania infantum* (la bonne réponse fausse)
A. Splénomégalie
B. Fièvre anarctique
C. Lésion cutanée
D. Hyperéosinophilie sanguine
E. Anémie
- Q 7. les formes qui traversent le placenta maternel lors de la toxoplasmose congénitale qui contaminer l'enfant sont (la bonne réponse)
A. Oocystes
B. Tachyzoïtes
C. Bradyzoïtes
D. Œufs
E. Des larves
- Q 8. Le diagnostic de la toxoplasmose chez la femme enceinte se fait par (la bonne réponse)
A. La recherche directe de parasite ou de l'ADN parasitaire dans le sang
B. la recherche du parasite dans les ponctions ganglionnaires
C. des examens sérologiques à la recherche des Ac spécifiques
D. l'examen copro-parasitologique à la recherche des kystes
E. l'examen du frottis cutané à la recherche des kystes
- Q 9. Dans le cadre de la trypanosomose humaine africaine, (les réponses fausses)
A. La trypanosomose humaine africaine est transmise par la piqûre de glossine
B. A la phase neurologique, se développe un syndrome méningo-encéphalitique.
C. Dans cette affection, les plasmocytes stimulés, avec de nombreuses vacuoles, sont appelés cellules
D. Les trypanosomes peuvent être retrouvés dans le sang, les ganglions ou le LCR
E. La meilleure méthode diagnostique est la recherche d'antigène circulant

ResiPharmaTM

Durée: 25 minutes. Aucun document n'est autorisé. Après l'examen, il est autorisé de quitter la salle d'examen. Les réponses doivent être indiquées sur la feuille de réponses, en indiquant la question et la réponse choisie. Les réponses doivent être indiquées sur la feuille de réponses.

Exemple: si la question est la question 1, la réponse est la réponse 1.

Q1 A B C D E

En l'absence de ces indications et sans la feuille de réponses, les réponses ne sont pas prises en compte. Toute réponse de ce type ne sera pas notée.

- Q1. L'entérite trichomonas peut être caractérisée par (les bonnes réponses)
- par l'absence de kystes
 - par une érythrose conjonctivale
 - par l'absence d'ulcères
 - par une érythrose
 - par un ulcère
- Q2. La giardiose se caractérise par (les bonnes réponses)
- une diarrhée glauco-sanguinolente
 - une fièvre élevée ($> 38^{\circ}\text{C}$)
 - des trichites digestifs associés à une malabsorption intestinale
 - une leucocytose marquée
 - hématurie
- Q3. Le *Cryptosporidium* (les bonnes réponses)
- est un parasite coccidien
 - est un trichomonas
 - peut être éliminé sous forme de kystes dans les selles
 - N'est pathogène que chez les sujets immunodéprimés
 - Est sensible au métronidazole
- Q4. Le *Trichomonas vaginalis* (les bonnes réponses)
- est un parasite résidant dans le milieu extérieur
 - se contracte par ingestion de kystes
 - provoque une maladie vénérienne
 - nécessite un traitement du ou des partenaires(s)
 - se contracte par ingestion d'oocystes
- Q5. Quelles sont les des modifications hématologiques liées à la leishmaniose viscérale (les bonnes réponses)
- anémie normochrome
 - thrombopénie
 - Leucopénie
 - Hyperéosinophilie
 - accélération de la vitesse de sédimentation
- Q6. Parmi les propositions suivantes concernant les signes cliniques et biologiques caractéristiques d'une leishmaniose viscérale (la réponse fautive)
- Splénomégalie
 - Fièvre anarchique
 - Lésion cutanée
 - Hyperéosinophilie sanguine
 - Anémie
- Q7. Les formes qui traversent le placenta maternel lors de la toxoplasmose congénitale qui contiennent (les bonnes réponses)
- Oocystes
 - Tachyzoïtes
 - Bradyzoïtes
 - Œufs
 - Des larves
- Q8. Le diagnostic de la toxoplasmose chez la femme enceinte se fait par (la bonne réponse)
- La recherche directe de parasite ou de l'ADN parasitaire dans le sang
 - la recherche du parasite dans les ponctions ganglionnaires
 - des examens sérologiques à la recherche des Ac spécifiques
 - l'examen copro-parasitologique à la recherche des kystes
 - l'examen du frottis cutané à la recherche des kystes
- Q9. Dans le cadre de la trypanosomose humaine africaine, (les réponses fautive)
- La trypanosomose humaine africaine est transmise par la piqûre de glossine
 - A la phase neurologique, se développe un syndrome méningo-encéphalitique
 - Dans cette affection, les plasmocytes stimulés, avec de nombreuses vacuoles,
 - Les trypanosomes peuvent être retrouvés dans le sang, les ganglions ou le LC
 - La meilleure méthode diagnostique est la recherche d'antigène circulant

ResiPharmaTM

10-Le diagnostique de teania saginata peut se faire par :

- A- la présence d'œuf dans les selles
- B- la présence d'œuf sur les
- C- La présence des anneaux éliminé dans les selles
- D- La présence des anneaux éliminé par le malade en dehors des selles
- E- La présence d'embryon hexacanthé

11-les formes parasitaires éliminés par l'homme au cour d'un teaniasis par teania saginata

A-.....

B- le kyste à 4 noyaux

C-la larve

D-Anneaux contenant des œufs

E-.....

12- Parmi ces propositions concernant Echinococcus granulosus (la réponse fausse)

A-c'est un céstode

B-le vert adulte mesure quelque milimitres

C-l'hôte définitif est le chien

D-les œufs contiennent un embryon hexacanthé

E-l'homme se contamine par l'ingestion de viande du mouton

13-parmi ces propositions concernant le fasciola hepatica

A-c'est un nématode

B-elle pond des œufs embryonné

C-elle a pour hôte intermédiaire un mollusque d'eau douce

D- elle infeste l'hôte définitif sous forme de métacercare

E-elle est responsable d'une atteinte hépato-biliaire

14-parmi lesquelles des situations infectieuses suivantes sont observés dans une hyperéosinophile sanguine

A-Giardiose

B- Amibiase Hépatique

C-toxoplasmose

ResiPharmaTM

D- Bilharziose urinaire

E-Fascilose

15-la cuisson suffisante de la viande est l'une des mesures préventive vis-à-vis les parasitoses :

A-la fasciolose

B- la toxoplasmose

C- la teianiasis à teania saginata

D-Bilharziose

E-l'oxyurose

16-Dans la liste suivante les parasitose donnant habituellement une anemie

A-amibiase intestinale

B-teianiasis a teania saginata

C- kyste hydatique

D-giardiose

E- leishmaniose viscérale

17-Parmi les espèces de plasmodium suivantes ,quelles sont celles qui sont pathogène pour l'homme
(les bonnes réponses)

A- Plasmodium vivax

B- Plasmodium v

C- Plasmodium falciparum

D- Plasmodium ovale

E- Plasmodium ...

ResiPharmaTM

18-parmi les signes cliniques suivantes quelles sont ceux compatibles avec un accès palustre de
primo invasion

A-Fièvre

B-céphalée

C- Rideur méningée

D-photophobie

E-vomissement

19-chez un patient suspect de paludisme , quels sont les signes cliniques qui doivent faire craindre
une évolution vert(réponses fausses)

A-Fièvre en plateau à 39.5

B-Somnolence

C- abolition d'un réflexe ostéo-tendineux

D- vomissement

E-dyspnée

ResiPharmaTM

20-le diagnostic d'urgence du paludisme repose sur les techniques suivantes : (les bonnes réponses)

A- Goutte épaisse

B- Frottis sanguin

C- Sémiologie

D- PCR

E- QBC Malaria

- Q 14. Le diagnostic de viscéralisme à *Toxaria saginata* se fait par des lésions répondant :
- La présence d'œufs dans les selles
 - La présence d'œufs sur les surfaces lisses
 - La présence d'œufs trouvés dans les selles
 - La présence d'œufs trouvés par le malade en dehors des selles
 - La présence d'un embryon hexacanthé
- Q 15. La forme parasitaire éliminée par l'homme au cours d'un repas à *Toxaria saginata* (la bonne réponse) :
- La coque
 - Le kyste à 4 crochets
 - La larve
 - Acrocarion contenant des œufs
 - Le tétracanthé
- Q 16. Parmi ces propositions concernant l'*Echinococcus granulosus*, la réponse fautive :
- C'est un cestode
 - Le son adulte mesure quelques millimètres
 - L'hôte définitif est le chien
 - Ses œufs contiennent un embryon hexacanthé
 - L'homme se contamine par ingestion de la viande de mouton
- Q 17. Parmi ces propositions concernant le *Fasciola hepatica* (bonne réponse) :
- C'est un cestode
 - Elle pond des œufs embryonnés
 - Elle a pour hôte intermédiaire un mollusque d'eau douce
 - Elle utilise l'hôte définitif sous forme de métacercarie
 - Elle est responsable d'une hépatite hépatocellulaire
- Q 18. Parmi lesquelles des situations infectieuses suivantes observe-t-on une hyperéosinophilie sanguine (la bonne réponse) :
- Giardiase
 - Amibiase hépatique
 - Trochanisme
 - Bilharziose urinaire
 - Fasciolose
- Q 19. La cuisson suffisante de la viande est l'une des mesures préventives vis-à-vis des parasites suivants (la bonne réponse) :
- La fasciolose
 - La trépanose
 - La trépanose à *Toxaria saginata*
 - La bilharziose urogénitale
 - L'oxyurose
- Q 20. Dans la liste suivante indiquez le (les) parasites donnant habituellement une infection (la bonne réponse) :
- Amibiase intestinale
 - Trépanose à *Toxaria saginata*
 - Kyste hydatidique
 - Giardiase
 - Leishmaniose viscérale
- Q 21. Parmi les espèces de *Plasmodium* suivantes, quelles sont celles qui sont pathogènes pour l'homme (les bonnes réponses) :
- Plasmodium vivax*
 - Plasmodium falciparum*
 - Plasmodium berghei*
 - Plasmodium malariae*
 - Plasmodium ovale*
 - Plasmodium coatneyi*
- Q 22. Parmi les signes cliniques suivants quels sont ceux compatibles avec un accès palustre de primo invasion non compliqué :
- Fèvre
 - Céphalées
 - Raideur méningée
 - Photophobie
 - Vomissements
- Q 23. Chez un patient suspect de paludisme, quels sont les signes cliniques qui doivent faire craindre une évolution vers une forme grave :
- Fèvre en plateau à 39,5°
 - Somnolence
 - Abolition d'un réflexe ostéo-tendineux
 - Vomissements
 - Dyspnée
- Q 24. Le diagnostic d'urgence du paludisme repose sur les techniques suivantes : (les bonnes réponses) :
- Goutte épaisse
 - Frottis sanguin
 - Sérologie
 - PCR
 - QBC Malaria®

ResiPharmaTM

Prénom

Date de naissance

CORRECTION

L'utilisation de la correction partiellement, annule la question.

Parasitologie Mycologie

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☒	☐	☐
Q2	☐	☐	☒	☐	☐
Q3	☒	☐	☒	☐	☒
Q4	☐	☐	☒	☒	☐
Q5	☒	☒	☒	☐	☒
Q6	☐	☐	☐	☒	☐
Q7	☐	☒	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☒	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☒
Q10	☐	☒	☐	☒	☐
Q11	☐	☐	☐	☒	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☒
Q13	☐	☐	☒	☒	☒
Q14	☐	☐	☐	☒	☒
Q15	☐	☒	☒	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☐	☒
Q17	☒	☐	☒	☒	☐
Q18	☒	☒	☐	☐	☒
Q19	☐	☒	☒	☐	☒
Q20	☒	☒	☐	☐	☒

Page 5 de 7

ResiPharmaTM

Parasitologie Mycologie - 12/12/2018 - Pr. Z. BENMANSOUR

Epreuve
811291