

Code candidat
Nom
Prénom
Date de naissance / /

Remarques :

À l'usage du STYLO Noir ou Bleu, cochez à l'intérieur des cases sans les dépasser de la manière suivante

Exemple : Si B et D sont justes, cochez par Une CROIX:

Q4 : A B C D E
☐ ☒ ☐ ☒ ☐

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, pourrait annuler la correction et la notation automatique de la question.

ResiPharmaTM

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☒	☐	☒
Q2	☐	☒	☒	☒	☒
Q3	☐	☒	☒	☒	☒
Q4	☒	☒	☒	☒	☐
Q5	☒	☐	☐	☐	☒
Q6	☒	☐	☒	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☒
Q8	☐	☒	☐	☒	☐
Q9	☒	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☒	☐	☒	☐
Q11	☒	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☒	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☒	☐
Q14	☒	☒	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☒
Q16	☐	☐	☐	☒	☐
Q17	☒	☐	☐	☒	☐
Q18	☐	☐	☐	☒	☒
Q19	☐	☐	☐	☐	☒
Q20	☐	☐	☐	☒	☐

Dr. SAIM . B
Résident en
Parasitologie - Mycologie
Médicale

1 Concernant les infections à malassezia (Donnez les bonnes réponses) :

- A. L'agent pathogène appartient aux levures commensales
- B. Elles sont contagieuses
- C. Immunodépression favorise leur apparition
- D. Le traitement repose sur la corticothérapie
- E. L'agent pathogène appartient aux levures lipophiles et kératinophiles.
- F. ACE

2 Quelles sont les champignons dimorphiques à transmission, aérien (donnez les bonnes réponses)

- A. *Sporothrix schenckii*
- B. *Coccidioides immitis*
- C. *Paracoccidioides brasiliensis*
- D. *Histoplasma capsulatum*
- E. *Blastomyces dermatitidis*
- F. BCDE

3 Quels sont les symptômes de la vaginite à candida ? (Donnez les bonnes réponses)

- A. leucorrhées verdâtres
- B. leucorrhées Blanchâtre
- C. prurit intense
- D. brulures vulvaires
- E. leucorrhées Grumeleuses
- F. BCDE

4 A propos des affections au cours du sida :(Donnez les bonnes réponses)

- A. Localisations inhabituelles,
- B. Fréquence des rechutes,
- C. Nécessitent un traitement prophylactique
- D. Le diagnostic de routine est insuffisant
- E. Sérodiagnostic a un intérêt majeur
- F. ABCD

5 Quelles sont les affections qui apparaissent lorsque les CD4 sont inférieures à 100 ?

- A. Cryptococcose
- B. Pneumocystose
- C. Candidose
- D. Leishmaniose
- E. Cryptosporidiose
- F. AE

6 Les mycétomes sont :(Donnez les bonnes réponses)

- A. Des affections chroniques
- B. Des infections qui régressent spontanément chez l'immunocompétent
- C. Les agents pathogènes sont des saprophytes du sol et les épineux
- D. La contamination est aérienne
- E. Est une infection douloureuse
- F. AC

7 L'aspergillose pulmonaire invasive est caractérisée par(cochez la réponse fausse)

- A. c'est une pneumopathie localisée
- B. elle touche surtout l'immunodéprimé
- C. elle est de mauvais pronostic
- D. son diagnostic repose sur la radiologie, l'examen direct et la mise en culture
- E. son traitement repose sur l'instauration d'une antibiothérapie.
- E

8 Lors d'une candidose systémique (Donnez les bonnes réponses)

- A. La localisation cutanée est initiale
- B. La dissémination est hématogène
- C. Se manifeste par une fièvre répondant aux antibiotiques
- D. Le diagnostic repose sur l'hémoculture
- E. Le Traitement repose sur l'utilisation d'antifongique locaux
- F. BD

9 Au cours du SIDA les parasitoses sont caractérisées par les propositions suivantes sauf une, laquelle ?

- A. Il existe une immunité innée antiparasitaire
- B. Les protozoaires sont en partie éliminés par les lymphocytes T CD4
- C. La dissémination des parasites est fréquente à partir d'un foyer primitif
- D. Les rechutes sont fréquentes au cours des parasitoses

ResiPharmaTM

Y. EENWANSOU
CHEF DE SERVICE
Parasitologie et Mycologie
C. H. U.
ORAN

Les maladies parasitaires opportunistes sont possibles pour $CD4 \leq 100$

F. A

10 L'onychomycose candidosique : (choisissez les bonnes réponses):

- A. Est due à une contamination interhumaine
- B. Débute par l'atteinte du bord proximal de l'ongle
- C. Débute par l'atteinte du bord distal de l'ongle
- D. Est secondaire à un périonyxis
- E. Le traitement, de première intention, repose sur des antifongique par voie orale
- F. BD

11 La trichinellose : cochez la bonne réponse

- A. Transmise à l'homme par ingestion de viande crue ou peu cuite contaminée.
- B. Due à un nématode ovipare.
- C. Le cycle de vie est simple monoxène.
- D. La clinique est souvent asymptomatique.
- E. Le diagnostic est basé sur l'examen parasitologique des selles.
- F. A

12 L'oxyure : cochez (la réponse fausse)

- A. Est un nématode cosmopolite.
- B. Se transmet par la viande non cuite.
- C. Récidive facilement.
- D. Le diagnostic est basé sur le scotch test.
- E. Les œufs doivent être recherchés sur la marge anale.
- F. B

13 Les nematodes per-os : (cochez la réponse fausse)

- A. Sont des vers ronds à corps cylindrique non segmenté
- B. L'ascaris est le plus grand nématode intestinal de l'homme
- C. Les œufs de *Trichuris trichiura* sont ovalaires en citron, obturés par 2 bouchons muqueux
- D. Le diagnostic de *Trichuris trichiura* est basé sur le scotch test
- E. La toxocarose est due à la présence intra-tissulaire des larves d'ascaris du chien ou du chat
- F. D

14 la microsporidiose est une : (indiquez les bonnes réponses)

- A. est une affection opportuniste
- B. la contamination se fait par voie hydrique
- C. le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie
- D. le diagnostic repose sur la mise en évidence du parasite dans le sang (frottis sanguin)
- E. la contamination se fait par pique d'insecte.
- F. AB

15 *Strongyloides stercoralis* : (cocher la réponse exacte)

- A. L'adulte parasite est un ver rond hématophage.
- B. La femelle parthénogénétique pond des œufs qui sont fréquemment retrouvés dans les selles.
- C. Est caractérisé par un cycle endogène fréquent retrouvé au cours d'une antibiothérapie prolongée.
- D. Contamination par passage transcutané de la larve strongyloïde infestante à double renflement oesophagien
- E. Peut conduire à un syndrome de larva currens.
- F. E

16 laquelle de ses méthodes permet le diagnostic direct de l'ankylostomose (cocher la réponse exacte)

- A. L'examen d'un frottis sanguin
- B. L'examen d'un culot urinaire
- C. La biopsie rectale
- D. La recherche d'œufs dans les selles
- E. La recherche d'anticorps spécifiques du sang
- F. D

17 Parmi les affirmations suivantes concernant *Cryptococcus neoformans*, cochez les réponses fausses

- A. Cette levure est non encapsulée
- B. Elle a un tropisme pour le système nerveux central
- C. La contamination peut se faire par voie aérienne
- D. Infection fréquente chez les sidéens avec un taux de $CD4 < 200$ élément/mm³
- E. Elle est habituellement sensible à l'amphotéricine B
- F. AD

18 Le diagnostic de la pneumocystose est basé sur : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

- A. La recherche de levures encapsulées par la coloration de Gomori-Groth
- B. L'isolement de *Pneumocystis jirovecii* sur milieu sabouraud
- C. La recherche d'anticorps dans le liquide broncho-pulmonaire
- D. Par la technique de l'immunofluorescence indirect
- E. La recherche d'ADN de *Pneumocystis jirovecii* par la PCR

ResiPharmaTM

r. **DE DE**
19 Parmi les affirmations suivantes concernant la Microsporidiose, cochez la réponse fausse
A. Mycoses cosmopolites opportunistes touchant principalement les sujets ID
B. Les principales sont : Enterocytozoon bienersi et Encephalitozoon intestinalis
C. La contamination s'effectue très probablement par voie orale
D. Chez les sujets immunodéprimés il en résulte une diarrhée aiguë évoluant vers la chronicité
E. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des filaments dans les prélèvements biologiques
F. E

20 Parmi ces propositions concernant l'anguillulose, : (cochez la réponse fausse)

- A. Est fréquente en zone tropicale
- B. Est responsable d'une hyperéosinophilie oscillante
- C. Elle persiste pendant de nombreuses années chez l'être humain
- D. Se traite par le praziquantel
- E. Est aggravée par la corticothérapie
- F. D

Pr BENANSOUR Z.
CHEF DE SERVICE
Parasitologie et Mycologie
C.H.U. ORAN

