

Q01. *Balantidium coli* : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

- A. C'est un protozoaire cilié responsable parasitose digestive.
- B. Existe sous une seule forme végétative.
- C. Est un parasite cosmopolite.
- D. Peut provoquer un syndrome dysentérique.
- E. Peut provoquer des complications chez les immunocompétents.
- F. **ADC**

Q02. Le kyste hydatique : *Echinococcus granulosus* : cochez la bonne réponse

- A. Vit à l'état adulte dans l'intestin grêle des herbivores.
- B. L'homme se contamine en dévorant les viscères hydatifères du mouton.
- C. Localisation principale au niveau du poulmon.
- D. La découverte clinique est souvent fortuite.
- E. Facilement ponctionnables, ce qui permet un diagnostic parasitologique direct.
- F. **D**

Q03. Schistosomoses : Bilharzioses : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

- A. Sont des trématodes à sexe séparés, Vivant adulte dans l'intestin.
- B. *Schistosoma mansoni* responsable de la bilharziose artério-veineuse.
- C. Les œufs de *Schistosoma mansoni* sont caractérisés par un éperon latéral.
- D. La contamination se fait à l'occasion d'un bain en eau douce, La forme infestante est un miracidium.
- E. Le diagnostic en phase d'invasion est principalement sérologique.
- F. **CE**

Q04. *Schistosoma haematobium* : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

- A. La seule espèce de *Schistosoma* retrouvée en Algérie.
- B. La Réaction allergique au point de pénétration est importante.
- C. Responsable de Bilharziose uro-génitale et le maître symptôme est l'hématurie.
- D. La complication clinique : formation des granulomes au niveau de la muqueuse vésicale.
- E. Le diagnostic repose principalement sur une biopsie vésicale.
- F. **AD**

Q05. Dans la toxoplasmose le mode de contamination par les kystes peut s'effectuer par : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

- A. Ingestion de crudités souillées de terre.
- B. Ingestion de viande mal cuite.
- C. Le contact avec le chat.
- D. Les greffes d'organes.
- E. Transmission trans-placentaire.
- F. **BD**

Q06. Concernant la toxoplasmose : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

- A. Due à un protozoaire extracellulaire *Toxoplasma gondii*.
- B. Les femmes non immunisées nécessitent une surveillance sérologique mensuelle.
- C. La séroconversion est définie par le passage d'une sérologie positive à une sérologie négative.
- D. Les tachyzoites sont les formes de multiplication et dissémination.
- E. Les oocystes sont les formes de résistance dans le milieu extérieur.
- F. **BDE**

Q07. Concernant les leishmanioses en Algérie : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

- A. La leishmaniose viscérale est largement répandue au sud.
- B. *Leishmania infantum* est l'agent responsable de la leishmaniose cutanée zoonotique.
- C. *Leishmania infantum* est l'agent responsable de la leishmaniose cutanée sporadique du nord.
- D. Le chien est le réservoir de la leishmaniose viscérale.
- E. *Leishmania major* est l'agent responsable de la leishmaniose viscérale.

C D

PI ENMANSSOUR Z.
CHIEF DE SERVICE
Parasitologie et Mycologie
C.H.U. ORAN

ResiPharmaTM

Q08.A propos des arthropodes : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

- A. L'anophèle femelle transmet *Plasmodium* sp.
- B. *Sarcoptes scabiei* hominis est un acarien hematophage dont la femelle fécondée creuse dans l'épiderme de l'homme une galerie dans laquelle est pond les œufs.
- C. Le mâle de phlébotome sp est le vecteur de *Leishmania* sp en Algérie.
- D. La scabiose est une ectoparasitose dont les lésions chez l'adulte siègent essentiellement au niveau du visage, la paume des mains et les plantes des pieds.
- E. La scabiose se manifeste par un prurit intense à prédominance nocturne.
- F. **AE**

Q09. Quelles sont les propositions qui caractérisent l'amœbose hépatique ? (Donnez les bonnes réponses)

- A. Une fièvre précoce en plateau de 39-40°C.
- B. Apparaît, obligatoirement, après un épisode dysentérique.
- C. Une altération de l'état général.
- D. Un abcès du foie.
- E. Une douleur de l'hypocondre droit.

Reponses : A,C,D,E

Q10. Parmi les parasites suivants, lesquels provoquent des diarrhées ? (Donnez les bonnes réponses)

- A. *Entamoeba histolytica*
- B. *Faciola gigantica*
- C. *Giardia intestinalis*
- D. *Cryptosporidium* sp
- E. *Trichomonas vaginalis*

Reponses : A, C,D,

ResiPharmaTM

Q11. Quel est le mode de contamination par *Taenia solium* : (Donnez la bonne réponse)

- A. Ingestion de crudités contenant des œufs embryonnés
- B. Ingestion de larves cysticerques
- C. Pénétration transcutanée de la forme larvaire
- D. Ingestion de viande bovine peu ou pas cuite
- E. ingestion d'eau contaminé par des embryophores

Reponse B,

Q12. Concernant les distomatoses pulmonaires : (donnez les bonnes réponses)

- A. Elles sont aussi appelées paragonimoses
- B. La contamination se fait par voie orale
- C. L'infestation se fait par ingestion de poisson cru
- D. La forme infestante est la métacercare
- E. Le diagnostic repose sur l'examen des selles

Reponse : A,B,D

Q13. Le téniasis à *Teniasaginata* est caractérisé par : (donnez les bonnes réponses)

- A. C'est une anthroponose ✓
- B. Un prurit anal
- C. Alternance de diarrhée et de constipation
- D. Se complique par une cysticercose.
- E. Le diagnostic est indirect

Reponse : B,C

Q14. Quels est la deuxième phase de l'évolution clinique de la trypanosomiase africaine: Donnez la bonne réponse)

- A. Un chancre d'inoculation

PI BENMANSOUR Z.
CHIEF DE SERVICE
Parasitologie et Mycologie
C.H.U. ORAN

- C. Des troubles neurologiques
- D. Un chagome
- E. Un éléphantiasis

Réponse : B

Q15. Dans quels cas suspecte-on un paludisme chez une personne ayant séjourné dans un pays d'Afrique sub-saharienne ? (Donnez les bonnes réponses)

- A. Fièvre
- B. Vomissement
- C. Myalgie
- D. céphalées
- E. Adénopathies

REPOSE A,B,C,D

Q16. Concernant la clinique du paludisme (donnez les bonnes réponses):

- A. La phase d'invasion est silencieuse,
- B. la phase d'état est accompagnée d'une anémie
- C. La phase d'incubation se manifeste par de la fièvre,
- D. La phase d'état correspond aux schizogonies érythrocytaires,
- E. Le tableau clinique en phase d'invasion est totalement non spécifique

REPOSE : B,D,E

Q17. Quelles sont les parasites contractés par l'ingestion de viande crue ou mal cuite :

- A. *Diphyllobothrium latum*
- B. *Sarcocystis*
- C. *Taenia saginata*
- D. *Fasciola hepatica*
- E. *Hymenolepis nana*

REPOSE : B-C

Q18. Le vecteur du paludisme : (donnez la bonne réponse) :

- A. est un moustique, mâle, du genre Anophèles
- B. est un moustique, femelle, du genre Aedes
- C. est un crustacé du genre cyclops
- D. pique à partir du coucher du soleil
- E. pique à partir du lever du soleil

REPOSE : D

19 Concernant le *Giardia intestinalis*:

- A. Est un flagellé cosmopolite
- B. Pathogène même chez les sujets immunocompétents
- C. Insensible au métronidazole
- D. peut être éliminé sous forme de kyste dans les selles
- E. Responsable de diarrhée glairo-sanglante

Réponse: A, B, D

Q20 : la microsporidiose est une : (indiquez les bonnes réponses)

- A. est une affection opportuniste
- B. la contamination se fait par voie hydrique
- C. le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie
- D. le diagnostic repose sur la mise en évidence du parasite dans le sang (frottis sanguin)
- E. la contamination se fait par piqure d'insecte.

REPOSE : A, B.

ResiPharmaTM

Reçu du Qc A

PT BENNANSOUR Z.
CHEF DE SERVICE
Parasitologie et Mycologie
C.H.U. ORAN

Code candidat

Nom

Prénom

Date de naissance

Remarques :

Cette fiche doit être remplie avec un stylo ou feutre noir.

Vous devez cocher à l'intérieur des cases sans les dépasser de la manière suivante.

☒ ■

CORRECTION



	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☒	☒	☐
Q2	☐	☐	☐	☒	☐
Q3	☐	☐	☒	☐	☒
Q4	☒	☐	☒	☒	☐
Q5	☐	☒	☐	☒	☐
Q6	☐	☒	☐	☒	☒
Q7	☐	☐	☒	☒	☐
Q8	☒	☐	☐	☐	☒
Q9	☒	☐	☒	☒	☒
Q10	☒	☐	☒	☒	☐
Q11	☐	☒	☐	☐	☐
Q12	☒	☒	☐	☒	☐
Q13	☐	☒	☒	☐	☐
Q14	☐	☒	☐	☐	☐
Q15	☒	☒	☒	☒	☐
Q16	☐	☒	☐	☒	☒
Q17	☐	☒	☒	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☒	☐
Q19	☒	☒	☐	☒	☐
Q20	☐	☐	☐	☐	☐

Pr. BENMANSOUR Z.
CHER DE SERVICE
Parasitologie et Mycologie
C.H.U. ORAN