

1^{ERE} ANNEE PHARMACIE

Nom: ZEYOUR

Prénom: ACHOIAK

Date de naissance: 01/01/2021

Département de Pharmacie EMD 1 en Parasitologie-Mycologie
 de correction: partiel 03/04/2021
 Durée: 1h Système

- 1/ *Naegleria fowleri* est
 - a- un être vivant unicellulaire
 - b- protozoaire flagelé sanguicole
 - c- un hematozoaire
 - d- s'élimine dans les selles
- 2/ L'encephalite amibienne granulomateuse est
 - a- maladie du péril fécal
 - b- à transmission sanguine
 - c- à transmission aërienne
 - d- une maladie grave
- 3/ *Dientamoeba fragilis*
 - a- protozoaire rhizopode
 - b- protozoaire flagellé
 - c- sporozoaire
 - d- amibe
- 4/ La leishmaniose cutanée est une maladie
 - a- à transmission vectorielle
 - b- maladie du péril fécal
 - c- existe en Algérie
 - d- mortelle en l'absence du traitement
- 5/ La forme amastigote de *Leishmania*
 - a- est la forme transmise par l'hôte intermédiaire
 - b- forme mobile
 - c- forme flagellée
 - d- rencontrée chez l'hôte vertébré
- 6/ La leishmaniose viscérale
 - a- existe en Algérie
 - b- strictement infantile
 - c- touche également les adultes
 - d- à transmission vectorielle
- 7/ La ponction de moelle osseuse
 - a- technique non invasive
 - b- permet un diagnostic de certitude
 - c- permet un diagnostic d'orientation
 - d- indiquée dans la leishmaniose cutanée
- 8/ le cycle asexué du *Plasmodium* est
 - a- un cycle gamogonique
 - b- un cycle sporogonique
 - c- un cycle schizogonique
 - d- strictement hépatique
- 9/ Au cours du Paludisme l'immunité est
 - a- lente
 - b- acquise en quelques mois
 - c- non spécifique de l'espèce responsable
 - d- progressive
- 10/ Au cours du Paludisme l'anémie est due à
 - a- l'éclatement des macrophages parasités
 - b- l'éclatement des corps bleus
 - c- l'éclatement des rosaces
 - d- une hémolyse

ResiPharmaTM

11/ Au cours de l'amibiase aiguë (phase maladie)

- a- le malade est transmetteur de la maladie
- ☒ b- la parasitologie des selles retrouve uniquement la forme végétative d'*Entamoeba histolytica histolytica*
- c- les formes extra-cobiques sont possibles
- d- le malade ne présente aucun signe clinique

12/ *Trichomonas vaginalis*

- ☒ a- se transmet sexuellement
- b- sa forme kystique est très résistante dans le milieu extérieur
- c- l'homme présente en cas d'infestation, des signes cliniques patents (majeurs)
- d- son diagnostic nécessite le recours à la sérologie

13/ Différence entre babésiose et paludisme

- ☒ a- présence d'hématozoïte dans le paludisme
- b- présence de forme géminée dans la babésiose
- c- la fièvre n'est pas rythmée dans la babésiose
- d- présence de la forme annulaire dans la babésiose et le paludisme

14/ Au cours de la Bilharziose

- ☒ a- le miracidium est la première forme larvaire
- b- le sporocyste primaire est la deuxième forme larvaire
- c- le sporocyste secondaire est la troisième forme larvaire
- d- le furcocercarie est la forme infestante de la maladie

15/ Au cours de la phase de migration larvaire de la Schistosomiase, on peut trouver

- ☒ a- présence d'œufs dans les urines
- b- hyperéosinophilie
- c- une sérologie bilharzienne positive
- d- granulomes Bilharziens hépatiques

16/ La sérologie de la Toxoplasmose

- a- les IGM sont les premiers anticorps à apparaître
- b- il faut refaire le taux des IGM et des IGG pour pouvoir interpréter une sérologie de la Toxo
- ☒ c- en cas d'immunisation, les IGG restent à un taux élevé pendant toute la vie (taux résiduel)
- d- l'absence d'IGM n'implique pas toujours l'absence d'une Toxo

17/ Une femme enceinte non immunisée contre la Toxo doit

- ☒ a- éviter le contact avec les chats
- b- manger de la viande bien cuite
- c- abandonner ses contrôles sérologiques
- d- laver correctement les aliments

18/ une femme enceinte avec une sérologie: IGM - IGG faiblement + quelle est l'interprétation juste

- a- immunisée
- b- Toxo évolutive
- c- non immunisée
- ☒ d- refaire les IGG pour pouvoir interpréter

19/ *Taenia saginata*

- ☒ a- le ver est solitaire
- b- les anneaux se détachent au moment de la défécation
- c- les pores génitaux sont irrégulièrement alternés
- d- la prise de la tredemine se fait après les repas

20/ *Taenia solium*

- ☒ a- l'hôte intermédiaire est le porc
- b- les œufs de *Taenia saginata* et *solium* sont morphologiquement identiques
- c- les pores génitaux sont régulièrement alternés
- ☒ d- la contamination se fait en ingérant de la viande de porc mal cuite

ResiPharmaTM



Université de Sétif 1
FACULTÉ DE MEDECINE

4EME ANNEE PHARMACIE/EXAMEN DE PARASITOLOGIE EMD1 2020-2021

Page 1/1

Date de l'épreuve : 03/04/2021

Corrigé Type
Barème par question : 1,000000

N°	Rép.
1	A
2	D
3	B
4	AC
5	D
6	ACD
7	B
8	C
9	AD
10	CD
11	BC
12	A
13	ABCD
14	ABCD
15	BC
16	AD
17	ABD
18	D
19	AC
20	ABCD

