

Nom : ... Prénom : ...

Cochez la ou les réponses justes

1/ *Tænia saginata* :

a-est un cestode pseudophyllidé

✓ ☒ b-le scolex du parasite adulte est muni d'un rostre inerme

✓ ☒ c-transmis par la consommation de la viande bovine

d-est un ver vivipare

2/*diphyllobotrium latum* :

✓ ☒ a-est hermaphrodite

☒ b-est un ver a transmission transcutanée

c-le corps du parasite est recouvert par une cuticule chitineuse

d-les œufs éliminés sont embryonnés à la ponte

ResiPharmaTM

3/le paludisme autochtone en Algérie : métropolitain par piqûre d'anophèles

✓ ☒ a- sévit à l'état sporadique au niveau du sud Algérien

b-est du principalement a Plasmodium ovale **P. vivax**

✓ ☒ c-est devenu vulnérable et réceptif par la présence d'un biotope favorable au développement des anophèles.

d-aucune réponse n'est juste

4/au cours du paludisme, la prémunition:

a-est une immunité protectrice pour les enfants de moins de 5 ans en zone d'endémie

✓ ☒ b-est d'installation d'autant plus précoce que la transmission est forte et stable

c-est complète et permet de stériliser le réservoir du parasite

immunité faible

✓ ☒ d- dépend de la maintenance chez l'hôte du parasite vivant

5/Une infection à *Plasmodium falciparum* se caractérise :

✓ ☒ a- Par des accès de fièvre intermittents survenant toutes les 48h **+P vivax +p ovale**

☒ b- Par des accès de fièvre intermittents survenant toutes les 72h **P malariae**

✓ ☒ c- Par sa résistance constante à la chloroquine


P.M + PV+P.O sensibilent a chloroquine / pour l'enceinte saule la quinine

d-aucune réponse n'est juste

**6a8 ans
apres
l'infestation**

6/le schéma 1 représente une :

- ✓ a-fièvre quarte bénigne a Plasmodium malariae
- b-fièvre tierce bénigne a plasmodium falciparum
- c-fièvre quarte maligne a Plasmodium malariae
- ✓ d-fièvre quarte bénigne a Plasmodium falciparum



7/Les hymenolépидidés :

- a-sont des vers plats non segmentés
- ⓑ une seule espèce est pathogène pour l'homme
- c-la contamination de l'homme se fait uniquement par ingestion des œufs
- ✓ d-l'hôte intermédiaire est un insecte

8/Quels sont les stades de développement des Plasmodium qui peuvent être observés sur un frottis sanguin ?

- ✓ a- Schizonte mur
- ✓ b- Gamétocyte

- c- Sporozoite + ookinete en troue dnt
- d- Oocyste dans le moustique

9/ Le parasite responsable de la leishmaniose viscérale infantile est: **toche les enfants 1-5ans**

- a- Leishmania donovani
- ✓ ⓑ Leishmania infantum le resevoir est le chien le vecteur PH . perniciosus region setif+kabyle
- c- Leishmania major resevoir : merion vecteur : PH papatasi region: sud alg biskra/msila est spicifique a L.Cutanee
- d- La variante enzymatique de Leishmania infantum

10/ Le vecteur de la leishmaniose cutanée sud Algérien est:

- ⓐ Phlébotomus perniciosus L.V region : humide + sub humide kabyle + setif
- ✓ ⓑ Phlébotomus papatasi
- c- Meriones shawi est le resevoir
- d- Phlébotomus perfiliewi L.C pour tout la nord alg

11/Le réservoir de la leishmaniose viscérale infantile est:

- a- L'homme
- ✓ ⓑ Le chien domestique +L.C dnt tout le nord alg
- c- Les rongeurs sauvages
- d- Le phlébotome femelle

12/Le diagnostic de certitude de la babesiose repose sur:

- ✓ ⓐ Présence de forme géminée ou en tétrade sur le frottis form en poire
- b- Toutes les espèces de babesia renferment le pigment palustre absence de pigments
- ✓ ⓑ Maladie rencontrée chez le splénectomisé 80%
- ✓ ⓓ La babesiose ne provoque jamais d'accès fébrile + absencee de pigments + polyparasitemie

ResiPharmaTM

13/ On trouve *Entamoeba histolytica* dans les selles:

- ☒ a- Au cours de la phase de rémission kyste+ EHM
- b- Chez les porteurs sains E.H.M
- ☒ c- Au cours de l'amibiase infestation non pathogène forme kyste de minuta chez les sains
- ☒ d- Au cours de l'amibiase maladie E.H.H

14/ On trouve *Entamoeba histolytica* minuta forme kystique dans les selles:

- ☒ a- Au cours de la phase de rémission transforment vers la forme minuta pour s'encyster et s'éliminer par les selles
- ☒ b- Chez les porteurs sains E.H.M vers kystes
- ☒ c- Au cours de l'amibiase infestation ou cycles non pathogènes
- ☒ d- Dans les localisations extra coliques jamais sans rémission = E.H.H dans le sang

15/ *Naegleria fowleri*

- ☒ a- responsable de la cachexie somnolente Trypanosoma brucei gambiense (ouest africain)
- b- touche les sujets immunodéprimés touche les sujets jeunes bien portants, mais *Acanthamoeba* touche immunodéprimés
- ☒ c- est thermorésistante avec kyste + thermophile 40-50°C
- d- se transmet par voie orale voie hydrique

16/ La kératite amibienne

- ☒ a- due à une infection par *Acanthamoeba*
- b- le diagnostic est immunologique grattage de cornée ou liquide de lentille + le dgc immuno non utilisé dans les amibes
- ☒ c- la contamination favorisée par le port des lentilles
- d- évolution défavorable malgré un traitement précoce

17/ la phase méningo-encéphalitique (polarisation cérébrale)

- a- traduit la dissémination à tout le système histiocytaire
- ☒ b- traduit l'envahissement du système nerveux central
- c- se traduit par des signes cliniques bénins
- ☒ d- mortelle En l'absence du traitement.

ResiPharmaTM

18/ *Cyclospora cayentanensis*

- a- se transmet par l'ingestion de viande mal cuite contamination est hydrique et alimentaire (produits crus, frais non épluchés)
- b- se transmet lors d'une baignade
- c- se transmet par un vecteur hématophage
- ☒ d- diagnostic par examen des selles

19/ *Isospora belli*

- ☒ a- parasite opportuniste intestinale de l'homme
- ☒ b- liée au péril fécal
- ☒ c- colorée en rouge par Ziehl modifié
- d- guérison toujours spontanée chez l'immunodéprimé diarrhée chronique

20/ *Sarcoptes scabiei* :

- ☒ a- agent de la gale
- b- détermine une dermatose du visage
- c- détermine une blépharite
- d- les femelles sont responsables du tableau clinique

Corrigé type : parasitologie

1	b - c
2	a
3	a - c
4	b - d
5	a - c
6	a
7	d
8	a - b
9	b
10	b
11	b
12	a - c - d
13	d
14	a - b - c
15	c
16	a - c
17	b - d
18	d
19	a - b - c
20	a