

Première EMD de parasitologie

1. *Entamoeba histolytica* trophozoite
- a- Est une forme végétative de *Entamoeba*
 - b- Est la forme intestinale de l'amibiase
 - c- Est une forme différente d'*Entamoeba dispar*
 - ☒ d- Est responsable du cycle non pathogène commensal
2. L'amibiase extra-intestinale
- a- Est spontanément résolutive chez l'immunocompétent
 - ☒ b- Est caractérisée par un tableau clinique spécifique fébrile
 - c- Est diagnostiquée par la recherche de kystes dans les selles
 - d- Est diagnostiquée par la recherche d'amibes dans le pus chocolat
3. La kératite amibienne
- a- Est due à la forme végétative flagellée de *Naegleria fowleri*
 - b- Atteint les sujets immunodéprimés
 - ☒ c- Est diagnostiquée par la recherche de kystes d'*Acanthamoeba* dans les lésions
 - d- Est traitée par les diamines aromatiques et l'amphotéricine B
4. *Acanthamoeba* sp
- a- Est responsable de méningo-encéphalites amibiennes primitives
 - ☒ b- Est responsable d'encéphalites amibiennes granulomateuses
 - c- Est retrouvé dans les eaux de mer
 - ☒ d- Peut contaminer l'homme par voie nasale
5. *Plasmodium malariae*
- a- Est transmis par un insecte vecteur le phlébotome femelle
 - ☒ b- Est une espèce prédominante en Asie
 - ☒ c- Est responsable de rechute 20 ans après un accès palustre
 - d- Est responsable de fièvre tierce bénigne
6. La fièvre bilieuse hémoglobinoïdique
- a- Est dû à des accès palustres répétés chez l'enfant
 - ☒ b- Est dû à la prise anarchique de quinine
 - c- Est caractérisé par une parasitemie sanguine
 - d- Est dû au dépôt de complexes immuns dans les tissus
7. L'isosporeose
- a- Est due à l'ingestion d'oocystes non sporulés de *Isospora belli*
 - ☒ b- Atteint les sujets immunodéprimés avec des CD4 < 100 éléments/mm³
 - c- est diagnostiqué sur frottis fécal coloré au MGG
 - d- Est diagnostiqué sur frottis fécal coloré au Ziehl-Nielsen modifié (à froid)

ResiPharmaTM

3. L'hydathidose chez l'homme

- a. Est une impasse parasitaire vraie
- ☒ b. Est une impasse parasitaire de circonstance
- ☒ c. La rupture du kyste peut être mortelle
- d. Le diagnostic se fait par la visualisation des protozoaires dans les selles

9. Le prurit anal est le symptôme majeur de:

- a. L'Anguillulose
- b. L'Ancylostomose
- ☒ c. L'Oxyurose
- d. La Bilharziose

10. Quel(s) parasite(s) est/sont hémaphophage(s)?

- a. Ascaris
- ☒ b. Ancylostomes
- ☒ c. Tricochéphale
- d. Trichinella

11. Fasciola hepatica :

- a. Est un némathelminthe
- b. Est vivipare
- ☒ c. Se transmet à l'homme par voie orale
- d. Toutes les réponses sont fausses

12. La fasciolose à Fasciola hepatica :

- ☒ a. L'examen parasitologique des selles retrouve des œufs de F. hepatica
- b. L'examen parasitologique des selles retrouve des larves
- c. Les adultes vivent dans les veines mésentériques
- d. La forme infestante est l'œuf embryonné

13. Les ankylostomes :

- a. Sont des vers plats hémaphophages
- b. Leurs œufs sont embryonnés à la ponte
- c. La technique de Baermann et Lee est la technique de choix pour leur diagnostic
- ☒ d. Toutes les réponses sont fausses

14. L'anguillule :

- a. Est un ver hémaphophage
- ☒ b. Peut être responsable d'un cycle d'auto infestation
- c. La forme infestante est la larve retrouvée dans les selles
- ☒ d. Se transmet à l'homme par voie transcutanée

15. Hymenolepis nana :

- ☒ a. Est un petit ver qui touche surtout les enfants
- ☒ b. L'infection peut disparaître spontanément à l'adolescence
- ☒ c. Peut être contracté par ingestion accidentelle du ver de farine
- d. Le diagnostic est basé sur la mise en évidence des proglottis dans les selles

16. Le Botriocéphale :

- ☒ a. Est le plus grand cestode
- ☒ b. Les animaux domestiques et sauvages constituent un réservoir
- ☒ c. Provoque une anémie macrocytaire
- ☒ d. La prise en charge associe le Praziquantel et la vitamine B12

ResiPharmaTM

17. *Taenia saginata* :

- ☒ a. Est appelé taenia bovine
- ☐ b. Evolue selon un cycle indirect monoxène
- ☐ c. La contamination humaine se fait par ingestion d'œufs
- ☐ d. N'existe pas en Algérie

18. Les cestodes parasites de l'Homme à l'état adulte :

- ☒ a. Sont des vers plats hermaphrodites
- ☐ b. Sont pourvus d'un tube digestif
- ☒ c. Sont classés en deux grands ordres
- ☐ d. L'Homme est un hôte intermédiaire accidentel

19. Les Schistosomoses :

- ☐ a. Sont des helminthiases dues à des plathelminthes cestodes qui vivent au contact de l'endothélium vasculaire
- ☐ b. La contamination de l'homme se fait par passage transcutané des adultes femelles à l'occasion d'un bain infestant dans une eau douce
- ☒ c. Les troubles cliniques observés au cours de la bilharziose sont essentiellement dus à l'action des œufs
- ☐ d. Lors de la bilharziose urogénitale, les œufs du parasite sont retrouvés dans les urines et sont caractérisés par la présence d'un éperon latéral

20. Les Schistosomoses :

- ☒ a. Le Praziquantel est un médicament qui agit sur les quatre espèces de schistosomes
- ☐ b. Une hyperéosinophilie modérée est observée au cours de la phase d'invasion
- ☐ c. Lors de la phase d'invasion, un examen parasitologique des selles permet de retrouver des œufs
- ☒ d. Les œufs de *Schistosoma haematium* peuvent continuer à être éliminés même après traitement

