

Cochez sur la grille, la ou les réponses qui vous semblent juste(s)

1- Le plasmodium

- a) son mode de reproduction est uniquement asexué
- b) son cycle est hétérozygote
- c) possède une phase extracellulaire chez l'hôte vertébré
- ☒ d) possède à son extrémité un « complexe apical »

2- *Plasmodium falciparum*

- a) est une espèce exclusivement africaine
- b) la gravité de l'affection qu'il provoque est due au phénomène de réviviscence
- ☒ c) induit la formation de « protrusions » sur la surface des GR infectés
- ☒ d) est responsable du neuropoludisme

3- *Trypanosoma brucei gambiense*

- a) est rencontré en Afrique de l'Est
- ☒ b) est agent d'une TBA exclusivement humaine
- c) existe aussi chez d'autres mammifères
- ☒ d) est rencontré en Afrique de l'Ouest

4- *Trypanosoma cruzi*

- a) est l'agent étiologique de la maladie de Chagas
- ☒ b) est responsable de la trypanosomose humaine américaine
- ☒ c) est rencontré chez plusieurs espèces animales
- ☒ d) peut prendre la forme amastigote intra cellulaire chez l'hôte définitif

5- Un parasite est un organisme qui vit aux dépens d'un hôte, il se distingue

- a) par sa taille plus importante
- b) par sa localisation chez l'hôte
- c) par son mode de transmission
- ☒ d) par son noyau

6- *Ascaris lumbricoïdes*

- ☒ a) est un nématode
- b) est un helminthe parasite de l'IG d'un grand nombre de vertébrés
- c) son cycle est direct court
- d) son cycle est indirect

7- La trichinellose

- a) est une nématodose liée au péril fécal
- ☒ b) Le cycle de l'agent étiologique est auto-hétéroxène
- c) Le diagnostic se fait par la recherche des œufs dans les fèces
- d) L'agent étiologique est transmis par voie per cutanée

8- Enterobius vermicularis

- a- Est l'agent de l'ascaridiose chez l'homme
- ☒ b- Est l'agent de l'oxyurose
- ☒ c- Peut causer un prurit anal
- d- Est un trématode

9- L'amibiase hépatique :

- ☒ a- Est toujours précédée par des manifestations intestinales aiguës
- ☒ b- S'accompagne d'une élévation des anticorps sériques
- c- S'accompagne toujours de la présence de kystes d'Entamoeba histolytica dans les selles
- d- toutes les propositions sont justes

10- Concernant les amibiases, une des propositions est fausse, laquelle ?

- a. Entamoeba histolytica histolytica est responsable de l'amibiase maladie
- b. Entamoeba histolytica histolytica est responsable du cycle pathogène
- ☒ c. Les formes minuta envahissent la sous muqueuse intestinale
- d. Les formes végétatives d'amibes sont mobiles

11- La cryptosporidiose :

- a. Ne touche jamais le sujet immunocompétent
- ☒ b. Sans traitement, elle est fatale chez le patient sidéen
- c. Une parasitose des zones tropicales
- ☒ d. L'eau constitue une importante source de contamination

12- La giardiose :

- ☒ a- Est une parasitose liée au péril fécal
- b- La sérologie est d'un grand intérêt pour son diagnostic
- ☒ c- La parasitologie des selles constitue le diagnostic de certitude
- d- Est due à un protozoaire de la classe des rhizopodes

13- L'anguillulose :

- a) Est due à un ver plat
- b) N'existe pas en Algérie
- c) son diagnostic est surtout sérologique
- ☒ d) toutes les réponses sont fausses

14- la fasciolose :

- a) Son mode de contamination se fait par voie transcutanée
- b) Son mode de contamination se fait par ingestion de crudités souillées par ses œufs
- ☒ c) S'accompagne d'une hyper éosinophilie
- ☒ d) La sérologie est d'un grand intérêt en phase de migration larvaire

ResiPharmaTM

15-La sérologie de la toxoplasmose d'une femme enceinte de 04 mois est : IgG
IgM négatif

- a) Cette femme est immunisée
- ☒ b) Cette femme est non immunisée
- c) Lui conseiller un test d'avidité
- ☒ d) Lui conseiller des mesures hygiéno-diététiques

16-Au 7ème mois de la grossesse, sa sérologie est la suivante : IgG= 3770UI /ml,

- ☒ a) Il s'agit d'une séroconversion
- b) Rassurer la femme et ne rien faire
- c) Lui conseiller les mesures hygiéno-diététiques
- d) Faire un test d'avidité

17-*Taenia saginata* :

- a) Est appelé ténia armé
- b) Evolue selon un cycle indirect monoxène
- c) Provoque un téniasis commun pour l'homme et l'animal
- ☒ d) L'hyper éosinophilie n'est pas un signe spécifique

18- les amibes libres :

- a) Toutes les espèces ont la même morphologie
- ☒ b) Sont bactériophages
- c) Sont toutes Contractées par baignade dans les eaux chaudes
- ☒ d) Responsables d'atteintes nerveuses mortelles

19- *Bothriocéphale* :

- ☒ a) Est un pseudophyllide
- b) Les animaux domestiques et sauvages constituent un réservoir
- ☒ c) Provoque une anémie macrocytaire
- d) Est très fréquent en Algérie

20-les cestodes parasites de l'homme à l'état adultes :

- ☒ a) Sont des vers plats hermaphrodites
- b) Classés sur la base de la morphologie des œufs
- c) L'homme est un hôte intermédiaire accidentel
- d) L'infestation humaine se fait par ingestion des œufs

ResiPharmaTM