

Cochez la ou les réponse(s) juste(s) :

1. L'intoxication par les organophosphorés peut être traitée par :
- ☐ A. Atropine.
 - ☐ B. Esérine.
 - ☐ C. Pyridostigmine.
 - ☒ D. Pralidoxime.
 - ☐ E. Malathion.
2. Les substances parasympatholytiques peuvent entraîner :
- ☒ A. Constipation.
 - ☒ B. Sécheresse buccale.
 - ☐ C. Rétention urinaire.
 - ☐ D. Augmentation des sécrétions bronchiques.
 - ☐ E. Bradycardie.
3. A propos des agonistes Beta adrénergiques :
- ☒ A. Les agonistes Beta 1 adrénergiques stimulent l'activité cardiaque.
 - ☐ B. Les agonistes Beta 1 adrénergiques provoquent une bradycardie.
 - ☐ C. Le Salbutamol (Ventoline®) est un bêta bloquant utilisé dans le traitement de l'asthme.
 - ☒ D. Le Salbutamol (Ventoline®) est un bêta 2 mimétique utilisé dans le traitement de l'asthme.
 - ☐ E. Les bêta 2 mimétiques ont un effet utérotonique augmentant les contractions utérines.
4. A propos des sympatholytiques :
- ☒ A. Les alpha bloquants peuvent être utilisés dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate.
 - ☐ B. Les alpha bloquants peuvent induire une vasoconstriction et sont contre indiqués dans l'hypertension.
 - ☐ C. Les bêta bloquants cardioselectifs bloquent sélectivement les récepteurs B2 adrénergiques.
 - ☐ D. Les bêta bloquants cardioselectifs limitent la survenue des crises broncho constrictrices chez l'asthmatique.
 - ☒ E. Les bêta bloquants à activité sympathomimétique intrinsèque stimulent partiellement les récepteurs B1 et préviennent toute bradycardie excessive.
5. A propos des neuroleptiques : l'hyperthermie maligne :
- ☐ A. Peut être provoquée uniquement par les neuroleptiques de première génération.
 - ☐ B. Peut être provoquée uniquement par les neuroleptiques de deuxième génération.
 - ☒ C. Peut être provoquée par les neuroleptiques de première et de deuxième génération.
 - ☐ D. Est une urgence médicale.
 - ☒ E. Nécessite l'arrêt immédiat du neuroleptique.
6. Parmi les médicaments suivants, lesquels sont utilisés comme anxiolytique :
- ☐ A. Paracétamol.
 - ☐ B. Acide valproïque.
 - ☒ C. Diazepam.
 - ☐ D. Sulpiride.
 - ☒ E. Buspiron.
7. Les contre-indications absolues des benzodiazépines sont :
- ☐ A. L'insuffisance respiratoire sévère.
 - ☐ B. L'insuffisance rénale.
 - ☐ C. Le sevrage alcoolique.
 - ☐ D. La myasthénie.
 - ☒ E. L'insuffisance cardiaque.
8. Les antiepileptiques peuvent agir par :
- ☐ A. Inhibition de la neurotransmission GABAergique.
 - ☒ B. Augmentation de la neurotransmission GABAergique.
 - ☐ C. Inhibition de la stimulation glutamatergique.
 - ☐ D. Blocage des canaux potassiques voltages-dépendants.
 - ☒ E. Ouverture des canaux potassiques voltages-dépendants.
9. Parmi ces antiepileptiques, lesquels sont indiqués dans le traitement des absences :
- ☐ A. Topiramate.
 - ☐ B. Ethosuximide.
 - ☐ C. Acide valproïque.
 - ☒ D. Phénobarbital.
 - ☐ E. Lamotrigine.
10. A propos des antidépresseurs, la classe thérapeutique impliquée fréquemment dans la survenue des effets indésirables cardiovasculaires est :
- ☐ A. Antidépresseurs tricycliques.
 - ☐ B. Inhibiteurs de recapture de la sérotonine.
 - ☐ C. Inhibiteurs de la mono-amino-oxydase réversibles.
 - ☐ D. Inhibiteurs de la mono-amino-oxydase irréversibles.
 - ☒ E. Antidépresseurs atypiques.

ResiPharmaTM

- À propos des analgésiques :
- A. Les AINS non sélectifs possèdent une meilleure tolérance gastrique.
 - B. Les analgésiques du palier II ne peuvent pas être associés avec les analgésiques du palier I.
 - C. Les analgésiques du palier II sont contre indiqués en cas d'insuffisance respiratoire.
 - D. L'association agoniste pure avec un agoniste/antagoniste est préférable.
 - E. Toutes les propositions sont justes.
12. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent être utilisés sans risque :
- A. Au 2ème trimestre de grossesse.
 - B. Chez l'asthmatique.
 - C. En cas de varicelle.
 - D. Chez le diabétique.
 - E. Toutes les propositions sont fausses.
13. Parmi les effets indésirables suivants des AINS, indiquer ceux qui sont liés à l'inhibition des prostaglandines :
- A. Anaphylaxie.
 - B. Ulcère gastroduodénal.
 - C. Insuffisance rénale.
 - D. Eruption cutanée.
 - E. Rétention hydrosodée.
14. À propos des anti-inflammatoires anti-cox2 :
- A. Sont moins ulcéreux que les AINS classiques.
 - B. Sont dépourvus du risque rénal.
 - C. Sont contre-indiqués au cours de grossesse.
 - D. Peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral.
 - E. Aspirine est un anti-cox2.
15. Les corticoides peuvent induire :
- A. Une hypoglycémie.
 - B. Une hypocalcémie.
 - C. Une hyperchlorémie.
 - D. Une hypokaliémie.
 - E. Une rétention hydrosodée.
16. L'arrêt brutal d'une corticothérapie prolongée peut induire :
- A. Une insuffisance rénale.
 - B. Un effet rebonds.
 - C. Un syndrome de sevrage.
 - D. Une atrophie musculaire.
 - E. Une ostéoporose.
17. Le phénomène de première dose de la PRAZOSINE :
- A. Survient 30 à 90 min après la première dose ou suite à l'augmentation rapide de la posologie.
 - B. Survient 30 à 90 min après la première dose ou suite à la diminution brutale de la posologie.
 - C. Est transitoire.
 - D. Est permanent.
 - E. Précédé par des symptômes prémonitoires (fatigue, vertiges, sauts).
18. La toux des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) :
- A. Est une toux sèche permanente.
 - B. Est une toux grasse permanente.
 - C. Est due à l'augmentation de la bradykinine.
 - D. Est due à la diminution de la bradykinine.
 - E. Peut être corrigée par le remplacement de l'IEC par un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II.
19. La digoxine :
- A. Est un médicament inotrope négatif.
 - B. Est un médicament chronotrope positif.
 - C. Agit par inhibition de la pompe Na^+K^+ ATPase membranaire des cellules myocardiques.
 - D. Est indiquée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique.
 - E. A un effet antiémétique.
20. L'action des cardiotoniques digitaux est potentialisée par :
- A. Hyperkaliémie.
 - B. Hypokaliémie.
 - C. Hypercalcémie.
 - D. Hypocalcémie.
 - E. Hyperchlorémie.

ResiPharmaTM

