

Prénom :

Nom :

Examen de rattrapage sémiologie pharmacie
22/11/ 2020

1.concernant les migraines :

- A. sont des algies faciales vasculaires
- B. s'accompagnent d'un syndrome déficitaire
- C. les signes ophtalmiques précèdent les algies crâniennes vasculaires
- D. la vasoconstriction précède la vasodilatation

2 les céphalées sont :

- A. toujours la traduction d'une atteinte endo crânienne
- B. devant des céphalées le Fond d'œil fait parties de l'examen clinique
- C. des algies crâniennes vasculaires souvent matinales
- D. la traduction de l'atteinte des hémisphères cérébraux

3.cochez les propositions exactes :

- A. la diarrhée aiguë implique la réalisation d'une coproculture.
- B. l'hypothyroïdie provoque une diarrhée motrice
- C. les laxatifs provoquent une constipation
- D. la diarrhée chronique est l'émission de selles dont le poids dépasse 300g/24h pendant 21jours

4.une hépatite chronique active peut-être due au

- A. virus A
- B. virus B
- C. virus non A non B
- D. virus Epstein Barr

5.En faveur du caractère organique d'une constipation vous retenir :

- A. État générale conserve
- B. Une anémie associée
- C. Symptômes anciens
- D. D'apparition récente

6. Les médicaments qui peuvent causer une constipation sont :

- A. La morphine
- B. Les antidépresseurs tricycliques
- C. L'hydroxyde d'aluminium
- D. Les pénicillines

7.concernant la toux productive :

- A. il ne faut jamais prescrire d'anti tussifs
- B. l'expectoration est le résultat de la toilette bronchique matinale
- C. les crachats peuvent être recoltés par tubage gastrique.
- D. il faut toujours récolter les expectorations

8.La polyarthrite rhumatoïde est :

- A. Un symptôme clinique
- B. Peut se manifester par des arthrites
- C. Est un signe para clinique
- D. Peut se manifester par des polyarthralgies d'allure mécanique

9.L'hématurie peut être secondaire à :

- A. Une prise médicamenteuse
- B. Une urgence médicale
- C. Une infection urinaire
- D. Un fibrome utérin

ResiPharmaTM

10. Quelle est la principale mesure anthropométrique permettant le diagnostic de l'obésité ?

- A. Poids
- B. Taille
- C. Tour de hanche
- D. L'indice de masse corporelle

11. Un IMC est en faveur d'une maigreur si sa valeur est :

- A. Supérieure à 25 kg/m^2
- B. Inférieure à 18 kg/m^2
- C. Supérieure à 30 kg/m^2
- D. Comprise entre 18,5 et $24,9 \text{ kg/m}^2$

12. concernant les dysménorrhées ?

- A. Les douleurs sont abdomino-pelviennes cycliques
- B. Elles sont plus fréquentes chez la femme ménopausée
- C. Elles sont en rapport avec la vasodilatation artériolaire du myomètre
- D. Elles sont traitées par les œstrogènes

13. Au cours des dysménorrhées les douleurs sont :

- A. Spécifiques de l'ovulation
- B. Rythmées par les règles
- C. Toujours intenses
- D. A type de brûlures

14. Quelles sont les comorbidités associées au diabète de type 2 :

- A. Sd d'apnée du sommeil
- B. Cancer
- C. Dépression
- D. Parodontite

15. Quel est l'objectif glycémique chez le sujet âgé fragile :

- A. $\text{HbA1c} < 6,5\%$
- B. $\text{HbA1c} < 7\%$
- C. $\text{HbA1c} < 8\%$
- D. $\text{HbA1c} < 9\%$

16. L'HTA résistante :

A. Est définie par des valeurs de tension artérielle élevées malgré un traitement antihypertenseurs.

B. Correspond à des valeurs de tension artérielle élevées sous 4, voire 5, traitements antihypertenseurs.

C. Requiert une enquête poussée à la recherche de causes secondaires.

D. Nécessite la vérification de l'observance thérapeutique.

17. Le traitement de première intention du diabète repose sur :

- A. Un blocage du système rénine-angiotensine
- B. Un Bêtabloquant
- C. Un inhibiteur calcique
- D. un diurétique

18. Les 2 techniques les plus utilisées pour le dosage de l'hémoglobine glyquée sont :

A. La chromatographie haute pression (HPLC)

B. La méthode immuno-chimique de reconnaissance du site des anticorps.

C. L'électrophorèse capillaire

D. Méthode enzymatique

19. Les objectifs des glycémiés pour une patiente diabétique pendant la grossesse sont :

- A. Glycémie à jeun entre 0,70 et 1,05 g/l
- B. Glycémie à jeun entre 0,80 et 1,10 g/l
- C. C. Glycémie postprandiale entre 1,00 et 1,30 g/l
- D. D. Glycémie postprandiale entre 1,10 et 1,40 g/l

20.. Quel examen permet de confirmer la certitude du diabète gestationnel après 4 semaines d'aménorrhées ?

- A. la glycosurie
- B. la glycémie à jeun
- C. L'hyperglycémie provoquée
- D. Hb glyquée

ResiPharmaTM

la principale mesure
trique permettant le diagnostic de

nche
masse corporelle

en faveur d'une maigreur si sa

25 kg/m²
8 kg/m²
30 kg/m²
re 18,5 et 24,9 kg/m²

s dysménorrhées ?

rs sont abdomino-pelviennes

plus fréquentes chez la femme
e
n rapport avec la
n artériolaire du myomètre
itées par les œstrogènes

s dysménorrhées les

e l'ovulation
les règles
ses
res

omorbidités associées au

nmeil

rcémique chez le sujet

A. Est définie par des chiffres élevés de PA malgré un traitement bien conduit comportant 3 antihypertenseurs.

B. Correspond à des chiffres de PA bien équilibrés sous 4, voire plus de médicaments antihypertenseurs.

C. Requière une enquête étiologique très poussée à la recherche d'une cause secondaire.

D. Nécessite la vérification d'une bonne observance thérapeutique.

17. Le traitement de premier choix de l'HTA du diabétique repose sur :

- A. Un blocage du système rénine angiotensine
- B. Un Bêtabloquant
- C. Un inhibiteur calcique
- D. un diurétique

18. Les 2 techniques les plus performantes du dosage de l'hémoglobine glyquée sont :

- A. La chromatographie par échange d'ions à haute pression (HPLC)
- B. La méthode immunologique par reconnaissance du site principal de glycation par des anticorps.
- C. L'électrophorèse capillaire
- D. Méthode enzymatique

19. Les objectifs des glycémies chez la patiente diabétique pendant la grossesse sont :

- A. Glycémie à jeun entre 0,6 à 0,95 g/L
- B. Glycémie à jeun entre 0,6 à 0,92 g/L
- C. C. Glycémie postprandiale (2 h) < 1,20 g/L.
- D. D. Glycémie postprandiale (2 h) < 1,10 g/L.

20.. Quel examen permet le diagnostic de certitude du diabète gestationnel après 24 semaines d'aménorrhée :

- A. la glycosurie
- B. la glycémie à jeun
- C. L'hyperglycémie provoquée par voie orale
- D. Hb glyquée

ResiPharmaTM

BON COURAGE