

Cocher la réponse FAUSSE

- ✓ 1. Le syndrome de choléstase comporte : ✓
A. Une Hyperbilirubinémie conjuguée. ✓
B. Une hypercholestérolémie, une hypertriglycéridémie. ✓
C. Une diminution des phosphatases alcalines. ✓
D. Une augmentation des gamma-GT. ✓
E. Un test de Koller positif. ✓
- ✓ 2. Le cancer de la prostate : ✓
A. Peut se manifester par une hématurie. ✓
B. Peut se manifester par une rétention vésicale chronique. ✓
C. Peut se manifester par une pollakiurie. ✓
D. Au toucher rectal : la prostate est dure. ✓
E. Au toucher rectal : le sillon médian n'est pas perceptible. ✓
- ✓ 3. Une protéinurie peut être en rapport avec : ✓
A. Une Infection de l'appareil urinaire. ✓
B. Une atteinte tubulaire. ✓
C. Une polyglobulie. ✓
D. Une insuffisance ventriculaire droite. ✓
E. Les propositions C et D sont fausses. ✓
- ✓ 4. La colique néphrétique : ✓
A. Est déclenchée par les micro-traumatismes. ✓
B. Est à début brutal. ✓
C. Siège: hypochondre unilatéral et à irradiations descendantes vers la région inguinogénitale. ✓
D. Est intense, extrême, permanente avec paroxysmes, le malade est agité, anxieux, cherchant une position antalgique. ✓
E. S'accompagne de troubles de la miction. ✓
- ✓ 5. La maladie de Gilbert : ✓
A. Entraîne un ictère à bilirubine conjuguée. ✓
B. Entraîne un ictère non hémolytique. ✓
C. Est souvent latente. ✓
D. Est en rapport par un déficit partiel de la glucuronyl transférase. ✓
E. Les urines ne sont pas foncées, les selles ne sont pas décolorées. ✓
- ✓ 6. Les ictères choléstatiques (choléstase extrahépatique) : ✓
A. Entraînent un prurit. ✓
B. Donnent des urines claires. ✓
C. Donnent des selles décolorées. ✓
D. Entraînent des dilatations des voies biliaires intrahépatiques. ✓
E. Peuvent entraîner des signes généraux. ✓
- ✓ 7. Le purpura : ✓
A. Est en rapport avec une extravasation du sang hors des gros vaisseaux. ✓
B. Est de couleur rouge. ✓
C. Ne s'efface pas à la vitro-pression. ✓
D. Peut être punctiforme ou lenticulaire. ✓
E. Peut être en vibice. ✓

ResiPharmaTM

- ✓ 8. Au cours de l'appendicite, on peut retrouver :
- A. Une défense pariétale localisée à la fosse iliaque droite: ✓
 - B. Une hypoesthésie cutanée. ✓
 - C. Une douleur provoquée au niveau du point situé au milieu de la ligne joignant l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure droite. ✓
 - ☒ D. Le signe de Blumberg
 - E. Une douleur provoquée au niveau du cul-de-sac de Douglas ✓
- ✓ 9. Les spondylarthropathies peuvent être en rapport avec ⇒
- A. Un psoriasis ✓
 - B. Une maladie de Crohn ✓
 - ☒ C. Lupus érythémateux systémique ✗
 - D. Une rectocolite hémorragique ✓
 - E. Une arthrite réactionnelle ✓
- ✓ 10. Les étiologies des diarrhées sécrétoires sont : ⇒
- A. Prises de laxatifs ✓
 - B. Médicaments : biguanides colchicine ✓
 - C. Tumeurs endocriniennes ✓
 - D. Colites microscopiques ✓
 - ☒ E. Syndrome de malabsorption
- ✓ 11. Cochez la réponse fausse parmi ces propositions : ⇒
- A. La polyurie peut être en rapport avec un diabète sucré ✓
 - B. La polyurie peut être en rapport avec une potomanie ✓
 - C. L'hématurie initiale est habituellement d'origine urétrale ✓
 - D. L'hématurie totale est habituellement d'origine rénale ✓
 - ☒ E. L'hématurie macroscopique émise sans caillot évoque une cause urologique
- ✓ 12. Concernant les lésions primaires dermatologiques :
- A. La papule est une élévation cutanée, circonscrite ✓
 - B. La phlyctène: est une élévation, contenant une sérosité, la taille est supérieure à 1 cm. ✓
 - ☒ C. La pustule est semblable à la bulle, elle n'en diffère que par son contenu clair ✗
 - D. Le nodule est une masse solide qui siège dans l'hypoderme ✓
 - E. Le kyste est une cavité remplie de liquide et située dans le derme ou l'hypoderme. ✓
- ✓ 13. Au cours de La sciatique de type S1 :
- A. La douleur part du point d'émergence de la racine S1 ✓
 - ☒ B. La douleur suit le trajet : face antérieure de la cuisse, face antérieure du genou, se continue jusqu'à la face interne de la jambe, talon, bord externe du pied et derniers orteils ✗
 - C. Est augmentée par la manœuvre de Lasègue ✓
 - D. L'abolition du réflexe achilléen peut être constatée. ✓
 - E. L'étiologie peut être une hernie discale ✓
- ✓ 14. Les associations d'antihypertenseurs recommandés sont
- A. ARA2- Antagoniste calcique ✓
 - B. IEC - Diurétiques ✓
 - C. ARA2 - Diurétiques ✓
 - ☒ D. Bêtabloqueurs - Diurétiques
 - E. ARA2- Diurétique - Antagonistes calciques ✓

ResiPharmaTM

- ✓ 15. Les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2 sont ➡
- A. Diminution de l'effet incrétine ✗
 - B. Dysfonction des neurotransmetteurs ✓
 - C. Diminution de la sécrétion de glucagon ✗
 - D. Inflammation ✓
 - E. Insulinorésistance ✓

- ✓ 16. Les incrétinomimétiques :
- A. Augmentent l'activité de la DPP-4 ✗
 - B. Inhibent et réduisent la dégradation du GLP-1 endogène ✓
 - C. Analogues du GLP1 ✓
 - D. Sont utilisés par voie orale ✓
 - E. Sont utilisés par voie injectables ✓

- ✗ 17. Un hyperaldostérionisme est recherché en cas d'HTA :
- A. Associée à une Hypokaliémie ✗
 - B. Associée à des crampes musculaires ✓
 - C. Chez le sujet très âgé ✓
 - D. Résistante au traitement ✓
 - E. Sévère ✓

ResiPharmaTM

- ✓ 18. L'étude Steno 2 :
- A. A concernée les diabétiques avec albuminurie ✓
 - B. A concernée 160 patients ✓
 - C. S'est étalée sur près de 8ans ✓
 - D. Le bras intensif a concerné le diabète et l'albuminurie ✗
 - E. A montré la réduction de la mortalité cardiovasculaire ✓

- ✓ 19. Devant une céphalée récente, il est nécessaire de réaliser un examen clinique afin de :
- A. Rechercher des signes neurologiques de localisation lésionnelle ✓
 - B. Rechercher une raideur de la nuque ✓
 - C. Prendre la température à la recherche d'une fièvre ✓
 - D. Palper des artères cérébrales ✗
 - E. Faire un fond d'œil ✓

20. La toux: ➡
- A. La toux bitonale est due à la paralysie d'une corde vocale par compression d'un nerf récurrent. ✓
 - B. Une toux quinteuse peut être émetisante ✗
 - C. La toux est une inspiration brusque et bruyante ✗
 - D. Au cours de la laryngite, la toux est rauque. ✓
 - E. La toux est un acte réflexe. ✓

- ✓ 21. Les palpitations :
- A. Correspondent à la perception normale des battements cardiaques ✗
 - B. Peuvent survenir sur cœur sain ✓
 - C. Un enregistrement électrocardiographique (ECG) peut être normal en dehors de l'accès de palpitations ✓
 - D. Lorsque le rythme cardiaque est irrégulier, il peut s'agir d'extrasystoles. ✓
 - E. Elles peuvent nécessiter une exploration électrophysiologique. ✓

- ✓ 22. Au cours de l'infarctus du myocarde :
- A. Le malade est agité et angoissé. ✓
 - B. Le malade présente des nausées, vomissements et des éructations. ✓
 - ✓ C. Le malade est soulagé par la position penchée en avant. ✓
 - D. C'est une douleur rétrosternale souvent diffuse à la partie antérieure du thorax. ✓
 - E. Le malade est souvent un grand fumeur. ✓
- ✓ 23. Le Cluster Headache est caractérisé par:
- A. Evolution épisodique. ✓
 - ✓ B. Zone gâchette. ✓
 - C. Injection conjonctivale, congestion nasale, hypersudation dans le territoire douloureux. ✓
 - D. Se caractérise par une douleur strictement unilatérale, de siège temporo-orbitaire ou orbito-facial, extrêmement sévère, durant entre 15 et 180 minutes. ✓
 - E. Plus fréquent chez les hommes et débute aux alentours de 20 à 30 ans. ✓
- ✓ 24. Les Sulfamides hypoglycémiantes :
- ✓ A. Ont un point d'impact sur la cellule alpha du pancréas. ✓
 - B. Permettent une libération d'insuline préformée. ✓
 - C. N'ont aucun effet sur la synthèse d'insuline. ✓
 - D. Sont contre indiqués en cas de diabète avec cétose. ✓
 - E. Sont contre indiqués en cas d'infections sévères. ✓
- ✓ 25. La syncope
- A. Perte de connaissance brusque et passagère. ✓
 - B. Liée à une anoxie cérébrale. ✓
 - ✓ C. Il s'agit d'une crise comitiale qui s'accompagne de convulsions et de troubles circulatoires. ✓
 - D. Le rétrécissement aortique peut en être une cause. ✓
 - E. La syncope du syndrome d'Adams-Stokes survient spontanément surprenant le sujet aussi bien en pleine activité qu'au repos complet. ✓

ResiPharmaTM