

1. Parmi les propositions suivantes, cocher la réponse juste.
 - a. À l'état normal, les artères périphériques sont visibles.
 - b. A l'état normal, les veines des membres inférieurs ne sont pas visibles
 - c. Le pouls artériel est défini par l'onde de choc due à l'activité cardiaque et transmise par la paroi des veines.
 - d. La prise de pouls s'effectue par la palpation de l'artère radiale à l'aide de l'index et du majeur
 - e. Les artères des membres inférieurs sont pourvues de valvules qui empêchent le reflux.
 - A. Tous les items sont justes
 - B. Aucun item n'est juste
 - C. Les items a, b sont justes
 - ✗ D. Les items d, e sont justes
 - E. Les items b, d sont justes
2. Au cours de l'ischémie aiguë des membres inférieurs :
 - a. L'obstacle siège au dessus du dernier pouls palpable
 - b. La limite de refroidissement est située à une quinzaine de centimètres au dessus du niveau de l'oblitération
 - c. L'absence du pouls artériel exclut le diagnostic d'une ischémie aiguë du membre inférieur.
 - d. Il y a oblitération progressive de l'axe veineux des membres inférieurs
 - A. Tous les items sont justes
 - ✗ B. Aucun item n'est juste
 - C. Les items a, b sont justes
 - D. Les items c, d sont justes
 - E. Les items b, d sont justes
3. Au cours de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) :
 - a. Le pronostic des patients n'est pas limité par l'AOMI elle-même, mais par la morbidité et la mortalité cardiaques ou vasculaires cérébrales
 - b. Le dépistage de l'AOMI permet l'instauration d'une prévention secondaire pour réduire la morbi-mortalité cardiovasculaire.
 - c. Le périmètre de marche maximum est la distance au bout de laquelle la douleur commence à apparaître.
 - d. La claudication de la plante du pied est liée à des lésions supra-poplitées.
 - A. Tous les items sont justes
 - B. Aucun item n'est juste
 - C. Les items a, b sont justes
 - D. Les items c, d sont justes
 - E. Les items b, d sont justes
4. Concernant l'index de pression systolique (IPS)
 - a. $IPS = PA \text{ systolique humérale aux 2 bras} / PA \text{ systolique pédieuse ou tibiale postérieure}$
 - b. On doit prendre la PA systolique aux 2 bras la plus basse et la PA systolique pédieuse ou tibiale postérieure la plus élevée.
 - c. L'IPS est considéré comme normal lorsqu'il est supérieur à 1,30 et pathologique lorsqu'il est inférieur à 0,90.
 - d. Lorsque l'IPS est inférieur à 0,9, on dit que l'artère est incompressible.
 - A. Tous les items sont justes
 - B. Aucun item n'est juste
 - C. Les items a, b sont justes
 - D. Les items c, d sont justes
 - E. Les items b, d sont justes

ResiPharmaTM

5. Au cours de l'insuffisance veineuse, le patient rapporte une notion de jambes lourdes. Ce symptôme est :
- Amélioré par le chaud
 - Majoré après station debout ou assise prolongée.
 - Les signes de stase (œdème du pied) sont mieux recherchés chez un malade en position couché.
 - L'exercice physique active la pompe musculaire et soulage le patient.
- Tous les items sont justes
 - Aucun item n'est juste
 - Les items a,d sont justes
 - Les items c, d sont justes
 - Les items b, d sont justes
6. Au cours de la thrombose veineuse (TV) des membres inférieurs,
- L'embolie pulmonaire est une complication aiguë et grave.
 - Le signe de Homans est pathognomonique d'une thrombose veineuse.
 - Le ballotement du mollet est diminué du côté sain
 - La présence d'un cancer ou d'une thrombophilie est un facteur de risque persistant d'une TV.
- Tous les items sont justes
 - Aucun item n'est juste
 - Les items a,d sont justes
 - Les items c, d sont justes
 - Les items b, d sont justes
7. Le degré de gêne fonctionnelle est relié au stade de la classification NYHA.
- ☒ a. Je suis toujours essoufflé même au repos = stade III de la NYHA.
 - ☒ b. Je suis essoufflé quand je monte des escaliers (plus de 2 étages) ou lorsque je marche rapidement ou en côte = stade IV de la NYHA. 2
 - ☒ c. Je ne suis absolument pas essoufflé même quand je fais du sport = stade I de la NYHA
 - ☒ d. Je suis essoufflée quand je marche sur terrain plat ou que je monte des escaliers (moins de 2 étages) = Stade III de la NYHA. 2
- Tous les items sont justes
 - Aucun item n'est juste
 - Les items a, b, d sont justes
 - Les items a, b, c sont justes
 - Les items c, d sont justes
8. Au cours du rétrécissement mitral (RM):
- Obstacle au remplissage du ventricule gauche
 - L'Echodoppler cardiaque est un examen important pour poser le diagnostic.
 - La syncope d'effort par ischémie cérébrale est un signe fonctionnel majeur du RM.
 - Le patient présente une hyperpulsatilité artérielle.
- Tous les items sont justes
 - Aucun item n'est juste
 - Les items a, b sont justes
 - Les items a, b, c sont justes
 - Les items a, b, c, d sont justes

ResiPharmaTM

2,5 . d

9. Au cours de l'œdème aigu du poumon (OAP) :
- a. Bradypnée expiratoire, toux quinteuse, pénible et expectoration mousseuse, saumonée sont les signes de l'OAP.
 - b. Le début est brutal, toujours matinal.
 - c. La dyspnée est dite dyspnée périodique de Cheyne-Stokes
 - d. A l'auscultation on retrouve des râles crépitants d'abord aux sommets puis descendent aux bases pulmonaires.
 - e. L'expectoration soulage le malade.
 - A. Tous les items sont justes
 - B. Aucun item n'est juste
 - C. Les items a, b, c sont justes
 - D. Les items b, c sont justes
 - E. Les items c, d sont justes
10. Les signes d'une insuffisance cardiaque droite sont :
- a. Turgescence spontanée des jugulaires.
 - b. Le patient est soulagé par la position penchée en avant.
 - c. Hépatomégalie congestive.
 - d. Œdème des membres inférieurs.
 - e. Œdème aigu du poumon.
 - A. Tous les items sont justes
 - B. Aucun item n'est juste
 - C. Les items a, b, c sont justes
 - D. Les items b, c, d sont justes
 - E. Les items a, c, d sont justes
11. Au cours de l'infarctus du myocarde :
- a. Le malade est agité et angoissé.
 - b. La durée de douleur est inférieure ou égale à 2 minutes
 - c. Le malade est soulagé par la position penchée en avant.
 - d. C'est une douleur rétrosternale souvent diffuse à la partie antérieure du thorax.
 - A. Tous les items sont justes
 - B. Aucun item n'est juste
 - C. Les items a, b sont justes
 - D. Les items a, c sont justes
 - E. Les items a, d sont justes
12. Les palpitations :
- a. Correspondent à la perception anormale des battements cardiaques
 - b. Peuvent survenir sur cœur sain
 - c. Un enregistrement électrocardiographique (ECG) peut être normal en dehors de l'accès de palpitations
 - d. Lorsque le rythme cardiaque est irrégulier, il peut s'agir d'extrasystoles.
 - e. Elles peuvent nécessiter une exploration électrophysiologique.
 - A. Tous les items sont justes
 - B. Aucun item n'est juste
 - C. Les items a, b sont justes
 - D. Les items a, c sont justes
 - E. Les items a, d sont justes

ResiPharmaTM

13. Le syndrome cholédocien (Cocher la réponse juste)
- A. Est révélé par un ictère, une fièvre et un méléna
 - B. Est révélé par une douleur, une fièvre et un ictère en moins de 48 heures
 - C. Est révélé par un ictère d'aggravation progressif
 - D. Est en rapport avec un ampullome Vatérien
 - E. Est en rapport avec un cancer du pancréas
14. Le syndrome de choléstase comporte (Cocher la réponse juste) :
- A. Une Hyper bilirubinémie libre.
 - B. Une hypertriglycéridémie. et une hypocholestérolémie
 - C. Une augmentation des phosphatases acides.
 - D. Une augmentation des gamma GT.
 - E. Un test de Koller négatif.
15. Le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire comporte (Cocher la réponse juste)
- A. Un prurit
 - B. Une hypoalbuminémie.
 - C. Un abaissement du TP corrigé par la vitamine K.
 - D. Un facteur V normal
 - E. Se voit au cours de la lithiase de la voie biliaire principale.
16. Parmi ces propositions , cocher la réponse juste
- A. Le sédiment urinaire doit être mis au réfrigérateur si l'examen est retardé
 - B. L'hématurie macroscopique émise avec caillot évoque une cause parenchymateuse
 - C. Les hématies déformées évoquent une cause urologique
 - D. L'hématurie initiale est habituellement d'origine vésicale
 - E. Une protéinurie peut être en rapport avec une insuffisance ventriculaire droite
17. Cocher la réponse juste parmi ces propositions (Cocher la réponse juste) :
- A. Une fausse hématurie peut être en rapport avec la prise de rifampicine,
 - B. Une fausse hématurie peut être en rapport avec une myoglobulinurie
 - C. La polyurie peut être en rapport avec une diminution de la sécrétion de l'antidiurétique hormone
 - D. les réponses A et B sont exactes
 - E. Les réponses A, B et C sont exactes

ResiPharmaTM

18. La colique néphrétique (Cocher la réponse juste) :
- A. Est déclenchée par les micro-traumatismes
 - B. Siège: hypochondre unilatéral et à irradiations descendantes vers la région inguinogénitale.
 - C. Est intense, extrême, permanente avec paroxysmes, le malade est agité, anxieux,
 - D. Les réponses A et C sont exactes
 - E. Les réponses A, B et C sont exactes
19. Les céphalées, palpitations, tachycardie, flush syndrome associés à une HTA évoque en priorité (Cocher la réponse juste) :
- A. Un syndrome de Cushing
 - B. Un hyperaldostérionisme primaire
 - C. Un Phéochromocytome
 - D. Une hyperthyroïdie
 - E. Une insuffisance cardiaque
20. Les associations d'antihypertenseurs privilégiés sont (Cocher la réponse juste):
- A. Béta-bloquants - diurétiques
 - B. IEC - Inhibiteurs calciques
 - C. Inhibiteurs calciques - diurétiques
 - D. ARA2 - IEC
 - E. Toutes ces réponses sont justes
21. Traitement de l'HTA en fonction de l'atteinte des indications spécifiques (Cocher la réponse juste):
- A. Les IEC sont indiqués en cas de protéinurie
 - B. La méthyl dopa peut être indiquée chez la femme enceinte
 - C. Les IEC et ARA2 sont indiqués en cas de syndrome métabolique
 - D. Les bêta-bloquants sont indiqués en cas de coronaropathie
 - E. Toutes ces réponses sont justes
22. Concernant l'hypertension artérielle (HTA):
- a. L'HTA est défini en Automesure par une TA supérieure 135/85 mmHg
 - b. Les Inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont des médicaments bloqueurs des récepteurs Béta adrenergiques.
 - c. La MAPA permet de diagnostiquer les patients non dipper.
 - d. L'HTA est une pathologie qui ne touche que les patients au-delà de 40 ans.
- A. Tous les items sont justes
 - B. Aucun item n'est juste
 - C. Les items a, b sont justes
 - D. Les items a, c sont justes
 - E. Les items a,c, d sont justes

ResiPharmaTM

23. Les spondylarthropathies peuvent (Cocher la réponse fausse):
- A. Etre révélées par des talalgies et des enthésopathies
 - B. Entraîner des douleurs fessières
 - C. Etre en rapport avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin
 - D. Etre en rapport avec un lupus érythémateux systémique
 - E. Etre en rapport avec un psoriasis
24. La névralgie crurale (Cocher la réponse fausse):
- A. Est en rapport avec une atteinte de la racine L4
 - B. Entraîne une douleur au point d'émergence de la racine
 - C. Suit le trajet: fesse, face antérieure de la cuisse, face antérieure du genou
 - D. Se continue jusqu'à la face interne de la jambe.
 - E. Est augmentée par la manœuvre de Lasègue inversée.
25. Au cours de la sciatique de type S1 (Cocher la réponse fausse):
- A. La douleur suit le trajet : fesse, face postérieure de la cuisse, face postérieure de la jambe, face dorsal du pied et premiers orteils
 - B. La douleur est augmentée par la manœuvre qui consiste, sur le malade en décubitus dorsal, à fléchir le membre inférieur sur le bassin.
 - C. L'abolition du réflexe achilléen peut être constaté
 - D. L'étiologie peut être une néoplasie
 - E. L'étiologie peut être une hernie discale.

