

1. Devant une douleur thoracique aiguë (cocher la réponse juste) :

1. L'origine psychogène peut être retenue d'emblée
2. Il convient d'adresser le patient aux urgences
3. Les causes cardiaques sont bénignes le plus souvent
4. Il faut également évoquer une origine digestive
5. Il faut également évoquer une origine neurologique

A : 1-2

B : 2-3

C : 2-4

D : 1-5

E : 2-3-4-5

2. L'épanchement pleural (cocher la réponse juste) :

1. Correspond à une accumulation de liquide dans la plèvre
2. Est asymptomatique le plus souvent
3. La toux est un signe spécifique
4. La dyspnée est constante
5. Est favorisé par l'alitement

A : 1-4-5

B : 1

C : 1-2-3-4-5

D : 5

E : 2

ResiPharmaTM

3. L'hémoptysie peut être confondue avec (cocher la réponse juste) :

1. Hématémèse
2. Epistaxis
3. Saignement provenant de la bouche
4. Expectoration
5. Toutes ces réponses sont justes

A : 1-2-3

B : 1-2-3-4

C : 2-3

D : 1

4. Concernant la toux, quelles sont les propositions justes ?

1. Peut-être sèche
2. C'est un signe physique fréquent
3. Les causes sont multiples
4. Les étiologies sont bénignes
5. Peut être accompagnée d'une expectoration

A : 1-2-3-5

B : 1-2-3

C : 2-4

D : 4-5

E : 1-3-5

5. La bronchite chronique présente les caractéristiques suivantes (cocher la réponse juste)
1. Maladie chronique
 2. Evoluant par poussées
 3. Survient chez les fumeurs
 4. Peut-être diagnostiquée après trois mois d'évolution
 5. Toutes ces propositions sont justes
- A : 1-2-4
B : 1-2-3
C : 1-4
D : 5
E : 2-3
6. Une névralgie essentielle du trijumeau (cocher la réponse juste) :
1. A un fond douloureux continu
 2. S'accompagne d'un déficit sensitif facial
 3. Est provoquée par la stimulation d'une zone gâchette
 4. Est paroxystique
 5. S'installe brusquement
- A. 1, 2
B. 1,2,3
C. 2,3,4
D. 3,4,5
E. 1,3,4,5
7. Une femme de 50 ans présente des douleurs de l'hémiface survenant de façon paroxystique déclenchées par la mastication. Quel diagnostic évoquez-vous ? (cocher la réponse juste)
- A. Otite aiguë
B. Sinusite maxillaire aiguë
C. Névralgie faciale
D. Glaucome
E. Aucun des diagnostics précédents
8. Une algie vasculaire de la face peut comporter (cocher la réponse juste) :
- A. Une rhinorrhée, injection conjonctivale
B. Des douleurs fulgurantes provoquées par le contact
C. Une hypoesthésie cornéenne
D. Un fond douloureux continu
E. Des douleurs bilatérales
9. Les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2 sont (cocher la réponse fausse) :
- A. Diminution de l'effet incrétine
B. Dysfonction des neurotransmetteurs
C. Augmentation de la sécrétion du glucagon
D. Lipolyse accrue
E. Augmentation de la captation du glucose par les muscles
10. Les incrétinomimétiques (cocher la réponse fausse) :
- A. Diminue l'activité de la DPP-4
B. Augmentent la dégradation du GLP-1 endogène
C. Réduisent l'HbA1c de 0,5 à 1,5 %
D. Sont utilisés par voie orale
E. Sont utilisés par voie injectables

ResiPharmaTM

11. Les paramètres inclus dans la définition du syndrome métabolique selon la classification ATPIII sont (cocher la réponse fausse):
- A. Le tour de taille
 - B. La Pression artérielle
 - C. La glycémie
 - D. Le cholestérol total
 - E. Les triglycérides
12. Les médicaments suivants agissent essentiellement sur la glycémie post prandiale (cocher la réponse fausse):
- A. Glinides
 - B. Glitazones
 - C. Inhibiteurs des alpha glucosidases
 - D. Analogues du GLP 1
 - E. Inhibiteur de la DPP 4
13. Concernant le diabète sucré (cochez la réponse fausse)
- A. Le diabète de type 2 peut être révélé par une infection
 - B. Le diabète de type 1 est habituellement révélé par une complication vasculaire
 - C. L'insuline peut être associée aux antidiabétiques oraux au cours du DT2
 - D. Le diabète de type 1 est une maladie autoimmune
 - E. Le diabète « LADA » est considéré comme un diabète de type 1 à marche lente
14. La macule (cocher la réponse fausse):
- A. Est une tache réalisant une modification parcellaire de la teinte des téguments sans modification de l'épaisseur, dont le diamètre est inférieur à 1 cm.
 - B. Peut être érythémateuse, ne s'effaçant pas à la vitro pression
 - C. Peut être purpurique
 - D. Peut être une ectasie des petits vaisseaux
 - E. Peut être pigmentaire.
15. Le purpura (cocher la réponse fausse):
- A. Est en rapport avec une ectasie des petits vaisseaux,
 - B. Est de couleur rouge,
 - C. Ne s'efface pas à la vitro-pression,
 - D. Peut être punctiforme ou lenticulaire
 - E. Peut être en vibice
16. Concernant les lésions primaires dermatologiques (cocher la réponse fausse) :
- A. La papule est une élévation cutanée, circonscrite
 - B. La phlyctène: est une élévation, contenant une sérosité, supérieure à 1 cm.
 - C. La pustule est semblable à la bulle, elle n'en diffère que par son contenu purulent.
 - D. Le nodule est une masse solide qui siège dans l'épiderme
 - E. Le kyste est une cavité remplie de liquide et située dans le derme ou l'hypoderme

ResiPharmaTM

17. L'occlusion intestinale aiguë (cocher la réponse fausse) :
- A. Est une obstruction de l'intestin siégeant au niveau du côlon
 - B. Est une obstruction de l'intestin siégeant au niveau du grêle
 - C. S'accompagne de douleur provoquée au niveau du point de Mac Burney
 - D. S'accompagne de vomissements
 - E. S'accompagne d'un arrêt des matières et des gaz
18. Les signes évoquant un syndrome de malabsorption sont (cocher la réponse fausse) :
- A. Ostéopénie
 - B. Diarrhée hydrique, abondante
 - C. Selles grasses
 - D. Syndrome hémorragique
 - E. Glossite
19. Les étiologies des diarrhées motrices sont (cocher la réponse fausse) :
- A. Neuropathies
 - B. Prise médicamenteuse : biguanides colchicine
 - C. Hyperthyroïdie
 - D. Diabète
 - E. Cancer médullaire de la thyroïde
20. La constipation est caractérisée par (cocher la réponse fausse) :
- A. Des selles régulières peu abondantes, dures, sèches, en scybales.
 - B. Des selles espacées de plusieurs jours.
 - C. Des selles liquides dans lesquelles on retrouve des fragments de selles dures.
 - D. La présence de ballonnement abdominal
 - E. Ses étiologies : causes fonctionnelles, cancers digestifs (colon...), hyperthyroïdie...
21. Au cours de l'appendicite, on peut retrouver (cocher la réponse fausse) :
- A. Une défense pariétale localisée à la fosse iliaque droite;
 - B. Une hyperesthésie cutanée.
 - C. Une douleur provoquée au niveau du point situé au milieu de la ligne joignant l'ombilic et l'épine iliaque postérieure droite.
 - D. Le signe de Blumberg
 - E. Une douleur provoquée au niveau du cul-de-sac de Douglas
22. Le syndrome dysentérique (cocher la réponse fausse) :
- A. Est une émission de selles très abondantes contenant des glaires et du sang.
 - B. S'accompagne d'épreinte
 - C. S'accompagne de ténésme
 - D. Peut être en rapport avec une amibiase
 - E. Peut être en rapport avec une rectocolite hémorragique

ResiPharma[®]

23. Les vomissements (cocher la réponse fausse) :

- A. Sont facile, en jet (en fusée) au cours de l'hypertension intracrânienne
- B. Peuvent être en rapport avec une grossesse au premier trimestre
- C. Peuvent être en rapport avec un infarctus du myocarde
- D. Peuvent être en rapport avec une sténose du bulbe
- E. Contenir des aliments digérés au cours de la colique hépatique

24. Une leucorrhée blanc jaunâtre n'évoque pas (cocher la réponse fausse) :

- A. Une infection mycosique
- B. Un état physiologique
- C. Une infection à trichomonas vaginal
- D. Une infection par candida albicans
- E. Une infection à pseudomonas

ResiPharmaTM

25. Cochez la réponse fausse parmi ces propositions :

- A. Ménorragies : règles abondantes
- B. Phymosis : Le prépuce est rétracté, on ne peut le ramener sur le gland
- C. Pollakiménorrhée : règles trop rapprochées par raccourcissement de la durée des cycles
- D. Ménarchie : âge d'apparition des premières règles
- E. Une hydrocèle est un épanchement séreux de la vaginale

24,06,2018
Barème variable

N°	Réponses	Barème
1	C	0,8
2	B	0,8
3	A	0,8
4	E	0,8
5	B	0,8
6	D	0,8
7	C	0,8
8	A	0,8
9	E	0,8
10	B	0,8
11	D	0,8
12	B	0,8
13	B	0,8
14	B	0,8
15	A	0,8
16	D	0,8
17	C	0,8
18	B	0,8
19	B	0,8
20	E	0,8
21	C	0,8
22	A	0,8
23	E	0,8
24	C	0,8
25	B	0,8

ResiPharmaTM