

Cocher la réponse fausse

1. Le syndrome cholédocien peut être : (Cocher la réponse fausse)
A/ Révélé par un ictère fébrile
B/ Révélé par une douleur de l'hypochondre droit
C/ Révélé par un ictère d'aggravation progressive
D/ Est en rapport avec une lithiasé de la voie biliaire principale
E/ L'échographie révèle une dilatation des voies biliaires intra hépatiques
2. Le syndrome de choléstase comporte (Cocher la réponse fausse) :
A/ Une Hyper bilirubinémie conjuguée.
B/ Une hypertriglycéridémie.
C/ Une augmentation des phosphatases acides.
D/ Une augmentation des gamma GT.
E/ Un test de Koller positif
3. L'occlusion intestinale aiguë (cocher la réponse fausse) :
A/ Est une obstruction de l'intestin siégeant au niveau du côlon
B/ Est une obstruction de l'intestin siégeant au niveau du grêle
C/ S'accompagne de douleurs abdominales
D/ S'accompagne de vomissements, d'un arrêt des matières et non des gaz
E/ Est une urgence chirurgicale
4. Les signes évoquant une diarrhée par malabsorption sont : (cocher la réponse fausse) :
A. Paleur cutanéomuqueuse
B. Signes de tétanie
C. Syndrome hémorragique
D. Œdèmes des membres inférieurs
E. Selles en post prandial, contenant des débris alimentaires
5. Les étiologies des diarrhées motrices sont : (cocher la réponse fausse) :
A. Les neuropathies
B. La prise des laxatifs
C. L'hyperthyroïdie
D. Le diabète
E. Le cancer médullaire de la thyroïde
6. La constipation est caractérisée par (cocher la réponse fausse) :
A. Des selles en scybales.
B. Des selles liquides dans lesquelles on retrouve des fragments de selles dures.
C. Peut être en rapport avec une hypothyroïdie.
D. Peut être en rapport avec un cancer digestif (colon)
E. Peut être en rapport avec une colite inflammatoire
7. L'appendicite est caractérisée par : (cocher la réponse fausse) :
A. Une défense pariétale localisée à la fosse iliaque droite;
B. Le signe de rovsing positif
C. Une douleur provoquée au niveau du point situé au milieu de la ligne joignant l'ombilic et l'épine iliaque antérieure droite.
D. Le signe de Blumberg positif
E. Une absence de douleur au toucher rectal (cul-de-sac de Douglas)

ResiPharmaTM

Cocher la réponse fausse

8. Le syndrome dysentérique (cocher la réponse fausse) :
- A. Est une émission de selles très abondantes contenant des glaires et du sang.
 - B. S'accompagne d'épreinte
 - C. S'accompagne de ténesme
 - D. Peut être en rapport avec une amibiase
 - E. Peut être en rapport avec une rectocolite hémorragique
9. Les vomissements (cocher la réponse fausse) :
- A. Sont faciles, en jet (en fusée) au cours de la sténose du bulbe duodéal
 - B. Peuvent être en rapport avec une hypertension intracrânienne
 - C. Peuvent être en rapport avec une grossesse au premier trimestre
 - D. Peuvent être en rapport avec un infarctus du myocarde
 - E. Peuvent être en rapport avec une colique hépatique
10. Les spondylarthropathies : (Cocher la réponse fausse):
- A/ Peuvent être révélées par des enthésopathies
 - B/ Peuvent entraîner une sciaticque de type S1
 - C/ Peuvent entraîner une oligoarthritis périphérique
 - D/ Peuvent être en rapport avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin
 - E/ Toutes ces propositions sont fausses
11. La névralgie crurale (Cocher la réponse fausse):
- A/ Est en rapport avec une atteinte de la racine L5
 - B/ Entraîne une douleur au point d'émergence de la racine
 - C/ Suit le trajet: face antérieure de la cuisse, face antérieure du genou
 - D/ Se continue jusqu'à la face interne de la jambe.
 - E/ Est augmentée par la manœuvre qui consiste, sur le malade en décubitus ventral, à pratiquer une hyper-extension de la cuisse sur le bassin.
12. Au cours de la sciaticque de type S1 (Cocher la réponse fausse):
- A/ La douleur suit le trajet : fesse, face postérieure de la cuisse,
 - B/ La douleur poursuit le trajet : face postérieure de la jambe, face dorsal du pied et premiers orteils
 - C/ La douleur est augmentée par la manœuvre qui consiste, sur le malade en décubitus dorsal, à fléchir le membre inférieur sur le bassin
 - D/ L'étiologie peut être une infection
 - E/ L'étiologie peut être en rapport avec une néoplasie
13. La polyarthrite rhumatoïde (Cocher la réponse fausse)
- A/ Peut entraîner un handicap de la main
 - B/ Peut se compliquer de manifestations extra articulaires
 - C/ Peut être retenue sur un ensemble de critères
 - D/ Les anticorps antinucléaires sont un bon argument pour le diagnostic
 - E/ Les anticorps anti CCP sont un bon argument pour le diagnostic

ResiPharmaTM

Cocher la réponse fausse

14. Le purpura (cocher la réponse fausse):
- A. Peut être en rapport avec une thrombopénie,
 - B. Peut être en rapport avec une Inflammation des vaisseaux,
 - C. Peut être punctiforme ou lenticulaire
 - D. Peut être en vibice,
 - E. S'efface à la vitro-pression
15. Concernant les lésions primaires dermatologiques (cocher la réponse fausse) :
- A. La papule est une élevation cutanée, circonscrite inférieure à 1 cm
 - B. La phlyctène: est une élevation, contenant une sérosité, inférieure à 1 cm.
 - C. La pustule est semblable à la bulle, elle n'en diffère que par son contenu purulent.
 - D. La nouure a les mêmes caractères qu'un nodule mais elle dépasse 1 cm
 - E. Le kyste est une cavité remplie de liquide et située dans le derme ou l'hypoderme
16. La macule (cocher la réponse fausse):
- A. Est une tache réalisant une modification parcellaire de la teinte des téguments sans modification de l'épaisseur,
 - B. A un diamètre est supérieur à 1 cm.
 - C. Peut être purpurique
 - D. Peut être une ectasie des petits vaisseaux
 - E. Peut être pigmentaire.
17. Sémiologie génitale féminin : cocher la réponse fausse parmi ces propositions :
- A. Une leucorrhée caillebotée évoque une infection à pseudomonas
 - B. Une leucorrhée blanchâtre évoque une infection à candida albicans
 - C. Une sécrétion transparente (blanc d'œuf) évoque un état physiologique
 - D. Une sécrétion blanc-jaunâtre évoque une infection à trichomonas vaginal
 - E. Les pertes sanglantes noirâtres ou sepia évoquent une grossesse extra utérine
18. Sémiologie génitale Cochez la réponse fausse parmi ces propositions :
- A. Priapisme : érection irréductible douloureuse
 - B. Phymosis : la rétraction du prépuce derrière le gland est impossible
 - C. Pollakiménorrhée : règles trop rapprochées par raccourcissement de la durée des cycles
 - D. Ménarchie : âge d'apparition des premières règles
 - E. Métorragies : règles abondantes

ResiPharmaTM

Cocher la réponse juste

19. Cocher la réponse juste parmi ces propositions (Cocher la réponse juste)
A/ Le sédiment urinaire doit être mis au réfrigérateur si l'examen est retardé
B/ L'hématurie macroscopique émise avec caillot évoque une cause parenchymateuse
C/ L'hématurie terminale est habituellement d'origine vésicale
D/ La présence de cylindre hématique évoque une cause urologique
E/ Les hématies déformées évoquent une cause urologique
20. Cocher la réponse juste parmi ces propositions (Cocher la réponse juste) :
A/ Une fausse hématurie peut être en rapport avec la prise de rifampicine,
B/ L'anurie est rapport avec un adénome de la prostate
C/ La polyurie peut être en rapport avec une diminution de la sécrétion de l'antidiurétique hormone
D/ les réponses A et C sont exactes
E/ Les réponses A, B et C sont exactes
21. La colique néphrétique (Cocher la réponse juste) :
A/ Siège: hypocondre unilatéral et à irradiations descendantes vers la région inguinogénitale.
B/ Est intense, extrême, permanente avec paroxysmes, le malade est agité, anxieux,
C/ Est déclenchée par les micro-traumatismes
D/ les réponses B et C sont exactes
E/ Les réponses A, B et C sont exactes
22. Une névralgie essentielle du trijumeau (cocher la réponse juste) :
1. A un fond douloureux continu
2. S'accompagne d'un déficit sensitif facial
3. Est provoquée par la stimulation d'une zone gâchette
4. Est paroxystique
5. S'installe progressivement
A : 1,2 B : 1,2,3 C : 2,3,4 D : 1,3,4,5 E : 3,4
23. Une femme de 30 ans présente des douleurs de l'hémiface survenant de façon paroxystique déclenchées par la mastication. Quel diagnostic évoquez-vous ? (cocher la réponse juste)
A. Otite aiguë
B. Sinusite maxillaire aiguë
C. Maladie de Horton
D. Glaucome
E. Aucun des diagnostics précédents
24. Une algie vasculaire de la face peut comporter (cocher la réponse juste) :
A. Des douleurs fulgurantes provoquées par le contact
B. Une rhinorrhée, une injection conjonctivale
C. Une hypoesthésie cornéenne
D. Un fond douloureux continu
E. Des douleurs bilatérales
25. Les céphalées, palpitations, tachycardie, flush syndrome associés à une HTA paroxystique évoque en priorité (Cocher la réponse juste) :
A/ Un syndrome de Cushing
B/ Un hyperaldostéronisme primaire
C/ Une insuffisance cardiaque
D/ Une hyperthyroïdie
E/ Toutes ces réponses sont fausses

ResiPharmaTM

3ème ANNEE DE PHARMACIE - EMD 2 /EMD1-S2-2018/2019- SEMIOLOGIE

Page 1/1

Date de l'épreuve : 10/07/2019

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	C	0,8
2	C	0,8
3	D	0,8
4	E	0,8
5	B	0,8
6	E	0,8
7	E	0,8
8	A	0,8
9	A	0,8
10	E	0,8
11	A	0,8
12	B	0,8
13	D	0,8
14	E	0,8
15	B	0,8
16	B	0,8
17	A	0,8
18	E	0,8
19	C	0,8
20	D	0,8
21	D	0,8
22	E	0,8
23	E	0,8
24	B	0,8
25	E	0,8

