

1. **Chez un sujet migraineux, les accès de céphalées :** (cochez les réponses justes)
- A. Peuvent s'accompagner de troubles visuels
 - B. Durent habituellement moins d'une heure (entre 4 à 72h)
 - C. Intéressent toujours le même côté du crâne
 - D. Sont parfois accompagnés de vomissements
 - E. Peuvent s'accompagner de modifications de l'humeur
2. **En présence d'une hémicrânie précédée de troubles visuels, accompagnée de nausées, sans anomalie objective à l'examen, vous évoquez en premier lieu :** (cochez la réponse juste)
- A. Une paralysie du nerf moteur oculaire externe
 - B. Un herpès oculaire
 - C. Une uvéite
 - D. Une migraine ophtalmique
 - E. Une névralgie essentielle du trijumeau
3. **La migraine ophtalmique se caractérise par une ou plusieurs des éventualités suivantes :** (cochez les réponses justes)
- A. Scotomes scintillants précédant la céphalée
 - B. Scotomes hémianopsiques précédant la céphalée
 - C. Diplopie par paralysie du III suivant la céphalée
 - D. Diplopie par la paralysie du VI suivant la céphalée
 - E. Cécité binoculaire transitoire
4. **Une crise migraineuse peut se manifester par :** (cochez les réponses justes)
- A. Des nausées
 - B. Un scotome scintillant
 - C. Paresthésies cheiro-oraux
 - D. Une aphasie
 - E. Un œdème papillaire avec exsudats et hémorragies rétinienne
5. **La névralgie du trijumeau :** (cochez les réponses justes).
- A. La douleur est bilatérale.
 - B. Siège exclusivement sur le trajet d'une des branches du nerf trijumeau.
 - C. La moindre atypie à la symptomatologie ou à l'examen pose la question d'une névralgie secondaire.
 - D. Elle est souvent déclenchée par l'excitation d'un territoire cutané ou muqueux (zone gâchette).
 - E. Toutes les réponses sont justes
6. **L'algie vasculaire de la face (AVF) :** (cochez les réponses justes).
- A. Elle s'associe le plus souvent à des signes végétatifs.
 - B. La douleur peut être bilatérale.
 - C. L'AVF sévère s'accompagne d'un état d'agitation quasi systématique
 - D. La douleur est de faible intensité.
 - E. L'AVF est une crise localisée autour de l'œil
7. **Parmi les signes cliniques cités ci-dessous, lesquels sont en faveur du syndrome d'hypertension intra-crânienne** (cochez les réponses justes).
- A. Des céphalées diffuses, et tenaces (peu sensibles aux antalgiques usuels)
 - B. Une paralysie du nerf oculomoteur externe
 - C. Un signe de Kernig
 - D. Des paresthésies cheiro-oraux
 - E. Un œdème papillaire
8. **Dans le cadre sémiologique de la névralgie essentielle du trijumeau** (Cochez les réponses justes)
- A. Elle prédomine chez le sujet jeune
 - B. Son siège est toujours bilatéral, touchant la branche V2 ou V3, exceptionnellement la V1,
 - C. L'examen neurologique est normal
 - D. Les douleurs sont ressenties comme des brûlures
 - E. La douleur peut être déclenchée par effleurement d'une zone cutanée ou muqueuse

9. L'examen dermatologique comporte, (cochez les réponses justes)

- A- L'inspection
- B- La palpation
- C- La biopsie cutanée
- D- La vitro pression
- E- Une cytoponction

10. L'exploration cutanée consiste à faire, (cochez les réponses justes)

- A- Une photographie
- B- Un téléthorax
- C- Une biopsie cutanée
- D- Une dermatoscopie
- E- Un hémogramme

11. Parmi ces lésions, quelles lésions élémentaires ne sont pas primitives, (cochez les réponses justes)

- A- Macule
- B- Squame
- C- Croute
- D- Bulle
- E- Pustule

12. les lésions élémentaires secondaires sont : (cochez les réponses justes)

- A- Erosion
- B- Croute
- C- Cicatrice
- D- Ulcération
- E- Vésicule

13. la croute est un coagulum d'exsudat (séreux, hémorragique ou purulent) qui correspond à un stade évolutif de lésions élémentaires suivantes, (cochez les réponses justes)

- A- bulle
- B- vésicule
- C- papule
- D- pustule
- E- macule pigmentaire

14. La peau se compose de : (cochez les réponses justes)

- A. L'épiderme
- B. La jonction dermo-épidermique

- C. Le derme
- D. L'hypoderme
- E. Les poils

15. La triade de Virchow associe (cocher la réponse juste)

- A- Lésion pariétale, stase veineuse et anomalie de l'hémostase
- B- Lésion pariétale, stase artérielle et anomalie de l'hémostase
- C- Lésion pariétale, stase veineuse et hypocoagulabilité
- D- Déficit congénital en protéine C, déficit congénital en Protéine S et stase veineuse
- E- Stase veineuse et artérielle, lésion endothéliale et anomalie de l'hémostase

16. Les propositions concernant les D dimères sont : (cochez les réponses justes)

- A- Un produit de dégradation de la fibrine lors du processus de fibrinolyse.
- B- Très bonne valeur prédictive négative lors de la suspicion de thrombose
- C- Le dosage de D dimères est une étape importante pouvant permettre d'écarter le diagnostic de maladies thromboembolique en dessus de 1000µg/l.
- D- Le test Elisa réalisé pour le dosage de D dimères a une forte sensibilité et une faible spécificité
- E- Le test Elisa réalisé pour le dosage de D dimères a une faible sensibilité et une forte spécificité

17. Les examens para cliniques permettant de poser le diagnostic avec certitude de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs avec certitude est (cocher les réponses justes) :

- A- Echographie doppler des membres inférieurs
- B- Dosage des D dimères
- C- Angioscanner
- D- Radiographie du Thorax

ResiPharma™

E- Echocardiographie Doppler.

18- Parmi les propositions concernant le traitement de la thrombose veineuse : (cochez les réponses justes)

- A- Le traitement de la thrombose doit être instauré en urgence
- B- Le traitement doit faire appel aux anticoagulants (héparines et anti vitamines K)
- C- Le but du traitement est de limiter l'extension du thrombus et de prévenir la migration embolique
- D- Le traitement doit faire appel aux antiagrégants plaquettaires
- E- Le traitement doit faire appel aux agents de la biothérapie

19- Les différentes techniques de la biométrie (cochez les réponses justes)

- A. La géométrie de la main
- B. Le groupe sanguin
- C. Scanner de la rétine
- D. La taille et le poids
- E. La reconnaissance faciale

20- Les limites de la biométrie (cochez les réponses justes)

- A. Un matériel encombrant
- B. Du personnel qualifié
- C. Peut être trompée par divers stratagème
- D. Une coopération préalable des sujets
- E. Création d'une banque de données

21- Pourquoi la biométrie (cochez les réponses justes)

- A. Un besoin de sécurité
- B. Une authentification des sujets
- C. Le contrôle des naissances
- D. Le recensement
- E. Améliorer le niveau socio-économique

22- Définition de la biométrie (cochez les réponses justes)

- A. Une cartographie
- B. Une identification individuelle

- C. Mesure des caractéristiques physiques
- D. Une banque de données de mesures
- E. Une empreinte digitale

23. Lors d'une arthrite : (cochez les réponses justes)

- A. La radiographie de l'articulation concernée est d'emblée pathologique.
- B. Il existe des ostéophytes.
- C. L'évolution se fait vers l'ankylose.
- D. Le liquide de la ponction articulaire est pauvre en cellules.
- E. L'arthrite sub aigue s'accompagne de signes inflammatoires modérés.

24. La douleur inflammatoire : (cochez les réponses justes)

- A- Est à son paroxysme en début de soirée.
- B- S'accompagne d'un dérouillage matinal.
- C- Réveille le patient durant la deuxième partie de la nuit.
- D- Est surtout influencée par l'effort.
- E- S'accompagne d'une impotence fonctionnelle.

25. L'arthrite aigue est une affection: (cochez la réponse juste)

- A. Inflammatoire
- B. Infectieuse
- C. Dégénérative
- D. Bactérienne spécifique
- E. Toutes ces réponses sont justes

26. La contamination articulaire provoquant l'arthrite aigue se fait par: (cochez les réponses justes)

- A. Voie hématogène
- B. Contigüité
- C. Inoculation directe
- D. A distance
- E. Par les expectorations

27. L'arthrite aigue se manifeste par: (cochez les réponses justes)

ResiPharmaTM

E- Echocardiographie Doppler.

18- Parmi les propositions concernant le traitement de la thrombose veineuse : (cochez les réponses justes)

- A- Le traitement de la thrombose doit être instauré en urgence
- B- Le traitement doit faire appel aux anticoagulants (héparines et anti vitamines K)
- C- Le but du traitement est de limiter l'extension du thrombus et de prévenir la migration embolique
- D- Le traitement doit faire appel aux antiagrégants plaquettaires
- E- Le traitement doit faire appel aux agents de la biothérapie

19- Les différentes techniques de la biométrie (cochez les réponses justes)

- A. La géométrie de la main
- B. Le groupe sanguin
- C. Scanner de la rétine
- D. La taille et le poids
- E. La reconnaissance faciale

20- Les limites de la biométrie (cochez les réponses justes)

- A. Un matériel encombrant
- B. Du personnel qualifié
- C. Peut être trompée par divers stratagème
- D. Une coopération préalable des sujets
- E. Création d'une banque de données

21- Pourquoi la biométrie (cochez les réponses justes)

- A. Un besoin de sécurité
- B. Une authentification des sujets
- C. Le contrôle des naissances
- D. Le recensement
- E. Améliorer le niveau socio-économique

22- Définition de la biométrie (cochez les réponses justes)

- A. Une cartographie
- B. Une identification individuelle

- C. Mesure des caractéristiques physiques
- D. Une banque de données de mesures
- E. Une empreinte digitale

23. Lors d'une arthrite : (cochez les réponses justes)

- A. La radiographie de l'articulation concernée est d'emblée pathologique.
- B. Il existe des ostéophytes.
- C. L'évolution se fait vers l'ankylose.
- D. Le liquide de la ponction articulaire est pauvre en cellules.
- E. L'arthrite sub aigue s'accompagne de signes inflammatoires modérés.

24. La douleur inflammatoire : (cochez les réponses justes)

- A- Est à son paroxysme en début de soirée.
- B- S'accompagne d'un dérouillage matinal.
- C- Réveille le patient durant la deuxième partie de la nuit.
- D- Est surtout influencée par l'effort.
- E- S'accompagne d'une impotence fonctionnelle.

25. L'arthrite aigue est une affection: (cochez la réponse juste)

- A. Inflammatoire
- B. Infectieuse
- C. Dégénérative
- D. Bactérienne spécifique
- E. Toutes ces réponses sont justes

26. La contamination articulaire provoquant l'arthrite aigue se fait par: (cochez les réponses justes)

- A. Voie hématogène
- B. Contigüité
- C. Inoculation directe
- D. A distance
- E. Par les expectorations

27. L'arthrite aigue se manifeste par: (cochez les réponses justes)

- A. Douleur inflammatoire
- B. Impotence fonctionnelle relative
- C. Diminution de l'amplitude articulaire
- D. Craquement articulaire à la mobilisation
- E. Toutes ces réponses sont justes

28. Radiographie de l'Arthrite aiguë au stade de début : (cochez les réponses justes)

- A. Interligne articulaire normal
- B. Elargissement de l'interligne articulaire
- C. Un pincement de l'interligne articulaire
- D. Tuméfaction des parties molles
- E. Présence de signes de destruction ostéoarticulaire

29. La ponction articulaire permet: (cochez les réponses justes)

- A. L'étude cytologique
- B. Le diagnostic bactériologique
- C. L'étude biochimique
- D. Prélèvement de membrane synoviale
- E. Toutes ces réponses sont justes

30. L'arthrite microcristalline est une arthrite due au : (cochez les réponses justes)

- A. Dépôts de Microcristaux d'acide urique
- B. Dépôts de Pyrophosphate de calcium
- C. Hyperglycémies
- D. Bactéries
- E. Parasites

ResiPharmaTM