

(QCM : 30 propositions / Questions QROC : 02 questions)

I-QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

1- Les mesures anthropométriques comportent:

- A- Poids
- B- Taille
- C- Pression artérielle
- D- Tour de taille

2- Un indice de masse corporelle (IMC) est considéré normal si:

- A- Compris entre 25 et 30 kg/m²
- B- < 18 kg/m²
- C- ≥ 40 kg/m²
- D- Compris entre 18,5 et 24,9 kg/m²

3- Concernant les dysménorrhées :

- A- Ce sont des douleurs épigastriques
- B- Ce sont des douleurs pelviennes
- C- Elles sont cycliques
- D- Elles sont plus fréquentes chez l'adolescente

4- La contraception oestroprogestative agit en:

- A- Bloquant l'ovulation
- B- Modifiant la glaire cervicale
- C- Induisant une atrophie endométriale
- D- Inhibant les gonadotrophines hypophysaires

5- L'auto surveillance glycémique est impérative s'il s'agit:

- A- d'un diabétique de type 2 sous metformine.
- B- d'un diabétique de type 2 sous sulfamides.
- C- d'un diabétique de type 2 sous insuline.
- D- d'un diabétique de type 1.

6- Une fréquence élevée de glycémies capillaires est recommandée chez :

- A- Le diabétique de type 1.
- B- Le diabétique de type 2 non insulino traité.
- C- La femme en cas de diabète gestationnel.
- D- L'enfant.

7- L'hématurie d'origine urologique se caractérise par :

- A- Son aspect rougeâtre.
- B- Son aspect « coca-cola ».
- C- L'absence de cylindres au culot urinaire.
- D- L'association d'une protéinurie dépassant 1g/24h.

8- Une hématurie microscopique est définie par:

- A- la présence de 5 hématies/mm³ à l'examen cytologique urinaire quantitatif.
- B- la présence de plus de 500 hématies/mm³ à l'examen cytologique urinaire quantitatif.
- C- la présence de plus 10 hématies/mm³ à l'examen cytologique urinaire quantitatif.
- D- la présence de plus de 100 hématies/mm³ à l'examen cytologique urinaire quantitatif.

ResiPharmaTM

9- La gale est une dermatose infectieuse :

- A- d'origine parasitaire.
- B- d'origine mycologique.
- C- non prurigineuse.
- D- qui épargne le sujet âgé.

10- L'impétigo est une dermatose infectieuse :

- A- Qui prédomine chez l'adulte.
- B- Qui touche la couche profonde de la peau.
- C- Qui touche la couche superficielle de la peau.
- D- Qui peut être provoquée par le streptocoque.

11- Les migraines

- A sont des algies faciales vasculaires -
- b- la migraine s'accompagne d'un syndrome déficitaire
- c- les signes ophtalmiques précèdent les algies crâniennes vasculaires
- d- au cours des migraines la vasoconstriction précède la vasodilatation

12- Les céphalées

- A- sont toujours la traduction d'une atteinte endocrânienne
- B- devant des céphalées la prise de la TA, le Fond d'œil font parties de l'examen clinique
- C- les algies crâniennes vasculaires sont souvent matinales
- D- l'atteinte des hémisphères cérébraux se traduit par des céphalées

13- Toute diarrhée aiguë

- A- implique la réalisation d'une coproculture.
- B- l'hypothyroïdie provoque une diarrhée motrice
- C- les laxatifs provoquent une constipation
- D- la diarrhée chronique est l'émission de selles dont le poids dépasse 300g/24h pendant 21 jours

14- Devant une toux :

- A- il ne faut jamais prescrire d'anti-tussifs
- B- l'expectoration est le résultat de la toilette bronchique matinale
- C- les crachats de leannac sont en faveur de l'asthme bronchique
- D- il faut toujours récolter les expectorations.

15- Les signes évocateurs d'une douleur articulaire inflammatoire sont :

- A- Douleur déclenchée et augmentée par le mouvement
- B- Douleur nocturne avec une raideur matinale
- C- Syndrome inflammatoire biologique
- D- Douleur calmée par le repos

16- L'arthrose :

- A- Est une maladie dégénérative du cartilage articulaire
- B- L'atteinte primitive est synoviale
- C- Pathologie fréquente chez les hommes
- D- Est une maladie inflammatoire fréquente chez les sujets jeunes

ResiPharmaTM

17-Les facteurs de risque de l'arthrose sont :

- A- Le tabac
- B- L'alcoolisme
- C- L'obésité
- D- Les sports de contact

18-La précordialgie est :

- A- Un signe général
- B- Un signe fonctionnel
- C- Une douleur d'origine cardiaque
- D- Une douleur d'origine articulaire

19-Les facteurs favorisant la transpiration des pieds sont :

- A- Le stress
- B- Le froid
- C- Le traumatisme répété
- D- La forte chaleur

20-Lors de l'examen abdominale, La rate, se trouve dans quel cadran ?

- A- Le flanc Droit.
- B- La région hypogastrique
- C- L'hypochondre Gauche
- D- La région ombilicale.

21-Vous recevez en consultation une patiente qui se plaint de douleurs thoraciques. Quelles sont les caractéristiques sémiologiques à préciser pour cette douleur ?

- A- Le siège.
- B- L'intensité.
- C- L'irradiation.
- D- Les signes d'accompagnement.

22-Une patiente avec thrombophlébite du membre inférieur droit consulte pour douleur thoracique, unilatérale avec dyspnée. Quel le diagnostic à évoquer qui est une complication redoutable ?

- A- Un infarctus du myocarde.
- B- Une embolie pulmonaire.
- C- Une pleurésie.
- D- un zona.

23-Quel est l'examen à demander en première intention, en cas de douleurs thoraciques ?

- A- Le scanner thoracique.
- B- Le bilan biologique.
- C- L'électrocardiogramme : l'ECG.
- D- La radiographie thoracique.

24-Devant une acné du visage, Quels sont les éléments qui vous permettent d'évoquer des nodules ?

- A- une lésion avec un diamètre > 10 mm.
- B- Une évolution suppurative et cicatricielle.
- C- Des élevures marron.
- D- siégeant préférentiellement sur le ventre et les mains.

ResiPharmaTM

25- L'eczéma évolue en plusieurs phases. Parmi les propositions suivantes, quelle est la dernière phase ?

- A- La phase croûteuse ou desquamative.
- B- La phase nodulaire.
- C- La phase aqueuse.
- D- La phase microkystique.

26- L'HTA masquée se définit comme :

- A- PA normale au cabinet médical et en dehors du cabinet médical
- B- PA élevée au cabinet médical, associée à une PA élevée en dehors du cabinet médical
- C- PA élevée au cabinet médical et normale en dehors du cabinet médical
- D- PA normale au cabinet médical, associée à une PA élevée en dehors du cabinet médical

27- Il est recommandé de mesurer la PA en dehors du cabinet médical pour ?

- A- diagnostiquer une hypotension orthostatique
- B- évaluer l'efficacité du traitement antihypertenseur
- C- diagnostiquer l'HTA blouse blanche
- D- diagnostiquer l'HTA masquée

28- Les indications de l'HGPO au cours du diabète sucré sont :

- A- Le diabète gestationnel
- B- les états pré diabétiques
- C- Le diabète inaugural de type 2
- D- Le diabète de type 1

29- Les complications dégénératives chroniques du diabète sucré sont :

- A- Rétinopathie
- B- Neuropathie
- C- Néphropathie
- D- Macroangiopathie

30- L'obésité androïde est un :

- A- Facteur de risque de complications arthrosiques
- B- Facteur de risque de complications cardiovasculaires
- C- Facteur de risque de développer un diabète de type 2
- D- Toutes les propositions sont justes

II- Questions QROC

- A- Citez les différents stades de la dyspnée avec leurs caractéristiques sémiologiques
- B- Citez les circonstances de découverte du diabète sucré de type 2

Bon courage

ResiPharmaTM

1 abd

2 d

3 bcd

4 abc

5 cd

6 acd

7 ac

8 c

9 a

10 cd

11 bc

12 bc

13 d

14 cd

15 bc

16 a



10 cd

11 bc

12 bc

13 d

14 cd

15 bc

16 a

17 cd

18 bc

19 ad

20 c

21 abcd

22 b

23 c

24 ab

25 a

26 d

27 bcd

28 ab

29 abcd

30 bc

