

1. L'obésité classe 1 est définie par un indice de masse corporelle (IMC) :

- A. $< 18,5 \text{ kg/m}^2$
- B. Compris entre 18,5 et 24,9 kg/m^2
- C. Compris entre 25-29,9 kg/m^2
- D. Compris entre 30-34,9 kg/m^2
- E. Compris entre 35-39,9 kg/m^2

2. Une dyspnée survenant lors d'activités physiques habituelle est classée selon la New York Heart Association (NYHA) :

- A. Stade un.
- B. Stade deux.
- C. Stade trois.
- D. Stade quatre.
- E. Stade cinq.

3. Les arthralgies de type mécanique sont : (1RF)

- A. Améliorées par les mouvements
- B. Minimum en début de journée
- C. Améliorées par le repos
- D. Souvent non accompagnées d'une raideur matinale
- E. Cède la nuit

4. Tous ces caractères d'une douleur thoracique survenant brutalement chez un sujet de 60ans, permettent d'évoquer le diagnostic de syndrome coronarien, sauf un, lequel ?

- A. Siège rétrosternal
- B. Irradiant au bras gauche
- C. intense
- D. Accompagnée de fièvre
- E. Accompagnée d'une dyspnée d'effort

5. Tous ces signes cliniques, sont évocateurs de diabète sauf 1. Lequel ?

- A. Fatigue.
- B. Syndrome polyuropolydipsique.
- C. Somnolence
- D. Langue sèche.
- E. Prise de poids

6. Parmi ces complications chroniques du diabète, laquelle est secondaire à une microangiopathie (RF) :

- A. Rétinopathie
- B. Néphropathie
- C. Artériopathie des membres inférieurs
- D. Neuropathie
- E. Gastroparésie

7. Parmi les propositions suivantes concernant les migraines, indiquez celle qui est exacte :

- A. C'est une douleur pulsatile et bilatérale
- B. Elle s'accompagne de photophobie
- C. Elle est 3 fois plus fréquente chez l'homme
- D. Elle survient pendant le sommeil et réveille le patient.
- E. Elle débute brutalement sans signes prodromiques.

8. Toutes ces situations peuvent être à l'origine d'une hyperthermie sauf 1. Laquelle ?

- A. sepsis
- B. cancer
- C. effort
- D. l'hypothyroïdie
- E. déshydratation

9. Toutes ces lésions dermatologiques sont des macules sauf 1. Laquelle ?

- A. Erythème
- B. Télangiectasie
- C. Chéloïde
- D. Angiome plan
- E. Purpura

10. Une hypoglycémie est évoquée devant toutes ces manifestations (RF) :

- A. Pâleur
- B. Convulsions
- C. Sueurs
- D. Soif
- E. Pic hypertensif

11. L'une des affirmations suivantes concernant l'insulinothérapie est fautive. Laquelle ?

- A. L'insuline ordinaire peut être mélangée dans la même seringue avec une insuline retard cristalline ou amorphe de même pH.
- B. L'insuline doit impérativement être périmée de dégradation être conservée à 0 degré entre les injections.
- C. En pratique clinique, les insulines lentes et NPH ont une durée d'action voisine de 16 à 24 heures.
- D. L'insuline ordinaire injectée en sous-cutanée a son effet maximum en 2 à 3 heures.
- E. L'insuline a une 1/2 vie plasmatique courte (7 à 10 mn).

12. Dans le diabète sucré de type 2 (RJ)

- A. L'obésité est due au diabète.
- B. Le diabète type 2 est toujours héréditaire.
- C. Il ne nécessite jamais de l'insuline.
- D. Il ne concerne pas les enfants.
- E. Expose au risque cardiovasculaire.

13. Les oestrogénostatifs contenus dans les pilules contraceptives (RF) :

- A. Empêchent la production de FSH et de LH.
- B. Bloquent l'ovulation.
- C. S'opposent à la prolifération de l'endomètre utérin.
- D. Modifient la glaire cervicale.
- E. Ont une action spermicide.

14. La douleur de l'arthrose a les caractéristiques suivantes (RF) :

- A. Type mécanique.
- B. Début progressif.
- C. Horaire nocturne avec dérouillage matinal.
- D. Calmée par le repos.
- E. Articulation tuméfiée.

15. La lésion élémentaire de l'urticaire est (RJ) :

- A. Une macule achromique.
- B. Une papule œdémateuse prurigineuse.
- C. Une vésicule s'ulcérant secondairement.
- D. Une pustulose généralisée.
- E. Une lésion érythémato-squameuse.

16. Les signes cliniques de l'œdème pulmonaire aigu sont (1RF)

- A. Une détresse respiratoire brutale avec bradypnée superficielle.
- B. Une orthopnée.
- C. Une expectoration aigue, abondante, mousseuse.
- D. Un grésillement laryngé.
- E. Un tirage sus-claviculaire et intercostal.

17. Toutes ces maladies peuvent être à l'origine de céphalées secondaires sauf une. Laquelle ?

- A. Glaucome aigu.
- B. Méningite.
- C. Conjonctivite.
- D. Tumeur cérébrale.
- E. Maladie de Horton.

18. Quel est l'indice de masse corporelle d'une femme diabétique de type 1, âgée de 40 ans, mesurant 1,65 m et pesant 85 kg ?

- A. 29 Kg/m²
- B. 22 Kg/m²
- C. 31 Kg/m²
- D. 24 Kg/m²
- E. 25 Kg/m²

19. L'interrogatoire a pour bute (RF) :

- A. Recueil de données.
- B. Etablir une relation de confiance avec le patient.
- C. Etablir un diagnostic de certitude.
- D. Connaître les plaintes du patient.
- E. 1ère étape du diagnostic.

ResiPharmaTM

20. Le diabète de type 1 est caractérisée par une anomalie au niveau : (1RJ)

- A. du tissu adipeux
- B. du foie
- C. du pancréas
- D. des muscles
- E. du cerveau

21. Tous ces symptômes sont des signes généraux (RF) :

- A. Ictère
- B. Fièvre
- C. Amaigrissement
- D. Anorexie
- E. Asthénie

22. causes d'hypothermie (RF) :

- A. Sepsis
- B. Hyperthyroïdie
- C. Hypothyroïdie
- D. Hypoglycémie
- E. sujet âgés

23. La macule est caractérisée par (RF) :

- A. Lésion circonscrite, sans modification de surface
- B. Mesure > 1cm
- C. Mesure < 1 cm
- D. Sans relief, ni induration
- E. Lésion élémentaire fréquente

24. Le nodule est caractérisé par (RF) :

- A. Lésion circonscrite, arrondie
- B. Contenu solide
- C. Papule de > 1 cm de diamètre
- D. Surélevée à la surface de la peau
- E. Contenu liquide

25. L'impétigo (RF) :

- A. Immunisant
- B. Autoinoculable, non immunisant
- C. Bulles superficielles sous cornée, flasque, fragile
- D. habituellement ne s'accompagne pas de fièvre
- E. Infection des couches superficielles de l'épiderme par du strepto B hémolytique du groupe A ou staph doré.

26. Signes cliniques de l'érysipèle des membres inférieurs (RF) :

- A. grosse jambe rouge
- B. fièvre
- C. frisson
- D. adénopathie
- E. absence des pouls pédieux

27. L'eczéma (RJ) :

- A. est une dermatose rare
- B. Nappe érythémateuse, vésiculeuse, non prurigineuse
- C. ne récidive jamais
- D. survient volontiers sur terrain atopique
- E. ne surinfecte jamais

28. La contraception orale par œstroprogestatifs est contre-indiquée quand existe : (1RF)

- A. Une HTA
- B. Une intolérance aux hydrates de carbone
- C. Une endométriose
- D. Une hyperlipémie
- E. Un antécédent de cancer mammaire

29. Quelles lésion ne s'effacent pas à la vitropression (RJ) :

- A. érythème.
- B. Angiome plan.
- C. Purpura.
- D. Photodermatose.
- E. Télangiectasie

30. La dysménorrhée est une douleur aux caractéristiques suivantes (RF) :

- A. Siège hypogastrique.
- B. Type de colique.
- C. Sans irradiation.
- D. Sans périodicité.
- E. Association parfois avec des nausées et vomissements

31. La culture métrézine est une douleur irradiant au niveau de la fosse lombaire avec une irradiation (RF):

- A. Sous occipitale.
- B. Rétrosternale.
- C. Vers le flanc, les organes génitaux et la cuisse.
- D. Transversaire.
- E. Neurovégétative.

32. Les complications aiguës du diabète sont (RF):

- A. Hypoglycémie.
- B. Coma acidocétotique.
- C. Coma hyperosmolaire.
- D. Hypoglycémie.
- E. Microalbuminurie.

33. L'orthopnée est (RF):

- A. Une dyspnée en position debout.
- B. Une dyspnée à la marche rapide.
- C. Une dyspnée à la montée des escaliers.
- D. Une dyspnée expiratoire.
- E. Une dyspnée au décubitus dorsal.

34. L'augmentation de l'incidence du diabète sucré est expliquée par (RF):

- A. Le réchauffement climatique.
- B. Le vieillissement de la population.
- C. L'augmentation de la sédentarité.
- D. La modification de l'hygiène alimentaire.
- E. L'augmentation de l'incidence du surpoids.

35. Causes d'arthralgies (RF):

- A. Rhumatisme inflammatoire.
- B. HTA.
- C. Arthrose.
- D. Syndrome grippal.
- E. Connectivites.

36. La sciatique L5 est caractérisée par (RF):

- A. Débute à la face postérieure de la fesse.
- B. Très fréquente.
- C. Ne s'aggrave jamais.
- D. Trajet radiculaire.
- E. S'accompagne d'une impotence fonctionnelle.

37. La névralgie essentielle (RF):

- A. Fréquente chez la femme après 50 ans.
- B. Douleurs progressives.
- C. Bilatéral.
- D. Concerne le nerf vague.
- E. Peu intense.

38. La douleur thoracique est une urgence vitale dans les situations suivantes: (RF)

- A. Dissection aortique.
- B. Reflux gastro-œsophagien.
- C. Embolie pulmonaire.
- D. Infarctus du myocarde.
- E. Péricardite aiguë grave.

39. La péricardite aiguë est: (RF)

- A. Une inflammation du péricarde.
- B. Le plus souvent d'origine virale.
- C. Caractérisée par une douleur qui augmente à l'inspiration profonde.
- D. Caractérisée par une douleur soulagée par la position assise, penchée en avant.
- E. Caractérisée par une douleur soulagée par le décubitus dorsal.

40. Traitements hypoglycémiant du diabète type 2 (RF):

- A. Insuline lente.
- B. Insuline rapide.
- C. Sulfamide.
- D. Metformine.
- E. Agoniste GLP1.