

Université Ferhat Abbas Sétif-1

Faculté de Médecine – Département de pharmacie

Service de Médecine Interne du Pr R Malek

Examen de sémiologie pharmacie

10 JUIL 2019

Nom : *Timlouka*

Prénom : *Huyame*

ResiPharmaTM

1. Les éléments en faveur d'une hypoglycémie organique sont :

- A. La survenue de l'hypoglycémie à jeun ou à l'effort
- B. La survenue de l'hypoglycémie après le repas.
- C. La réponse favorable au resucrage.
- D. La non réponse au resucrage

2. Le diagnostic du diabète sucré est posé sur la base :

- A. D'un syndrome polyuro-polydipsique
- B. D'une glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/l à 2 reprises
- C. D'une hémoglobine A1C $\geq 6,5$ % à 2 reprises en l'absence d'obésité
- D. Devant une obésité

3. Un BMI (IMC) à 32 kg/m^2 correspond à :

- A. Une surcharge pondérale
- B. Un obésité de classe 2
- C. Un obésité de classe 3
- D. Un poids normal

4. Quelle est la formule qui permet de calculer le LDLcholestérol ?

- A. $\text{LDL-C} = \text{CT} + \text{HDL} - \text{TG}/5$
- B. $\text{LDL-C} = \text{CT} - \text{HDL} + \text{TG}/5$
- C. $\text{LDL-C} = \text{CT} - \text{HDL} - \text{TG}/5$
- D. $\text{LDL-C} = \text{CT} - \text{HDL}/\text{TG}$

5. Le vomissement :

- A. Est un signe général
- B. Est un signe fonctionnel
- C. Est toujours secondaire à une cause digestive
- D. Peut être d'origine cérébrale

6. Le symptôme :

- A. Est une plainte exprimée par le patient
- B. Est un signe physique
- C. Est un signe clinique
- D. Est une maladie

7. Les caractéristiques sémiologiques de la douleur de l'arthrose sont :

- A. Le dérouillage matinal
- B. Douleur spontanée déclenchée par le mouvement
- C. Douleur nocturne calmée par le mouvement
- D. Le craquement articulaire est fréquent

8. La polyarthrite rhumatoïde :

- A. Est une maladie dégénérative du cartilage articulaire
- B. L'atteinte primitive est synoviale
- C. Elle n'évolue jamais vers l'ankylose
- D. Elle peut se manifester par un gonflement de l'articulation
Avec des signes inflammatoires locaux

9: Devant des douleurs thoraciques quels sont les étiologies à éliminer en première intention ?

- A. Une embolie pulmonaire
- B. Une pneumopathie
- C. Une péricardite aigue
- D. Un zona thoracique

10. Quels sont les caractéristiques d'une douleur thoracique causée par une péricardite aigue ?

- A. Une douleur soulagée par l'antéflexion
- B. Une douleur majorée par la respiration
- C. Un microvoltage à l'électrocardiogramme
- D. Toutes les réponses sont fausses

11. Le mode de transmission de l'hépatite virale B

- A. Orale
- B. Sanguine
- C. Oro-fécale
- D. Sexuelle

12. Parmi les virus qui donnent une hépatite chronique :

- A. Virus de l'hépatite B
- B. Virus de l'hépatite A
- C. Virus de l'hépatite C
- D. Virus de l'hépatite D

13. Une hémorragie digestive haute peut s'extérioriser sous forme :

- A. Hématémèse
- B. Epistaxis
- C. Melèna
- D. Hématurie

14. Une rectorragie est définie par :

- A. Sang rouge émis par l'anus
- B. Sang rouge émis par la bouche
- C. Sang noirâtre émis par la bouche
- D. Sang noirâtre émis par l'anus

15. La constipation est définie par:

- A. Une difficulté à l'exonération
- B. Une consistance ferme des selles
- C. Moins d'une évacuation par 72h
- D. Pesée des selles plus de 150g par 24H

16. La diarrhée chronique est :

- A. L'émission de 03 selles liquidiennes par 24h
- B. Une diarrhée qui évolue depuis plus de 21 jours
- C. L'émission de plus de 300g par 24h
- D. toujours accompagnée d'une fièvre

17. Parmi les propositions suivantes concernant la toux lesquelles sont exactes :

- A. Une toux sèche doit être respectée
- B. Une toux productive nécessite un traitement antitussif
- C. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion peuvent être responsable d'une toux
- D. Une toux aigue avec fièvre nécessite une exploration

18. Concernant les dysménorrhées :

- A. Pathologie fréquente de l'adolescente
- B. Pathologie fréquente de la femme ménopausée
- C. Sont générées par une hyper contractilité du myomètre
- D. Sont générées par un relâchement du myomètre

19. La contraception d'urgence repose sur :

- A. L'administration de progestatifs le plutôt possible
- B. L'administration d'oestrogènes le plutôt possible
- C. La pose d'un dispositif intra-utérin en cuivre dans les 5 jours suivant le rapport sexuel à risque
- D. La pose d'un dispositif intra-utérin délivrant du lévonorgestrel

20. Parmi les mesures anthropométriques on a :

- A. Poids
- B. Taille
- C. Périmètre crânien
- D. Périmètre ombilical

ResiPharmaTM