

Examen de médecine pharmaceutique
12/10/2020 7h45 min

Nom :

Prénom :

1. L'asthme

- A. Survient au cours d'une insuffisance cardiaque
- B. Survient à l'effort
- C. Survient au décubitus
- D. Le bruit auscultatoire pulmonaire est de type sibilant

2. Le (les) signe(s) de mauvaise tolérance d'une

- A. Une HTA systolique-diastolique
- B. Un tirage des muscles intercostaux et sternocléidomastoïdien
- C. Une érythrose des conjonctives
- D. Une bradycardie

3. La réponse de l'asthme bronchique :

- A. Est une réponse inspiratoire
- B. Le début est aigu, stade I de la SHVA
- C. La fréquence respiratoire est inférieure à 20/min
- D. Bruit auscultatoire type crépitant

4. Parmi les éléments suivants quel est celui qui caractérise la névralgie du trijumeau ?

- A. Évolution par crises sur fond douloureux
- B. Violentes douleurs unilatérales
- C. Hyperesthésie dans le territoire du V
- D. Caractère rémittent de la douleur

5. La toux ne peut être à l'origine de :

- A. Syncope
- B. Pleurmothorax
- C. Incontinence urinaire
- D. Paralysie récurrentielle

6. Vérifier la réponse juste :

A. L'auto-surveillance glycémique, c'est contrôler régulièrement la glycémie

B. L'auto-surveillance glycémique remplace l'angiographie

C. Chez un diabétique type 2 sous ADO, 56 cmurds glycémiques sont recommandés

D. Le lecteur de la glycémie doit être changé tous les 2 ans

7. La mesure continue du glucose est :

- A. Indiquée chez le diabétique type 1 bien équilibré
- B. Indiquée en cas d'hypoglycémies non ressenties
- C. mesure le glucose en intracellulaire
- D. une moyenne de 100 scans/jour est recommandée

8. L'altération de l'état général est :

- A. Un signe physique
- B. Un signe fonctionnel
- C. Un syndrome clinique qui associe une raideur de la nuque, céphalée et vomissement
- D. Un syndrome qui associe une asthénie, amaigrissement, anorexie

9. Le signe physique est :

- A. Un signe récupéré par l'interrogatoire
- B. Un signe fonctionnel
- C. Un signe objectivé par le médecin lors d'une consultation
- D. Un symptôme para clinique

10. Concernant les hématuries quelle(s) affirmation(s) est (sont) exacte(s) :

- A. L'hématurie est une maladie
- B. L'hématurie est définie par la présence de sang dans les urines
- C. L'hématurie est la présence de sang dans les urines à l'occasion de miction
- D. Le diagnostic de l'hématurie est radiologique

11. parmi les causes d'hépatite chronique

- A. Infection virale A
- B. cirrhose
- C. infection virale B
- D. hépatite D

12. cocher la (les) repense(s) juste(s) parmi les propositions suivantes concernant les hémorragies digestives :

- A. Une hémorragie de l'estomac est une hémorragie digestive basse
- B. Une rectorragie est le rejet par l'anus de sang noir
- C. L'hématémèse est le rejet par l'anus de sang rouge ou noir
- D. La cause la plus fréquente de mélèna est l'hémorragie digestive haute

13. Le diagnostic du diabète sucré est posé sur la base :

- A. D'un syndrome polyuro-polydipsique
- B. D'un amaigrissement chez le DT1
- C. D'une surcharge ou obésité chez le DT2
- D. Aucune réponse juste

14. quel est ou quels sont les outils diagnostiques de l'obésité androïde ?

- A. Poids
- B. Taille
- C. BMI
- D. Tour de taille

15. L'automesure de la pression artérielle en ambulatoire (AMPA) est indiquée dans toutes ces situations sauf une la quelle :

- A. suspicion d'une HTA blouse blanche
- B. suspicion d'une HTA masquée
- C. fibrillation atriale
- D. sujet âgé

16. Chez un enfant de 06 ans qui présente une diarrhée aigue, fièvre et nausée, la (les) quelle(s) de ces prescriptions est (sont) justifiée(s) :

- A. Réhydratation par voie orale
- B. Ciprofloxacine
- C. Lopéramide
- D. Métronidazole

17. cocher la réponse fausse, il est recommandé de mesurer la PA en dehors du cabinet médical pour ?

- A. Diagnostiquer l'HTA blouse blanche
- B. Évaluer l'efficacité du traitement antihypertenseur
- C. Diagnostiquer une hypotension orthostatique
- D. Diagnostiquer l'HTA masquée

18. L'efficacité des méthodes contraceptives est estimée par :

- A. L'importance de l'atrophie qu'elles engendrent
- B. Leur activité antinidatoire
- C. Leur action toxique sur
- D. L'indice de Pearl

19. Parmi les méthodes de contracept d'urgence :

- A. Oestro-progéstatifs combinés
- B. Progestatifs
- C. Spermicides
- D. Préservatifs

20. l'obésité androïde pose un problème de santé publique par ses complications :

- A- complications respiratoires
- B- complications cardiovasculaires
- C- complications articulaires
- D- Toutes les propositions sont justes



Université de Sfax
FACULTÉ DE MÉDECINE

EXAMEN DE LA 3^{EME} ANNEE DE PHARMACIE / SEMIOLOGIE EMD1 2019-2020

Date de l'épreuve : 12/10/2020

Page

Corrigé Type

Barème par question : 1,000000

N°	Réponse
1	A
2	B
3	D
4	C
5	D
6	C
7	B
8	D
9	C
10	C
11	C
12	D
13	D
14	D
15	C
16	A
17	C
18	D
19	B
20	B

