

Nom : [REDACTED]

Prénom : [REDACTED]

1. Les signes de lutte respiratoire sont :

- A. Une diminution de la saturation en oxygène
- B. Un tirage sus claviculaire.
- C. Une tachycardie.
- D. Un balancement thoraco abdominal

2. A la recherche d'une hépatomégalie :

- A. Le patient est installé en décubitus latéral gauche
- ☒ B. Patient en décubitus dorsal genoux fléchis
- C. La palpation recherche le bord sup du foie
- D. La percussion recherche le bord inf du foie

3. La bandelette urinaire :

- A. Est un examen paraclinique réalisé au laboratoire
- B. Est réalisé au lit du malade
- C. Met en évidence une hématurie microscopique.
macroscopique
- ☒ D. Est toujours pathologique en cas d'infection urinaire

4. A l'interrogatoire

- A. Une otorragie est un écoulement de sang par le nez
- B. Une odynophagie est une gêne à la déglutition
- C. Une otorragie est un écoulement de pus par le nez
- D. L'hémoptysie est un saignement expectoré

5. La toux ne peut être à l'origine :

- A. Syncope
- B. Pneumothorax ?
- C. Incontinence urinaire
- D. Paralysie récurrentielle

6. Au cours du diabète de type 2 :

- A. la surcharge pondérale est à l'origine de l'insulinorésistance
- B. la mise en route du traitement doit commencer par les sulfamides hypoglycémiants
- C. l'insulinosécrétion est souvent augmentée en valeur absolue
- D. L'obésité est la conséquence du diabète.
obésité cause le diabète

7. La mesure continue du glucose est :

- A. Réservée aux patients sous pompe à insuline
- B. Indiquée en cas d'hypoglycémies non ressenties
- ☒ C. mesure le glucose en intracellulaire
- D. Est indiquée à tous les stades de la maladie

8. L'altération de l'état général est :

- A. Un signe physique
- B. Un signe fonctionnel
- C. Un syndrome clinique qui associe une raideur de la nuque, céphalée et vomissement
- ☒ D. Un syndrome qui associe une asthénie, amaigrissement, anorexie .

ResiPharmaTM

9. Les éléments en faveur d'une hypoglycémie organique sont :

- A. La survenue de l'hypoglycémie à jeun ou à l'effort
- B. La survenue de l'hypoglycémie après le repas.
- C. La réponse favorable au resucrage.
- D. La non réponse au resucrage

10. Concernant les hématuries macroscopiques quelle(s) affirmation(s) est (sont) exacte(s) :

- A. Est la présence de sang dans les urines
- B. Elle nécessite une confirmation par une bandelette urinaire
- C. Peut-être secondaire à une infection urinaire
- D. Elle ne nécessite que rarement une imagerie

ph. d'ap. in. m. ex. p. l.

11. La polyarthrite :

- A. Est un symptôme
- B. Peut-être secondaire à une maladie de système
- C. Est une maladie dégénérative
- D. Elle se manifeste par une douleur inflammatoire avec une impotence fonctionnelle.

12. L'arthrose :

- A. Est une maladie dégénérative des membranes synoviales
- B. L'atteinte primitive est cartilagineuse
- C. Elle est fréquente chez les sujets jeunes
- D. Elle se manifeste par un gonflement de l'articulation avec des signes inflammatoires locaux

13. Le diagnostic du diabète sucré est posé sur la base :

- A. D'un syndrome polyuro-polydipsique, amaigrissement.
- B. D'une glycosurie à la bandelette
- C. une glycémie casuelle 2g/L
- D. d'une glycémie capillaire sup à 1,26 g/l

14. Quel est ou quels sont les caractéristiques de l'obésité androïde

- A. Poids sup à 70 Kg
- B. Dépôt de tissus graisseux au niveau du tronc et abdomen
- C. BMI sup à 30 Kg/m²
- D. Est fréquente chez la femme

30 → 34,99 → obésité ①.

15. L'automesure de la pression artérielle en ambulatoire (AMPA) est indiquée en cas de :

- A. Suspicion d'une HTA blouse blanche
- B. Suspicion d'une HTA masquée
- C. Fibrillation atriale
- D. Sujet âgé

16. Au cours d'une diarrhée aiguë :

- A. Le syndrome dysentérique secondaire à une entérotoxine.
- B. Peut-être secondaire à la prise d'AINS
- C. Les ténésmes sont des faux besoins associés à des douleurs ombilicales
- D. Les épreintes sont des faux besoins associés à des douleurs sphinctériennes

17. Au cours du diabète type 2 ?

- A. L'auto surveillance glycémique est indispensable
- B. Le poids est un élément de surveillance capital
- C. Les sulfamides hypoglycémisants sont contre indiqués en cas d'insuffisance respiratoire
- D. Les biguanides agissent en faisant sécréter de l'insuline.

18. Concernant la contraception

- A. Elle empêche la fécondation de façon réversible et temporaire
- B. Elle empêche la fécondation de façon définitive
- C. L'efficacité des différentes méthodes contraceptives est évaluée par l'indice de Pearl
- D. Toutes les méthodes agissent en bloquant l'ovulation

ResiPharmaTM

19. Au cours de la contraception

A. La pillule oestroprogestative agit en inhibant les gonadotrophines hypophysaires

B. La pilule macro progestative agit en bloquant l'ovulation

C. La pillule d'urgence est utilisée le plutôt possible, en continue jusqu'à la survenue des menstruations

☒ D. Le dispositif intra utérin a une action antinidatoire

20. Dans la prise en charge thérapeutique de l'HTA :

A- les B bloqueurs sont contre indiquer chez la femme enceinte

B- les diurétiques thiazidiques sont indiquer en première intention chez le diabétique de type 2

C- Les B bloqueurs du système rénine sont contre indiqués à partir d'une clairance de créât à 20 ml/m

D- l'objective thérapeutique chez le sujet âge est de 150 /90 mm Hg

Bon courage

ResiPharmaTM



Université de Sfax 1
FACULTÉ DE MÉDECINE

3EME ANNEE PHARMACIE/ EXAMEN DE SEMIOLOGIE EMD2 2020-2021

Date de l'épreuve : 11/07/2021

$S_1 \rightarrow S_2$

Corrigé Type - Variante 1

Barème par question : 1.000000

N°	Rép.
1	BD
2	B
3	BC
4	D
5	D
6	AC
7	BD
8	D
9	BC
10	AC
11	BD
12	B
13	C
14	B
15	ABC
16	B
17	B
18	AC
19	D
20	D

