

Nom :

Prénom :

ResiPharmaTM

Le syndrome dysentérique est caractérisé par :

- A. Des épigastralgies
- B. Des diarrhées glairosanglantes
- C. Une constipation opiniâtre
- D. Des épreintes

Les diarrhées aiguës de type secondaire sont caractérisées par :

- A. Des selles peu abondantes
- B. Des selles abondantes
- C. Des coliques abondantes intenses
- D. Une incubation longue

Les diarrhées chroniques par mal absorption sont caractérisées par :

- . un aspect grasseux des selles
- . la présence de pus
- . un amaigrissement
- . des carences vitaminiques

Que permet la palpation lors de l'examen clinique ?

- . évaluer l'état de la peau et des muscles
- . rechercher une organomégalie
- . rechercher un tympanique

D. rechercher une matité

Les signes de gravité d'une douleur abdominale :

- Début progressif
- Associe à une dyspnée progressive
- Associe à une syncope.
- Elle s'aggrave à l'effort

06. Les critères de gravité d'une hémorragie digestive :

- A. nausées, vomissements
- B. fièvre
- C. amaigrissement
- D. présence de signes cliniques d'anémie.

07. Quels sont les caractéristiques d'une douleur abdominale d'origine fonctionnelle :

- A. la présence d'une lésion d'organe
- B. la présence d'un amaigrissement
- C. la survenue d'une hémorragie digestive
- D. ancienneté de la douleur

08. L'hypertension artérielle ne peut se compliquer de :

- A. D'accident vasculaire cérébral
- B. D'infarctus de myocarde
- C. D'insuffisance rénale chronique
- D. D'insuffisance hépatocellulaire

09. Les substances pro-hypertenseurs sont

- A. la réglisse
- B. la contraception ostéogénique
- C. les décongestionnants nasaux
- D. les anti-inflammatoires non stéroïdiens

10. concernant l'HTA :

- A. est définie en automesure par une pression systolique ≥ 140 mm hg
- B. la MAPA permet de diagnostiquer les non dipper
- C. HTA associée à une hypokaliémie fait évoquer une hyperthyroïdie
- D. la meilleure association thérapeutique en cas d'HTA est l'IEC

11. concernant la toux :

- A. C'est un acte réflexe de défense.
- B. Elle traduit une atteinte ORL
- C. Peut-être secondaire à un corps étranger
- D. Elle peut traduire une atteinte cardiaque

le virus de l'hépatite C :

- 1. est un virus à ADN
- 3. est transmis par voie parentérale
- C. l'infection peut être prévenue par vaccination
- 2. le dépistage de l'infection se fait par la recherche d'Ag -VHC

le syndrome de cholestase comporte :

- A. Une hyperbilirbune libre
- B. Augmentation des phosphatases alcalines
- C. Une augmentation des gamma GT
- D. Un test de KOLLER négatif

les contre-indications de la contraception hormonale :

- A. Une insuffisance hépatocellulaire
- B. Antécédents thromboemboliques
- C. Un cancer de sein
- D. Une néphropathie diabétique

l'impotence fonctionnelle :

- A. Est une raideur articulaire
- B. Est une douleur articulaire
- C. Est une paralysie des membres
- D. Est douleur plus une raideur articulaire

le taux de l'Hb A1C dans le pré diabète est de :

- 5,5 - 6,5%
- 5,7 - 6,4%.
- 5,4 - 6,4%
- 5 - 5,4%

17. les objectifs glycémiques chez la patiente durant la grossesse :

- A. glycémie à jeun : 0,6 – 0,95 g/l
- B. glycémie à jeun : 0,6 – 0,92 g/l
- C. glycémie à jeun : inf. à 1,20 g/l
- D. glycémie à jeun : inf. à 1,10 g/l

18. les facteurs susceptibles d'influencer les mécanismes de contre régulation au cours d'une hypoglycémie chez le diabétique type 2 :

- A. la durée d'évolution du diabète
- B. la répétitions des hypoglycémies
- C. l'Age avancé
- D. l'importance du déficit de l'insulinosécretion

19. que représente le schéma d'insulinothérapie basal ?

- A. deux injections rapides et deux injection NPH
- B. Deux injections NPH
- C. une à deux injections d'analogue long
- D. une insuline rapide et une insuline lente

20. selon les dernières recommandations IADPSG, à quel moment dépister le diabète gestationnel :

- A. après le premier trimestre
- B. entre 24 et 28 semaines de la grossesse
- C. dès le début de la grossesse
- D. à la fin de la grossesse

ResiPharmaTM

Bon courage