

1-L'eczéma de contact (Cochez les réponses justes)

1. Est secondaire à une réaction d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire de type th1
2. Est secondaire à une réaction d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire de type th2
3. Est secondaire à une réaction d'hypersensibilité immédiate
4. Evolue en 2 une phase de sensibilisation puis une phase de révélation
5. La phase de révélation survient chez un sujet déjà sensibilisé, 24 à 48 heures après un nouveau contact avec l'allergène,

2-La phase de sensibilisation au cours d'un eczéma de contact(Cochez les réponses justes)

1. Est cliniquement asymptomatique
2. Le produit sensibilisant peut être endogène ou exogène
3. Le produit sensibilisant est une substance de petite taille non immunogène
4. L'allergène est pris en charge par les cellules dendritiques de l'épiderme
5. Cette phase dure quelques minutes

3-Cliniquement, l'eczéma de contact (la réponse juste)

1. Evolue en 4 phases : Erythème, vésicules, suintement puis croûtes
2. Evolue en 4 phases : vésicules, suintement, croûtes puis érythème
3. Les lésions surviennent au site de contact sans possibilité généralisation secondaire
4. Les lésions guérissent en laissant une cicatrice
5. Les bords sont nets.

4- Les patch tests :(la réponse juste)

- 1- Différents allergènes sont appliqués sur le bras sous occlusion
- 2- La première lecture se fait après 72 heures
- 3- La batterie standard européenne contient 21 substances
4. La batterie standard européenne contient 27 substances
- 5- Le chrome est retrouvé dans les vernis et les peintures

5-le traitement d'un eczéma de contact repose sur (Cochez les réponses justes)

1. L'Arrêt du contact déclencheur si identifié
2. Traitement par dermocorticoïdes de force adaptée au site à traiter et à l'âge du patient
3. Une désensibilisation est nécessaire
4. Seule l'éviction définitive des contacts avec l'allergène permet de guérir les signes cliniques et évite les rechutes
5. Il faut consulter les listes d'ingrédients des cosmétiques pour vérifier que l'allergène n'est pas contenu dans le produit

ResiPharmaTM

6/Concernant l'arthrose, cochez la réponse juste :

- a) C'est une pathologie inflammatoire chronique
- b) Elle siège uniquement au niveau des genoux
- c) Elle est causée par la dégénérescence cartilagineuse
- d) Son traitement est toujours chirurgical
- e) Elle ne touche que le sujet âgé

La réponse juste : c

7/La douleur inflammatoire, cochez la réponse juste :

- a) Elle apparaît après l'effort et cède au repos
- b) S'accompagne de rougeur locale, chaleur et œdème
- c) Elle est maximale en fin de journée
- d) Elle est toujours d'origine rhumatismale
- e) Elle est soulagée uniquement par les antalgiques

La réponse juste : b

8/L'anti-inflammatoires stéroïdien (corticoïde), cochez la réponse juste :

- a) Possède une activité anti-inflammatoire plus importante que les AINS
- b) Sa durée d'action est moins longue que celle des AINS
- c) Ne peut être administré que par voie orale
- d) Il est contre indiqué dans la polyarthrite rhumatoïde
- e) Toutes les réponses sont justes

La réponse juste : a

ResiPharmaTM

9/Dans la douleur abdominale droite : la ou les réponse(s) fausse(s)

- a/Le caractère chronique a un impact sur son origine.
- b/Le caractère aigu a un impact sur son origine.
- c/L'origine appendiculaire ne peut être évoquée.
- d/Les affections duodénales en font parti.
- e/L'ulcère gastrique est toujours évoqué.

10/La douleur aigue abdominale droite peut être la manifestation clinique d'une (cochez la ou les réponses justes) :

- a/Appendicite aigue.
- b/Cholécystite aigue.
- c/Torsion aigue de l'ovaire droite.
- d/Sigmoidite aigue.
- e/Cystite aigue.

11/ Les Douleurs épigastriques : (une ou plusieurs réponses justes)

- a. Peuvent se présenter sous forme de brûlures.
- b. Peuvent être dues à un infarctus inférieur du myocarde.
- c. Peuvent être révélatrice d'une cystite aiguë.
- d. Peuvent être dues à une colique néphrétique.
- e. Peuvent être dues à une sigmoidite aiguë.

12/ Des épigastralgies paroxystiques nécessitent (une ou plusieurs réponses justes):

- a. Une échographie abdominale en urgence.
- b. Fibroscopie œsogastroduodénale.
- c. Artériographie cœliomésentérique.
- d. Une manométrie œsogastrique.
- e. Un traitement d'épreuve par antiacides.

13/ Une épigastralgie aiguë chez un jeune de 25 ans (une ou plusieurs réponses justes):

- a. Peut avoir un début brutal.
- b. Peut être révélatrice d'un ulcère duodénal.
- c. C'est une douleur à type de pesanteur.
- d. Peut être due à une prise d'anti-inflammatoire.
- e. Peut être calmée par la prise d'anti-inflammatoire par voie injectable.

14/ Devant un syndrome douloureux thoracique intense, quels sont les éléments en faveur d'une dissection aortique ?

- A. Asymétrie des pouls
- B. Perte de connaissance transitoire
- C. Douleur survenant à l'effort
- D. Absence de signe de souffrance myocardique à l'électrocardiogramme
- E. Antécédents d'hypertension artérielle

15/ L'orthopnée :

- A - Survient à l'orthostatisme
- B - Survient à l'effort
- C - Survient en décubitus
- D - Est un signe d'insuffisance cardiaque

16/ L'œdème aigu pulmonaire :

- A - Se manifeste par une détresse respiratoire aiguë
- B - Est une manifestation d'insuffisance cardiaque gauche
- C - Survient à l'effort
- D - Peut s'accompagner d'hémoptysie

17/ Quelle est la proposition exacte concernant la définition de l'hypertension artérielle :

- A. Les valeurs de référence ont été obtenues de façon invasive.
- B. Les valeurs de référence sont différentes chez l'homme et chez la femme.
- C. L'hypertension artérielle systolique isolée est définie par une pression artérielle systolique ≥ 160 mmHg et une pression artérielle diastolique normale.
- D. Les valeurs de référence sont différentes selon que l'on utilise la mesure clinique ou la mesure ambulatoire.
- E. Des chiffres tensionnels anormalement élevés au cours d'une consultation suffisent à retenir le diagnostic d'hypertension artérielle.

ResiPharmaTM

18/Parmi les propositions suivantes cochez la ou les réponses fausses :

- A- Une miction normale a un volume compris entre 100 et 300 ml
- B- La dysurie est définie comme une difficulté à la miction, la vessie se vide avec effort
- C- La pyurie est définie comme la fréquence exagérée des mictions.
- D - La pollakiurie c'est la présence de pus dans les urines.

19/L'oligurie est un trouble de la miction elle se définit par ; (cochez la ou les réponses fausses) :

- A- c'est une augmentation importante de la diurèse qui devient supérieure à 3 litres par 24 heures.
- B- une diminution importante de la diurèse qui devient inférieure à 300 ml par 24 heures.
- C- C'est la présence de sang dans les urines.

D- toutes les fois que la sonde introduite dans la vessie d'un malade qui n'a pas uriné depuis quelques heures ou quelques jours ne ramène pas d'urine

20- les douleurs pelviennes de siège hypogastrique et au niveau des fosses iliaques correspondent à (cochez la ou les réponses justes) :

- A- Une dyspareunie
- B- une leucorrhée
- C- une ménorragie
- D- une métrorragie
- E- une méno-métrorragie

21- des règles trop rapprochées par raccourcissement de la durée des cycles menstruels correspondent à (cochez la ou les réponses justes) :

- A- une spanio-ménorrhée
- B- une oligoménorrhée
- C- une pollakiménorrhée
- D- une aménorrhée
- E- une dysménorrhée

ResiPharmaTM

22- à le quel de ses 04 aspects sémiologiques correspondent les pertes vaginales physiologiques chez la femme en âge de procréation :

- A- Blanchâtres ressemblant à du lait caillé, abondantes
- B- Blanc-jaunâtre plus fluides, odorantes, parfois mousseuses
- C- Franchement purulentes jaunâtres ou verdâtres
- D- Transparentes, visqueuses et filantes.

23- à propos de la pilule contraceptive (cochez la ou les réponses justes) :

- A- Empêche les ovaires de libérer un œuf (ovulation).
- B- Modifie la paroi de l'utérus de sorte qu'il est difficile pour l'œuf d'y adhérer.
- C- Régularise les menstruations.
- D- Méthode difficilement réversible.
- E- Doit être prise à peu près au même moment chaque jour.

24- la méthode de contraception dite « MAMA » correspond à (cochez la ou les réponses justes) :

- A- ne s'applique que pour les femmes qui viennent d'accoucher et qui allaitent.
- B- Exige l'utilisation d'une autre forme de contraception après que le bébé a atteint l'âge de deux mois.
- C- Exige l'utilisation d'une autre forme de contraception si la femme a de nouveau ses menstruations.
- D- c'est une méthode de contraception hormonale.
- E- Comporte un risque très faible de grossesse si cette méthode n'est pas parfaitement suivie

25- parmi les caractéristiques du moyen contraceptif nommé « Dispositif Intra-utérin ou stérilet » [cochez la ou les réponses justes]

- A- Petit dispositif en forme de T, inséré dans l'utérus.
- B- Empêche l'œuf de rencontrer un spermatozoïde et d'adhérer à la paroi de l'utérus.
- C- Evite le risque de survenue de menstruations irrégulières.
- D- Augmente le risque de maladie pelvienne inflammatoire (MPI).

