

✓ 23- Le profil idéal du médicament légalement accessible à l'automédication est :

- ☒ a. Actif et peu toxique
- ☐ b. Non évalué
- ☒ c. Conditionnement adapté (Tt bref)
- ☐ d. Information non annexée
- ☒ e. AMM, non remboursable

ACE

✓ 24- Les dangers de l'automédication sont :

- ☒ a. Thérapeutique inadéquate
- ☒ b. Concerne souvent une population aisée.
- ☒ c. Possible masquage des symptômes par des médicaments
- ☒ d. Interactions médicamenteuses
- ☒ e. Effets indésirables de ces médicaments

ACDE

✓ 25- L'intérêt de l'auto médication :

- ☒ a. Réduction de la charge de dépenses : consultations évitées, réduction des dépenses pharmaceutiques (remboursées)
- ☐ b. Non Guidée par le médecin
- ☒ c. Attitude active envers la maladie
- ☒ d. Prise de conscience des coûts
- ☐ e. Circonstances : situations de non urgence, maladies aiguës

ACD

chronique

ResiPharmaTM

Bon Courage...

e. Une étude transversale ne peut pas être une étude analytique
L'épidémiologie analytique cherche à :

- ☒ a. Décrire la survenue d'une maladie dans une population
- ☒ b. Décrire les facteurs favorisants
- ☒ c. Déterminer une relation de causalité
- ☒ d. Evaluer le contrôle des facteurs de risque (évolutive)
- ☒ e. Contrôler la survenue d'une maladie dans une population

✓ 17- La définition de la surveillance la plus admise est un processus de :

- a. Collecte des données socioéconomiques
- b. Traitement des données démographiques
- c. Analyse des données nutritionnelles
- d. Diffusion des données des épidémies
- ☒ e. Collecte, de compilation et d'analyse des données, ainsi que leur diffusion à l'ensemble de ceux qui ont besoin d'être informés.

18- La déclaration des cas de SIDA et des cas d'infection HIV ont été ajoutés à la liste des MDO en :

- a. 1975
- ☒ b. 1985
- ✓ ☒ c. 1990
- d. 1995
- e. 2000

ResiPharmaTM

19- Selon l'arrêté ministériel 133 de l'année 2013 fixant la liste des MDO qui se regroupent en :

- a. Catégorie des maladies à caractère endémique
- b. Catégorie des maladies à caractère pandémique
- ✓ ☒ c. Catégorie des maladies sous surveillance nationale
- ☒ d. Catégorie des maladies sous surveillance internationale
- e. Catégorie des maladies à potentiel épidémique

✓ 20- Le rôle du pharmacien dans la surveillance épidémiologique est :

- ☒ a. De surveiller uniquement les cas HIV / SIDA
- ☒ b. Non concerné par la déclaration
- ☒ c. Concerné uniquement par la déclaration des IST
- ☒ d. Le pharmacien est tenu de déclarer quel que soit le lieu de son exercice
- ☒ e. Le pharmacien est concerné par la notification des MDO, la pharmacovigilance et la matériovigilance

✓ 21- Les exemples d'automédication que l'on peut conseiller :

- ☒ a. Mal de tête : paracétamol, aspirine, AINS faiblement dosés type ibuprofène ou kétoprofène
- ☒ b. Rhume : antalgiques, désinfectants locaux et vasoconstricteurs faiblement dosés
- ☒ c. Traitement d'une plaie : anti-infectieux par voie parentérale
- ☒ d. Toux : dérivés de la codéine pour les toux sèches ou sirops expectorants pour les toux grasses
- e. Coup, entorse, traumatologie : injection de corticoïdes

22- L'automédication est la sélection et l'utilisation de médicaments par des individus pour traiter des maladies ou symptômes reconnus :

- a. Après avoir vu le médecin
- ☒ b. Après avoir vu au moins une fois le médecin — b Bonchuelle
- ☒ c. Après avoir consulté le pharmacien
- d. Après recours à des professionnels de la santé
- ☒ e. Sans recours nécessaire au médecin — e Sawane

- ✓ 8- Les principales causes de décès dans le monde, par ordre décroissant, sont :
- Maladies cardiovasculaires, cancer, diabète et les maladies respiratoires chroniques
 - Maladies cardiovasculaires, cancer, maladies respiratoires chroniques et le diabète
 - Maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires chroniques et le cancer
 - Maladies cardiovasculaires, diabète, cancer et les maladies respiratoires chroniques
 - Maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, diabète et le cancer

B

- ✓ 9- Les quatre (04) principaux facteurs de risque, actuellement, responsables de 80% des maladies chroniques sont :

- Tabac et/ou alcool
- Pollution atmosphérique
- Sédentarité
- Alimentation malsaine
- Surpoids/Obésité

ACE

- ✓ 10- Dans le cadre de la spécificité de l'association causale entre le cancer broncho-pulmonaire et le tabac on a :

- 1 fumeur sur 10 sera atteint d'un cancer broncho-pulmonaire
- 2 fumeurs sur 10 seront atteints d'un cancer broncho-pulmonaire
- 5 fumeurs sur 10 seront atteints d'un cancer broncho-pulmonaire
- 7 fumeurs sur 10 seront atteints d'un cancer broncho-pulmonaire
- 9 fumeurs sur 10 seront atteints d'un cancer broncho-pulmonaire

E

- ✓ 11- Le gradient biologique de l'effet s'évalue par :

- Un indicateur de santé
- Une mesure de risque
- Un critère statistique
- La dose d'exposition
- La durée d'exposition

Dose - effet

BE

- 12- La séquence temporelle est :

- Une caractéristique épidémiologique de temps
- Une caractéristique analytique
- Un critère de jugement d'une relation causale
- La maladie qui précède l'exposition
- La cause qui précède l'effet

CE

- 13- Doll et Hill ont étudié :

- L'incidence du cancer broncho-pulmonaire
- Les méfaits du tabac
- La relation entre le tabac et le cancer de la vessie
- La relation entre le tabac et le cancer broncho-pulmonaire
- La relation entre le tabac l'infarctus du myocarde

ResiPharmaTM

D

- ✓ 14- Une étude analytique de cohorte est :

- Une étude transversale
- Une étude longitudinale
- Une étude semi longitudinale
- Une étude directe
- Une étude inverse

BD

- ✓ 15- Une étude analytique transversale sur échantillons électifs par rapport à la maladie :

- Se comprend comme une véritable étude de cohorte
- Peut être considérée comme une étude semi longitudinale
- Est une étude mixte
- Se comprend comme une étude cas témoins

D

25 Questions à choix simples ou multiples (une ou plusieurs réponses justes).
Cochez la(les) réponse(s) juste(s) sur la feuille de réponse par une croix au niveau de la case correspondante.

1- La sensibilité est :

- a. La performance d'un test diagnostique face à un tableau clinique donné
- ☒ b. La capacité d'un test diagnostique de donner un résultat positif quand la maladie est présente (VP) B
- c. La probabilité qu'un sujet réagit incorrectement face à la présence de la maladie
- d. La probabilité qu'un sujet soit positif au test diagnostique sachant qu'il est réellement non malade
- e. La capacité d'un test diagnostique à réagir correctement face à l'absence de la maladie

2- La spécificité est :

- a. La capacité d'un test diagnostique à réagir correctement face à la présence de la maladie
- b. La probabilité qu'un sujet soit positif ou négatif au test diagnostique sachant qu'il est réellement malade
- ☒ c. La capacité d'un test diagnostique de donner un résultat positif quand la maladie est présente E
- d. La probabilité qu'un sujet soit négatif au test diagnostique sachant qu'il est réellement malade
- ☒ e. La capacité d'un test diagnostique de donner un résultat négatif quand la maladie est absente

3- Les études épidémiologiques à visée étiologique peuvent être : (Analytique)

- ☒ a. Transversales
- ☒ b. Longitudinales prospectives
- c. Transversales prospectives
- ☒ d. Longitudinales rétrospectives
- ☒ e. Cohorte ou cas témoins

ABDE

ResiPharmaTM

4- L'hygiène des mains est une :

- ☒ a. Mesure de d'asepsie
- ☒ b. Mesure de détergence — ?
- c. Mesure d'antisepsie
- d. Mesure de chimio prophylaxie
- ☒ e. Mesure barrière

ABE

5- La chaîne de transmission des infections nosocomiales est composée :

- ☒ a. Agent contaminant
- ☒ b. Le réservoir ou le support de cet agent
- c. L'hôte réceptif
- ☒ d. La porte de sortie
- ☒ e. La voie de transmission directe ou indirecte

ABDE

6- La contagiosité d'un agent pathogène est :

- ☒ a. Son aptitude à se propager dans la population
- b. Son aptitude à provoquer des troubles morbides
- c. Mesurée par le taux de sévérité
- d. Mesurée par le taux de létalité
- e. Aucune réponse n'est juste

A

7- Les maladies chroniques :

- ☒ a. Ne sont pas causées par un agent pathogène
- ☒ b. Ont une origine uni-factorielle Mul H
- ☒ c. N'ont pas une période de latence
- ☒ d. Ont une longue durée d'évolution

ADE