

Veillez cochez la ou les bonnes réponses :

1. Concernant les cestodoses larvaires *Hydatidose*

- 1/2
- a. Les vers adultes parasitent l'intestin de l'homme
 - ☒ b. L'œuf est la forme infestante du parasite
 - ☒ c. Les vers sont hermaphrodites
 - d. Le foie est la localisation de prédilection pour tous les vers
 - e. La voie transcutanée est le mode de transmission

✓ 2. Parmi les mesures prophylactiques contre le Teniasis à Teniasaginata, on peut citer :

- a. La lutte antivectorielle
- ☒ b. La consommation de viande de bœuf bien cuite ✓
- c. La consommation de crudités souillées
- d. La propreté des mains
- e. La vaccination

✓ 3. Le(s) prélèvement(s) le(s) plus approprié(s) pour le diagnostic de l'hydatidose est (sont) :

- Kyste*
- ☒ a. Les selles
 - ☒ b. Le sang
 - c. Les urines
 - d. Prélèvement cutané
 - e. Scotch test anal
- extrait, recherche d'AC*

4. Le diagnostic indirect est indispensable dans :

- 2/3
- ☒ a. La toxoplasmose
 - ☒ b. L'hydatidose
 - ☒ c. La cysticercose
 - d. L'hymenolepiose
 - e. La diphylobothriose

ResiPharmaTM

✓ 5. L'indication du sérodiagnostic devient nécessaire quand le parasite est en :

- 1/3
- ☒ a. Phase de migration larvaire
 - b. Phase de maturation (ponte)
 - ☒ c. Situation d'impasse
 - ☒ d. Place dans les lumières (intestin, bronches...)
 - e. Expulsion dans les excréta

✓ 6. Le sérodiagnostic présente de nombreux avantages parmi lesquels on peut citer :

- 1/3
- ☒ a. Le suivi sérologique de la maladie (cinétique des Anticorps)
 - b. Les réactions croisées entre parasites apparentés
 - ☒ c. Les enquêtes sérologiques à grande échelle
 - d. La réponse immunitaire non spécifique

☒ La haute sensibilité de certaines techniques.

7. Trypanosoma brucei ^{Africaine} caractérise par :

- a. Une distribution géographique en Amérique
- ☒ b. 02 sous espèces identiques morphologiquement
- ☒ c. 02 sous espèces identiques sur le plan épidémiologique
- ☒ d. Une morphologie différente de *Trypanosoma cruzi*
- e. Un réservoir humain exclusivement

8. Trypanosoma cruzi ^{Américain} :

- a. Est responsable de la maladie de sommeil
- ☒ b. Se transmet par les déjections des réduves
- ☒ c. Est responsable de la maladie de Chagas
- d. Se transmet par la pique de glossine
- e. Sévit en Afrique

9. Parmi les espèces causant le paludisme, la plus dangereuse est :

- a. *Plasmodium vivax*
- b. *Plasmodium knowlesi*
- ☒ c. *Plasmodium falciparum*
- d. *Plasmodium ovale*
- e. *Plasmodium malariae*

ResiPharmaTM

10. Aspergillus fumigatus :

- ☒ a. Est un champignon ubiquitaire
- ☒ b. Possède des toxines nécrosantes
- c. Est l'espèce la moins souvent impliquée en pathologie humaine
- ☒ d. Est thermo-tolérant
- e. Ne peut être responsable de manifestations allergiques

11. L'aspergillome :

- a. Nécessite un traitement médicamenteux uniquement
- ☒ b. Nécessite un traitement chirurgical
- ☒ c. Est responsable d'hémoptysie
- ☒ d. Est responsable d'une image en grelot caractéristique en radiologie pulmonaire
- e. Ne nécessite pas de cavité préformée pour son développement

12. Les mycétomes :

- a. Sont dues à des levures du genre *Cryptococcus*
- ☒ b. Peuvent être causés par des bactéries filamenteuses ^{actinomy}
- c. Sont dues à des Dermatophytes
- d. Sont des pseudo-tumeurs à levures ^{filament}
- e. Sont des mycoses du cuir chevelu

13. Le milieu diphase de Dobell et Laidlaw :

- ☒ a. Comprend un support de sérum de cheval
- b. Sert à cultiver certains helminthes
- c. Est indispensable pour le diagnostic des candidoses
- ☒ d. Sert à cultiver les amibes
- e. Comprend un support de sérum de lapin

✓ 14. La technique de l'auxanogramme permet le diagnostic d'espèce au cours de :

- a. L'amibiase
- b. La toxoplasmose
- ☒ c. L'onyxis à levures *candida levure*
- d. L'onyxis à dermatophytes *filamenteux*
- e. Paludisme

✓ 15. La microfaune de Brugiamalay :

- a. Possède une extrémité caudale recourbée en hameçon
- b. Possède une extrémité caudale effilée
- ☒ c. Possède un noyau sub-terminal et un noyau terminal
- d. Mesure 20 à 40 μ
- e. Est non gainée

✓ 16. La forme infestante des fascioloses est :

- a. La cercaire
- b. Le miracidium
- c. L'œuf embryonné
- ☒ d. La métacercare
- e. Le sporocyste

ResiPharmaTM

✓ 17. Dientamoebafragilis :

- ☒ a. Appartient à l'ordre des Trichomonadida
- b. Possède une membrane ondulante courte
- c. Est une amibe retrouvée au niveau du duodénum
- d. Possède un kyste mûr à 2 noyaux
- e. Possède un kyste mûr à 4 noyaux

✓ 18. Dans la Cryptosporidiose ; le diagnostic se fait par la recherche des oocystes dans

- a. Le LCR ; liquide céphalo-rachidien
- ☒ b. Les fèces
- c. Le sérum
- d. Les urines
- ☒ e. Le LBA : liquide broncho-alvéolaire

19. Le prélèvement d'un onyxis dermatophytique :

- a. Se fait par écouvillonnage des sérosités
- b. Se fait au niveau de la sertissure péri unguéale
- ☒ c. Utilise une paire de ciseaux
- d. Peut être effectué sans observance d'une fenêtre thérapeutique
- ☒ e. Nécessite l'utilisation d'un grattoir de Vidal

✓ 20. Les Bilharzioses sont des parasitoses causées par des vers :

- a. Plats hermaphrodites
- b. Ronds hermaphrodites
- c. Ronds à sexe séparés
- d. Plats à sexe séparés et à corps segmenté
- ☒ e. Plats à sexe séparés

Bon courage



Département de Pharmacie - Rattrapage de Parasitologie -
4ème année -

Date de l'épreuve : 04/09/2018

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 1,000000

N°	Rép.
1	BC
2	B
3	B
4	ABC
5	AC
6	AC
7	BD
8	BC
9	C
10	ABD
11	BCD
12	B
13	AD
14	C
15	C
16	D
17	A
18	BE
19	CE
20	E



Dr. Aiss Aou

