

1-Quelles affirmations concernant la *Cryptosporidiose*

- ☒ a- Parasitose opportuniste
- b- Toujours bénigne
- ☒ c- Très sévère chez les sujets immunodéprimés
- d- La transmission se fait par ingestion des kystes de *Cryptosporidium*
- e- La prophylaxie repose sur la consommation de la viande bien cuite

2-Concernant *Cystoisospora belli* :

- a- L'ocyste est sporulé à l'émission
- ☒ b- est une coccidie strictement humaine
- ☒ c- Peut provoquer une diarrhée chronique
- d- Sa transmission se fait par voie transcutané
- ☒ e- Le cycle évolutif est monoxène

3-Pour la sarcocystose intestinale: l'homme se contamine par :

- a- ingestion des ocystes sporulées
- b- Piqure d'insecte
- c- Consommation de la viande mal cuite contenant des ocystes
- ☒ d- Consommation de la viande mal cuite contenant un sarcocyste
- e- Inhalation des spores

4-L'oxyurose est:

- a- Une Parasitose due à un protozoaire : *Trichuris trichiura*
- b- Une zoonose
- ☒ c- Très contagieuse
- d- Traitée par le glucantime
- ☒ e- caractérisée par l'auto-infestation

5-La migration larvaire de l'*Ascaris lumbricoides* peut provoquer :

- a- Anémie ferriprive
- ☒ b- Syndrome de Löffler
- c- Prolapsus rectal
- d- Myocardite
- ☒ e- Hyper éosinophilie

6-Concernat la trichine choisissez la ou les réponses justes :

- a- est un nématode ovipare
- ☒ b- est un nématode larvipare
- c- Les œufs sont éliminés avec les selles
- d- Les larves sont éliminées avec les selles
- ☒ e- La transmission se par consommation de viande trichinée crue ou mal cuite

7-Concernant *Schistosoma mansoni* :

- a- Il est responsable de la bilharziose hépato-splénique
- b- seul l'homme en est réservoir
- ☒ c- il est responsable de la bilharziose intestinale
- ☒ d- le mollusque planorbe est hôte intermédiaire
- e- il existe en foyers dans la région d'Alger

8-Les schistosomes sont des vers :

- a- dont les femelles sont vivipares
- b- ronds
- c- plats à corps segmenté
- d- hermaphrodites
- ☒ e- vivant dans les vaisseaux sanguins de l'homme

ResiPharmaTM

Dr. S. AHRAOU
S.C.E.
parasitologie

03

14

9- Pour confirmer le diagnostic de l'amébose intestinale, la PCR est utilisée pour mettre en évidence dans les selles le ou les parasites suivant (s):

- a- *Plasmodium vivax*
- b- *Entamoeba dispar*
- c- *Leishmania tropica*
- d- *Toxoplasma gondii*
- ☒ e- *Entamoeba histolytica*

10- Dans la bilharziose :

- a- le miracidium se transforme en rédie
- b- l'hôte intermédiaire est un bovin
- ☒ c- une partie du cycle évolutif du parasite se passe dans l'eau
- d- le traitement est à base de Métronidazole en prise unique
- e- la contamination se fait par consommation de crudités

11- La dysenterie amibienne est caractérisée par :

- ☒ a- une douleur abdominale
- b- une fièvre en plateau
- c- une fièvre tierce
- d- une masse abdominale
- e- un ictère

12- Parasite(s) ne possédant pas de forme kystique :

- a- *Entamoeba coli*
- b- *Entamoeba hartmani*
- c- *Pseudolimax butchilli*
- ☒ d- *Trichomonas intestinalis*
- e- *Endolimax nana*

13- L'anguillulose :

- a- le parasite responsable est *Strongiloides stercoralis*
- b- la femelle de l'anguillule n'est retrouvée que dans le tube digestif de l'homme
- ☒ c- le parasite responsable provoque des manifestations digestives graves chez l'immunodéprimé
- d- est observée dans le Sud algérien
- e- est une maladie à transmission vectorielle

14- Quel est le stade clinique de la trypanosomose africaine caractérisé par des troubles neurologiques graves ?

- a- Stade hémolympatique
- ☒ b- Stade méningo-encéphalitique
- c- Stade cutané
- d- Stade cardiaque
- e- l'incubation

15- Parmi les mesures prophylactiques suivantes, quelle (s) est (sont) celle(s) qui concernent le paludisme :

- ☒ a- lutte biologique contre les larves des insectes vecteurs de maladie
- b- éradication des chiens de compagnie
- c- traitement de la famille vivant au contact du patient
- ☒ d- pulvérisation d'insecticides
- e- surveillance et contrôle des abattoirs

16- concernant l'accès palustre à *Plasmodium malarie* :

- a- peut s'aggraver en accès pernicieux
- ☒ b- correspond au cycle endo-érythrocytaire
- c- les accès de fièvre durent 48 heures
- ☒ d- la fièvre est due à la libération du pigment malarique après éclatement des hématies parasitées
- e- Peut entraîner des rechutes en raison de la présence d'hypnozoïtes

17- Le diagnostic d'un paludisme à *Plasmodium vivax* peut s'établir sur la présence de :

ResiPharmaTM

Dr. S. AMZAOU
SCC
parasitologie

- a-sporozoïtes dans les hépatocytes
- b-bradyzoïtes dans les érythrocytes
- ☒ c-schizontes dans les érythrocytes
- d-trophozoïtes dans les érythrocytes
- e-mérozoïtes dans les hépatocytes

18- A propos de l'infection par *Taenia saginata* :

- ☒ a- le parasite responsable est un helminthe hermaphrodite
- b- l'homme est l'hôte intermédiaire
- c- le parasite envahit les structures pulmonaires lors de sa migration larvaire
- d- l'infestation de l'homme se fait par consommation de la viande de bœufs crue ou mal cuite
- e- elle est caractérisée par des auto-infestations fréquentes

19- La forme parasitaire éliminée par l'homme au cours d'un taeniasis à *Taenia saginata* :

- a- La cercaire
- b- La larve
- c- Le kyste à 4 noyaux
- ☒ d- Annexes contenant des embryophores
- e- furcocercaire

20- Dans la diphylobothriose, la contamination de l'homme se fait par :

- a- Miracidiums
- b- Furcocercaires
- c- Sporocystes
- d- Récies
- ☒ e- larve plérocercoides

21- l'hyménolépirose :

- ☒ a- est due à un cestode
- b- se transmet par la consommation de la viande non cuite
- c- le diagnostic se fait par la recherche des œufs dans un prélèvement de selle
- d- le chien est le réservoir de parasites
- e- une des mesures prophylactique est le traitement de la famille vivant au contact du patient

22- Quel est l'agent pathogène responsable de la trypanosomose africaine ?

- a- *Trypanosoma cruzi*
- ☒ b- *Trypanosoma brucei gambiense*
- c- *Leishmania donovani*
- d- *Plasmodium falciparum*
- e- *Leishmania major*

23- Quel vecteur est responsable de la transmission de la trypanosomose africaine ?

- a- Moustique Anopheles
- ☒ b- Mouche tsé-tsé (*Glossina*)
- c- Punaise (*Triatoma*)
- d- Tique
- e- *Phlebotomus* sp

24- Quel est l'agent pathogène responsable de la trypanosomose américaine (maladie de Chagas) ?

- a- *Trypanosoma brucei*
- ☒ b- *Trypanosoma cruzi*
- c- *Leishmania major*
- d- *Plasmodium vivax*
- e- *Plasmodium falciparum*

25- Concernant les cestodes, les propositions justes sont

- ☒ a- les vers adultes parasitent l'intestin de vertébrés
- ☒ b- la contamination de l'homme se fait par voie orale
- c- sont des vers plats non segmentés hermaphrodites dépourvus de tube digestif
- ☒ d- sont endoparasites à tous les stades adulte et larvaire

ResiPharmaTM

Dr. S. AHBAOU
SCE
Parasitologie

☒ e- leur corps est formé d'un scolex, d'un cou et d'un strobile

26- *Fasciola hepatica*

☒ a- mesure 3 centimètres de long

☒ b- est responsable de distomatose hépatobiliaire chez l'homme

c- admet l'homme comme hôte intermédiaire accidentel

d- possède quatre ventouses

e- est un ver plat non segmenté pourvu de tube digestif complet

27- Les propositions justes à propos de l'hydatidose

☒ a- le parasite en cause est un plathelminthe cyclophyllide

☒ b- la parasitose est une zoonose

c- la PAIR est une chirurgie à visée diagnostique

d- l'hyperéosinophilie est absente

☒ e- la localisation larvaire hépatique est la plus fréquente

28- La métacercarie

☒ a- est la forme instable pour l'homme dans les distomatoses

b- est une formation sacculaire recouverte de cils

c- donne naissance à plusieurs rédies

d- est précédée d'une cercarie à queue fourchue

e- est retrouvée chez le premier hôte intermédiaire

29- Parmi les mesures prophylactiques de l'échinococcose kystique

a- la lutte antivectorielle

b- la consommation de poisson bien cuit

c- la consommation de viande de bœuf bien cuite

☒ d- la propreté des mains

e- la vaccination

30- Concernant les distomatoses hépatobiliaires

☒ a- les vers adultes se fixent à l'épithélium des voies biliaires

☒ b- *Dicrocoelium dentriticum* est une des espèces en cause de la parasitose

c- Le traitement est chirurgical

☒ d- ce sont des zoonoses

☒ e- le mode de contamination est la voie orale

31- Le (les) quel (s) parmi ces flagellés a (ont) un pouvoir pathogène certain :

☒ a. *Trichomonas vaginalis*.

b. *Trichomonas tenax*.

☒ c. *Giardia intestinalis*.

d. *Dientamoeba fragilis*.

e. *Chilomastix mesnili*.

32- La giardiose aiguë se traduit par :

a. Une diarrhée glairo-sanglante.

b. Epouintes et ténésmes.

c. Syndrome de malabsorption.

☒ d. Diarrhée aqueuse et épigastralgies.

e. Perte de poids.

33- Le diagnostic de la giardiose repose sur :

a. examens parasitologiques des selles de 3 jours successives.

b. La mise en évidence des kystes dans les selles liquides.

c. La recherche des anticorps dans le sérum.

☒ d. La recherche de copro-antigène par technique ELISA.

☒ e. La mise en évidence des trophozoïtes dans le liquide de tubage duodénale.

34- La *dientamoebiose* est une protozoose : Les

a. Extra-intestinale.

b. Due à une amibe.

ResiPharmaTM

Dr. S. AHSAOU
SCI.
Parasitologie

- c. Due à un parasite binucléé
- ☒ d. Transmise par un vecteur.
- e. Peut être associée à plusieurs signes digestifs.

35-Quelle (s) est (sont) la (les) forme (s) de leishmaniose (s) qui existe en Algérie ?

- a-La leishmaniose cutanéomucqueuse.
- ☒ b-La leishmaniose cutanée zoonotique.
- ☒ c-La leishmaniose cutanée du Nord.
- d-La leishmaniose cutanée diffuse.
- ☒ e-La leishmaniose cutanée chronique.

36-la transmission des leishmanioses :

- a-Est oro-fécale.
- b-Se fait par morsure de Tique.
- ☒ c-Se fait par piqure de phlébotome femelle.
- ☒ d-Et possible par transfusion sanguine.
- e-Est principalement transplacentaire.

37-La leishmaniose viscérale infantile :

- a-Est absente en Algérie.
- b-Est apyrétique.
- ☒ c-S'accompagne d'une splénomégalie.
- ☒ d-Est associée à des nodules cutanés.
- e-Se traite par la Chloroquine.

38-Les manifestations biologiques associés à la leishmaniose viscérale sont :

- ☒ a-l'anémie.
- b-La thrombocytopénie.
- c-l'hyperéosinophilie.
- ☒ d-La pancytopenie.
- ☒ e-de la vitesse de sédimentation (VS).

39-La MEAP

- ☒ a-est de début brutal
- ☒ b-est de pronostic sombre même sous traitement
- c-est due à *Balamuthia mandrillaris*
- d-l'amièbe responsable est à caractère opportuniste
- e-la contamination de l'homme se fait par voie cutanée

40-*Acanthamoeba sp*

- a-est un protozoaire amibo-flagellé
- ☒ b-peut être responsable de kératite chez l'immunocompétent
- ☒ c-entraîne une EAG chez l'immunodéprimé
- ☒ d-possède une forme kystique étollée
- e-est une amibe libre thermosensible

ResiPharmaTM

Dr. S. AHBAOU
SCE
Parasitologie