

1. Le glaucome à angle fermé

- ☒ a. Possède une indication chirurgicale
- b. Est dû à une hyperproduction de l'humeur aqueuse
- c. Est traité par des collyres sympathomimétiques
- d. Est souvent bilatéral
- e. Peut être traité par des atropiniques

2. Les ganglions de la chaîne paravertébrale

- a. Sont fortement sensibles aux atropiniques
- ☒ b. Partagent des récepteurs identiques avec la plaque motrice
- ☒ c. Participent à la régulation de la digestion
- ☒ d. Sont la cible initiale des ganglioplégiques
- ☒ e. Sont la cible initiale de la nicotine

3. Des doses faibles et identiques d'adrénaline et de noradrénaline

- ☒ a. Déclenchent un réflexe sympathique pour l'adrénaline seulement
- ☒ b. Ont la même affinité pour les récepteur α_1
- ☒ c. Ont des effets tachycardisants très différents.
- ☒ d. Aboutissent au même pic de pression artérielle
- ☒ e. Sont dépourvues d'effets vasodilatateurs

4. Le récepteur muscarinique M2

- ☒ a. Est de localisation vasculaire
- ☒ b. Est responsable d'hyperpolarisation
- ☒ c. Stimule l'adénylcyclase
- ☒ d. Est un récepteur couplé à la protéine Gq
- ☒ e. Est de localisation musculaire lisse

5. L'amnésie par benzodiazépines

- ☒ a. est dépendante de l'affinité au Récepteur GABA-B
- ☒ b. N'altère pas le souvenir de l'identité du sujet
- c. Est indépendante de leur mécanisme d'action
- d. Est indépendante de l'effet amnésiant du GABA
- e. Est généralement rétrograde

6. le principal effet indésirable des agents bloquants les récepteurs (α_1) post-synaptiques :

- ☒ a. Rétention urinaire.
- b. Douleurs angineuses.
- c. Œdèmes des extrémités.
- d. Céphalée.
- ☒ e. Hypotension orthostatique.

7. Prazosine (Minipress) :

- ☒ a. Est un β bloquants.
- b. Bloque les récepteurs α_2 pré synaptique centraux.
- c. Est indiqué dans le traitement de la dépression.
- ☒ d. Est un α_1 bloquants
- e. Est Utilisé dans le traitement de l'hypotension artérielle.

8. Les antidépresseurs tricycliques sont contre indiqué dans le cas suivant :

- a. Hypertrophie prostatique.
- b. La maladie de Parkinson.
- c. Pneumopathie.
- ☒ d. L'angine de poitrine.
- e. Une hypothyroïdie.

9. La fluoxétine (Prozac*) :

- ☒ a. Est un antidépresseur inhibiteur spécifique de la recapture de la sérotonine.
- b. Est un antiépileptique de 2ème génération.
- c. Est un anesthésique fluoré volatil.
- d. Est un inhibiteur spécifique de la recapture de la noradrénaline.
- e. Est un neuroleptique atypique

10. Parmi les médicaments antiépileptiques, lequel se transforme en partie dans l'organisme en phénobarbital ?

- a. La primidone (Mysoline*).
- b. Le clonazépam (Rivotril*).
- c. L'éthosuximide (Zarontin*).
- d. La phénytoïne (Dihydan*).
- ☒ e. La carbamazépine (Tégrétol*).

11. La Lamotrigine

- ☒ a. Est utilisé localement comme topique.
- ☒ b. Est utilisé uniquement en association avec un autre antiépileptique.
- c. Inhibe l'anhydrase carbonique.
- d. Est un vasodilatateur.
- e. Est un antiépileptique agissant par plusieurs mécanismes d'action.

12. La carbidopa :

- a. Peut traverser la BHE
- b. Possède un effet central
- c. Associée à la L-dopa, est prescrite au début de la maladie
- ☒ d. Diminue la transformation périphérique de la L-dopa
- e. Diminue la disponibilité cérébrale de la L-dopa

13. La Bromocriptine :

- a. Est active en cas de dégénérescence des neurones de la substance noire
- b. Se fixe sur les récepteurs dopaminergique pré synaptiques
- c. A une action brève
- d. Est utilisée que pour la maladie de parkinson
- e. Peut être associée avec la chlorpromazine

14. Le tramadol :

- a. Possède une forte affinité pour les récepteurs opioïdes
- b. Provoque une diarrhée
- c. Est plus puissant que la péthidine
- d. Existe que par voie orale
- e. Donne un métabolite plus puissant

15. La kétamine :

- a. Est un activateur de récepteur GABA a
- b. L'administration se fait par voie IV
- c. Est déconseillée pour les asthmatiques
- d. Est un anesthésique de maintien
- e. A une bonne qualité de réveil

16. La lidocaïne :

- a. Est un anesthésique de conduction à action rapide
- b. Possède une durée d'action longue
- c. Est hydrolysé par les pseudocholinestérase
- d. Est rapidement éliminée
- e. Provoque une neurotoxicité par infiltration

17. La plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent majorer dangereusement l'effet des anticoagulants oraux et des sulfamides hypoglycémiant. Cela s'explique par

- a. La défixation protéique par compétition.
- b. Compétition au niveau des cibles moléculaires de ces médicaments.
- c. La diminution de l'effet de premier passage hépatique.
- d. Une induction enzymatique
- e. Une inhibition enzymatique

18. Parmi les effets secondaires suivants de la chlorpromazine, quel est celui qui s'explique par son action anticholinergique?

- a. Hyperprolactinémie
- b. Effet antiémétique.
- c. Hypotension artérielle majorée à l'orthostatisme.
- d. Prise de poids.
- e. Sécheresse buccale

19. Un homme sous halopéridol, est admis aux urgences. Il a de la fièvre, des raideurs et des tremblements. Sa température est de 41°C et son taux sérique de créatine-kinase (CK) est élevé. De quoi s'agit-il ?

- a. Un syndrome malin des neuroleptiques.
- b. Une dyskinésie tardive.
- c. La maladie de Parkinson.
- d. Une overdose.
- e. Une allergie médicamenteuse.

20. Parmi les antipsychotiques suivants, lequel nécessite une formule numération sanguine (FNS) hebdomadaire ?

- a. Halopéridol.
- b. Olanzapine.
- c. Lévomépromazine
- d. Chlorpromazine.
- e. Clozapine.

21. Parmi les effets secondaires des corticoïdes:

- a. Hypertension intracrânienne bénigne avec visage lunaire et joues rouges.
- b. Syndrome de Raynaudse manifestant par un engourdissement ou des douleurs des extrémités.
- c. Syndrome de Reye survenant chez l'enfant de 6 mois à 15 ans.
- d. Hypotension orthostatique
- e. Accidents thromboemboliques

9 question(s) retiré

N°	Rép.
1	A
2	C
3	A
4	B
5	B
6	E
7	D
8	A
9	A
10	A
11	E
12	D
13	A
14	E
15	B
16	A
17	A
18	E
19	A
20	E
21	A
22	X
23	X
24	X
25	X
26	X

ResiPharmaTM