

16. Parmi les propriétés pharmacologiques des glycosides cardiotoniques

- ☒ a. une action chronotrope positive par un mécanisme nerveux et hémodynamique.
- ☐ b. une action dromotrope positive.
- ☐ c. une action bathmotrope négative en diminuant l'automatisme dans les oreillettes, les ventricules et le tissu de Purkinje.
- ☐ d. une action inotrope négative qui permet l'adaptation de la contraction du myocarde à l'effort.
- ☒ e. une action inotrope positive qui permet l'adaptation de la contraction du myocarde à l'effort.

17. Parmi les indications des glycosides cardiotoniques

- ☒ a. Troubles du rythme supra-ventriculaire.
- ☐ b. Tachycardie ventriculaire
- ☐ c. Insuffisance cardiaque par obstacle à l'éjection.
- ☐ d. Bloc auriculo-ventriculaire de haut degré non appareillé
- ☐ e. Syndrome de Wolff Parkinson White. ?

18. Le traitement de la crise d'asthme se fait par

- ☒ a. Le salmétérol par voie inhalée
- ☐ b. Le salbutamol par voie orale
- ☒ c. Les B2 adrénergiques à délai d'action long
- ☒ d. Les corticoïdes par voie inhalée
- ☒ e. La terbutaline par voie inhalée

19. Le traitement de fond de l'asthme se fait par

- ☐ a. Le salbutamol par voie sous cutanée
- ☐ b. Les B2 adrénergiques à délai d'action court
- ☒ c. La beclométhasone par voie inhalée
- ☐ d. Les B2 adrénergiques à durée d'action brève
- ☐ e. Les corticoïdes par voie orale

20. Les antitussifs antihistaminiques :

- ☒ a. De type chlorphénamine peut être utilisé en cas d'hypertrophie de la prostate
- ☒ b. Sont proposés pour le traitement symptomatique de la toux productive
- ☒ c. De type anticholinergiques sont indiqués chez le sujet âgé
- ☒ d. Est conseillé pour la toux sèche nocturne et allergique
- ☐ e. De type fenspiride associe un effet parasympatholytique

21. Le propranolol :

- ☒ a. Est indiqué chez l'asthmatique hypertendu
- ☒ b. Est cardio-sélectif
- ☒ c. Peut provoquer une vasoconstriction
- ☐ d. Peut être interrompu brusquement
- ☒ e. Ne provoque pas d'effets centraux

22. L'énalapril :

- ☒ a. Provoque un refroidissement des extrémités
- ☒ b. Provoque une vasodilatation rénale
- ☒ c. Provoque une toux sèche par diminution de bradykinine
- ☒ d. Provoque une tachycardie réflexe
- ☒ e. Est indiqué en cas d'HTA associée à une sténose bilatérale des artères rénales

23. La clonidine :

- ☒ a. Est un adrénolytique à action périphérique
- ☒ b. Est un faux médiateur
- ☒ c. Est un alpha 1 bloquant
- ☒ d. Possède un effet rebond
- ☒ e. Ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique

24. Les vasodilatateurs directs à tropisme mixte

- ☒ a. Agissent en se transformant en NO
- ☒ b. Agissent par activation des canaux potassiques
- ☒ c. Sont contre indiqués dans HTA réfractaire
- ☒ d. Considérés comme un traitement de 1ère intention de l'HTA
- ☒ e. Sont proposés pour le traitement de fond de l'HTA

25. Le cyclophosphamide est :

- ☒ a. Est un cytotoxique anti métabolique
- ☒ b. Provoque une toxicité vésicale par l'acroléine
- ☒ c. Un cytotoxique actif sur la phase M du cycle cellulaire
- ☒ d. Actif par l'acroléine
- ☒ e. Actif après métabolisation enzymatique du 4-hydroxycyclophosphamide

26. La doxorubicine :

- ☐ a. Est un inhibiteur de thymidylate synthétase
- ☒ b. Est cardiotoxique
- ☐ c. Est un agent alkylant
- ☐ d. Agit sur la phase S du cycle cellulaire
- ☐ e. Provoque des coupures transitoires d'un seuil de brin d'ADN

ResiPharmaTM



1. Quel effet de l'histamine n'est pas bloqué par les antihistaminiques H_1 :

- a. La sécrétion gastrique
- b. La capillarodilatation
- c. La contraction nasale.
- d. La broncho-constriction
- e. La Vasodilatation

2. Les antihistaminiques H_1 de 1ère génération:

- a. Ne traversent pas la BHE.
- b. Possèdent des effets anticholinergiques.
- c. Sont appropriés pour l'usage diurne.
- d. Ne sont pas sédatifs.
- e. Toutes les réponses sont fausses.

3. Les inhibiteurs de la pompe à protons H^+ au niveau de l'estomac :

- a. Inhibent de façon réversible la pompe.
- b. Leur durée d'action est entre 18 et 24h.
- c. Plusieurs prises journalières sont nécessaires.
- d. Agissent localement au contact de la muqueuse gastrique.
- e. Augmentent la sécrétion du mucus protecteur de la muqueuse gastrique

4. Quel médicament est un antagoniste des récepteurs H_2 :

- a. Oméprazole.
- b. Pirenzépine.
- c. Misoprostol
- d. Ranitidine.
- e. Sucralfate

5. Hypertendue sous Hydrochlorothiazide. lequel de ces ions ne serait pas augmenté dans l'urine ?

- a. K^+ .
- b. Cl^- .
- c. Ca^{2+} .
- d. Na^+ .
- e. Mg^{2+}

6. le diurétique non contre-indiqué dans l'insuffisance rénale ;

- a. Spironolactone.
- b. Diurétique thiazidique
- c. Furosémide
- d. Diurétique épargneur potassique.
- e. Association de diurétique thiazidique et épargneur potassique.

7. Le sildénafil VIAGRA

- a. Augmente la production de NO
- b. Est antagoniste des dérivés nitrés
- c. Peut-être indiqué dans l'HTA
- d. Agit par inhibition enzymatique
- e. Est le seul représentant de sa classe

8. Médicament sans intérêt dans la prévention de la crise d'angor

- a. Amiodarone
- b. Trinitrine (sublinguale)
- c. Simvastatine (hypolipémiant)
- d. Nebivolol
- e. Diltiazem (forme LP)

9. Réduction la période réfractaire avec :

- a. Verapamil
- b. cibenzoline
- c. Amiodarone
- d. Lidocaïne
- e. Hydroquinidine

10. Un foyer ectopique dans les arythmies :

- a. Un est trouble de la conduction
- b. Ne perturbe pas l'ECG
- c. Peut être bradychardisant
- d. Peut être hors du tissu nodal
- e. Est un circuit de réentrée

11. La mifépristone est :

- a. Un progestatif
- b. Un oestrogénique.
- c. Un moyen de rattrapage.
- d. Utilisée dans l'IVG
- e. Un contraceptif de première ligne

12. un progestatif n'est pas administré par :

- a. voie intramusculaire
- b. voie sublinguale
- c. transdermique
- d. D.I.U
- e. Orale

13. L'Aprépitant peut être associé à :

- a. Granistétron
- b. Scopalamine
- c. Meclozine
- d. Dompéridone
- e. Sirop d'IPECA

14. Médicament non spasmolytique

- a. Mébévérine
- b. Diosmectite
- c. Phloroglucinol
- d. Trimibutine
- e. Pinaverium

15. Les laxatifs de lest

- a. Sont purgatifs
- b. Lubrifient le tractus digestifs
- c. S'hydratent fortement
- d. Sont des aliments
- e. Ont une action osmotique



Un
Fac



Dép
pha

Départ
pharma

Dé
ph

Date de l'épreuve : 22/05/20

Date de l'épreuve : 22/05/2016

Date de l'épreuve : 22/05/

Date de l'épreuve : 2

4 questio

4 question(s) re

4 ques

4 q

N°	Rép.
1	C
2	B
3	B
4	D
5	C
6	C
7	D
8	D
9	D
10	D
11	D
12	B
13	A
14	B
15	C
16	E
17	A
18	E
19	A
20	C
21	D
22	E
23	A
24	D
25	D
26	A
27	X
28	X
29	X
30	X

N°	Rép.
1	A
2	B
3	B
4	D
5	C
6	C
7	D
8	B
9	D
10	D
11	D
12	B
13	A
14	B
15	C
16	E
17	A
18	E
19	C
20	D
21	C
22	B
23	D
24	A
25	B
26	B
27	X
28	X
29	X
30	X

N°	Rép.
1	A
2	B
3	B
4	D
5	C
6	C
7	D
8	B
9	D
10	D
11	D
12	B
13	A
14	B
15	C
16	E
17	A
18	E
19	C
20	D
21	C
22	B
23	D
24	A
25	B
26	B
27	X
28	X
29	X
30	X

N°	Rép.
1	D
2	B
3	B
4	D
5	C
6	C
7	D
8	E
9	D
10	D
11	D
12	B
13	A
14	B
15	C
16	E
17	A
18	A
19	C
20	A
21	B
22	D
23	D
24	C
25	A
26	D
27	X
28	X
29	X
30	X