

L'examen de deuxième année pharmacie

Module de physiopathologie

1/Hypoxie et hypercapnie sont des perturbations :

- ☒ a- Gaz du sang
- ☐ b- Gaz alvéolaire.
- ☐ c- Gaz de l'air ambiant
- ☐ d- De l'hématose
- ☐ e- De l'hémostase

2/L'hypoxie par stase :

- ☐ a- Pao₂, Sao₂, Cao₂ normales
- ☐ b- Pao₂ augmentée, Sao₂, Cao₂ normales
- ☐ c- Pao₂ diminuée, Sao₂, Cao₂ normales
- ☐ d- Pao₂, diminuée, Sao₂ diminuée, Cao₂ normales
- ☐ e- Pao₂, Sao₂, Cao₂ diminuées

3/Troubles de la diffusion :

- ☐ a- Le volume de diffusion d'un gaz à travers une membrane est inversement proportionnel à l'épaisseur de cette membrane.
- ☐ b- Due à un épaississement de la MAC
- ☒ c- Due à une fibrose interstitielle
- ☐ d- Cause d'hypoxémie
- ☒ e- Responsable d'une hypoventilation alvéolaire.

4/Hypercapnie :

- ☐ a- Accompagne toujours une hypoxie.
- ☒ b- Toujours isolée.
- ☐ c- S'associe à une hyperoxie.
- ☐ d- Due à une hyperventilation alvéolaire.
- ☐ e- Due à une hypoventilation alvéolaire.

5/Hypoxie / hypercapnie :

- ☐ a- Parfaitement toléré par l'organisme.
- ☐ b- Ont des effets délétères sur le cœur.
- ☐ c- Ont des effets délétères sur le cerveau.

- ☒ b- Une augmentation de la PAS > 180 mmHg et PAD > 110 avec souffrance d'organe.
- c- PAS > 180 mmHg et PAD > 110 mmHg sans souffrance d'organe.
- d- PAS > 140 mmHg et PAD > 90 mmHg.
- e- Un œdème aigu pulmonaire cardiogénique.

12/ L'encéphalopathie hypertensive est considérée comme :

- a- Poussée hypertensive.
- b- Une souffrance cérébrale secondaire à l'augmentation de la tension artérielle.
- c- C'est un accident vasculaire ischémique sur spasme artérielle.
- ☒ d- Se manifeste par un déficit moteur constant et systématisé.
- e- Se manifeste par un déficit moteur inconstant et non systématisé.

13/ La douleur thoracique est une urgence diagnostique et thérapeutique dont les difficultés résident dans :

- a- Le grand nombre de causes responsables.
- b- Les présentations cliniques hétérogènes.
- c- La diversité des examens complémentaires ou il faut choisir le(s) plus contributifs.
- ☒ d- La situation de stress particulier pour le patient et le praticien.
- e- La lourdeur des moyens thérapeutiques systématiquement utilisés.

14/ Le rôle du pharmacien dans la prise en charge de la douleur thoracique est de :

- a- Diagnostiquer une douleur thoracique aiguë.
- b- Identifier les situations d'urgence et reconnaître les signes de gravité.
- ☒ c- Planifier leur prise en charge à l'hôpital.
- d- Mesurer la tension artérielle, Administrer un antalgique ou dérivé nitré et appeler les services de secours.
- e- Demander et interpréter les examens complémentaires appropriés.

15/ L'accident vasculaire cérébral hémorragique :

- ☒ a- Est une pathologie du système nerveux central
- ☒ b- Est une pathologie du système nerveux périphérique
- c- Est une pathologie causée par une démyélinisation centrale
- d- Est une pathologie de la jonction neuro-musculaire
- e- Est une pathologie du muscle strié périphérique

16/ La thrombose veineuse cérébrale est une agression cérébrale qui peut être favorisée :

- a- Par la prise d'œstro-progestatifs
- b- Chez la femme en post-partum par l'existence d'un état d'hypercoagulabilité
- c- Par une immobilisation prolongée
- ☒ d- Par la prise d'aspirine

☒ c- Par la prise de médicaments anticoagulants

17/La maladie myasthénique :

☒ a- Est une affection touchant le système nerveux centrale

b- Est une pathologie de la jonction neuro-musculaire

c- Est une pathologie causée par la production d'anticorps anti récepteurs à acétylcholine.

d- Est une pathologie qui peut être causée par l'injection de curares

e- Est une maladie qui a comme principe thérapeutique l'inhibition de la choline estérase

18/La polyradiculonévrite :

a- Est une pathologie du système nerveux central

☒ b- Est une pathologie du système nerveux périphérique

c- Est une pathologie causée par une démyélinisation des troncs nerveux périphériques

d- Est une pathologie causée par une démyélinisation au niveau du système nerveux central

e- Est une pathologie qui nécessite une prise en charge chirurgicale.

19/L'effet shunt intra pulmonaire :

a-C 'est une ventilation insuffisante voir absente par rapport à la perfusion.

b-C' est une perfusion insuffisante voir absente par rapport à la ventilation

☒ c- Le rapport $V/P < 1$ ou nulle.

d-Il est secondaire à une atélectasie .

e-Il est secondaire à une embolie pulmonaire.

20/La polypnée se caractérise par :

a- Une augmentation du volume et de la fréquence respiratoire.

b- Une augmentation du volume avec diminution de la fréquence respiratoire.

c- Une respiration rapide et superficielle.

d- l'absence de mouvements respiratoires plus de 20 second.

☒ e- une diminution de la fréquence respiratoire et de l'ampliation thoracique.

Département de Pharmacie - EMD1 de chimie minérale -
2ème année

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0,800000

UNIVERSITE SALAH BOUENIDER - Constantine 3
Faculté de médecine de ConstantineDépartement de Pharmacie - EMD1 de physiopathologie -
2ème année


Date de l'épreuve : 06/02/2022

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 1,000000

N°	Rép.
1	AD
2	A
3	ABCDE
4	AE
5	BCDE
6	A
7	ABD
8	BD
9	C
10	AC
11	B
12	BE
13	ABCD
14	ABD
15	A
16	ABC
17	BCE
18	BC
19	ACD
20	A

Dr. FELOUAT Fadila
Anesthésie - Réanimation
N° d'Ordre: 8781

J'aime



Commenter