

CORRIGE TYPE Module de Physiopathologie - 1ère EMD
30 avril 2017

1) L'insuffisance rénale aigue (IRA) est définie :

- A. Baisse brutale de la filtration glomérulaire (diminution du DFG)
- D. Peut survenir sur un rein sain ou sur un rein déjà atteint (Décompensation d'une IRC)

2) L'insuffisance Rénale Aigue organique :

- A. Est la forme la plus grave
- B. La nécrose tubulaire est la forme la plus fréquente
- C. L'ischémie rénale est due à une augmentation du flux sanguin rénal

3) Les conséquences de l'insuffisance rénale aigues sont :

- A. Retention Azotée : Elevation de la créatinine, urée et de l'acide urique
- E. Retention hydro sodée (oedème pulmonaire et HTA maligne)

ResiPharmaTM

4) Les oedèmes :

- A. Accumulation de liquide dans l'espace interstitiel des tissus et des organes
- C. Prédominant dans les tissus sous cutanées des parties déclives
- D. Apparaît lorsque les capacités de résorption veino-lymphatique sont dépassées

5) En cas d'hyper osmolarité vasculaire, il se produit :

- A. Un appel d'eau du milieu intra cellulaire vers le milieu extracellulaire
- C. Une déshydratation intracellulaire

6) Les échanges hydriques entre le milieu extracellulaire et intra cellulaire se font :

- A. Par des phénomènes d'osmose
- D. par diffusion d'eau du milieu le moins concentré (hypotonique) vers le plus concentré (hypertonique)

Dr L. SEHADJI
Médecin Assistant en
Néphrologie, Hôpital de la
Santé, Alger



1 / 1 photos

5) En cas d'hyperosmolarité vasculaire, il se produit :

- A. un appel d'eau du milieu intra cellulaire vers le milieu extracellulaire
- C. Une déshydratation intracellulaire

6) Les échanges hydriques entre le milieu extracellulaire et intra cellulaire se font :

- A. Par des phénomènes d'osmose
- D. par diffusion d'eau : du milieu le moins concentré (hypotonique) vers le plus concentré (hypertonique)

Dr. L. SENHADJI
BIOLOGIE ANIMALE
UNIVERSITÉ ALGER 1

7) L'état de choc est défini comme :

- A. une insuffisance circulatoire aigue entraînant une hypoxie tissulaire
- E. une hypotension artérielle avec hypo perfusion tissulaire

8) Dans le choc cardiogénique, le mécanisme initiateur est :

- B. une défaillance de la pompe cardiaque

ResiPharmaTM

9) Lors d'un état de choc, la compensation par le système sympathique se manifeste par :

- B. une tachycardie et une vasoconstriction périphérique
- E. une redistribution des débits régionaux au profit des organes nobles

10) Cochez la réponse juste : le calcul du débit cardiaque correspond :

- C. volume d'éjection systolique x fréquence cardiaque

11) A propos de l'HTA : Cochez la ou le(s) réponse(s) juste(s) :

- A. Lorsqu'elle est secondaire, cela veut dire qu'il y a une cause retrouvée à l'HTA
- C. L'HTA essentielle expose à un risque de survenue d'événements cardio-vasculaires des facteurs important à considérer dans le suivi des patients hypertendus
- D. La lutte contre la sédentarité, l'obésité et le tabac constituent de consommer en grandes quantités des produits riches en sel

12) En cas d'insuffisance cardiaque : Cochez la ou les réponse(s) juste(s) :

- C. le système sympathique est mis en jeu intensément
- D. les cavités cardiaques se modifient et se dilatent
- E. la fraction d'éjection systolique baisse

Dr. L. SENHADJI

12) En cas d'insuffisance cardiaque : 1 / 1 photos (juste(x)) :

- C. le système sympathique est très en jeu intensément
- D. les cavités cardiaques se modifient et se dilatent
- E. la fraction d'éjection systolique baisse

Dr. L. SENHADJI

13) L'ictère peut s'accompagner de:

- A. prurit
- B. vomissements
- E. coloration foncée des urines

14) L'ictère apparaît quand le taux de bilirubine totale est :

- B. supérieur à 30 mg/L

ResiPharmaTM

15 la production quotidienne de bilirubine est de l'ordre de :

- C. 250 à 350 mg/L

16) Dans la maladie asthmatique la dyspnée est de type

- B. Expiratoire
- E. Débit expiratoire de pointe est diminué

17) L'asthme est caractérisé par :

- A. Trouble respiratoire obstructif
- E. Une hyper réactivité bronchique

18) lors de l'hyperthermie

- B. l'analyse de la courbe de température permet d'orienter le diagnostic
- C. l'hyperthermie s'accompagne de pertes hydriques
- D. la thermolyse permet de rétablir la température corporelle

Dr. L. SENHADJI
Mars 2017

processus d'inflammation la phase cellulaire est caractérisée par :

notamment leucocytaire

une infection la période d'incubation correspond à :

allant du moment de pénétration du germe à l'apparition des signes cliniques

Dr. L. BENHADJ
Assesseur
M. L. BENHADJ

