

## Examen N°2

### 1- Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)

- ☒ (A) Tous les tissus de l'organisme sont susceptibles de subir une cancérisation.
- ☐ B. Carcinome est une tumeur bénigne.
- ☐ C. Le carcinome se développe au dépend du tissu conjonctif.
- ☒ (D) La métastase est provoquée par le détachement des cellules de la tumeur d'origine.

### 2- Le traitement des cancers fait appel.

- ☒ (A) Radiothérapie.
- ☒ (B) Chimiothérapie.
- ☒ (C) Hormonothérapie.
- ☐ D. A.R.J.

### 3- L'HTA se définit par :

- ☒ (A) Une pression artérielle systolique  $\geq 140$ mm/ hg et une pression artérielle diastolique  $\geq 90$ mm/hg.
- ☐ B. Une pression artérielle systolique  $\geq 150$ mm/ hg et une pression artérielle diastolique  $\geq 100$ mm/hg.
- ☐ C. Une pression artérielle systolique  $\geq 160$ mm/ hg et une pression artérielle diastolique  $< 90$ mm/hg.
- ☐ D. A.R.J.

### 4- Les étiologies de l'HTA secondaire

- ☒ (A) Maladies endocriniennes.
- ☒ (B) Un rétrécissement de l'aorte.
- ☒ (C) Maladie rénale.
- ☒ (D) Tumeur adjacente de l'aorte. (compression de l'aorte par des tumeurs)

5- La physiopathologie du reflux gastroœsophagien.

- ☐ A. Une haute pression au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage.
- ☐ B. Une haute pression au niveau du sphincter inférieur de l'estomac.
- ☐ C. Une faible pression au niveau du sphincter inférieur de l'estomac.
- ☒ D. Une faible pression au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage.

6- Le traitement de l'ulcère gastrique fait appel à :

- ☒ A. Une trithérapie.
- ☐ B. Une bithérapie.
- ☐ C. Au traitement chirurgical en 1<sup>ère</sup> intention.
- ☒ D. Au traitement médical en 1<sup>ère</sup> intention.

7- Au cours de l'état de choc la redistribution vasculaire se fait au profit des organes suivants :

- ☐ A. Le foie
- ☒ B. Le cerveau
- ☐ C. Le rein
- ☒ D. Le cœur

8- La drogue vasoactive de choix dans le traitement de l'état de choc cardiogénique est :

- ☐ A. La dopamine
- ☒ B. La noradrénaline
- ☐ C. La dobutamine
- ☐ D. L'isuprenaline

9- Au cours de l'infarctus du myocarde, la nécrose cellulaire se traduit électriquement par :

- ☐ A. L'apparition de l'onde de pardée
- ☒ B. L'ascension du segment ST
- ☒ C. L'apparition de l'onde Q
- ☐ D. L'allongement de l'espace PR

10- La première enzyme cardiaque à être libérée dans la circulation sanguine au cours d'un IDM est :

- ☒ A. CPK
- ☐ B. Troponine
- ☐ C. LDH
- ☐ D. Phosphatase alcaline



11- La bronchite chronique peut entraîner :

- A. Une insuffisance respiratoire restrictive
- ☒ B. Une insuffisance respiratoire obstructive
- C. Une acidose respiratoire
- D. Un effet espace mort

12- La capacité pulmonaire totale est :

- ☒ A. La somme du volume résiduel et de la capacité vitale
- B. Egale au volume courant
- ☒ C. Variable selon l'âge
- D. Egale à la capacité résiduelle fonctionnelle

13- L'athérosclérose est définie par l'OMS comme :

- A. L'association variable de remaniements de l'intima et la média.
- ☒ B. L'association variable de remaniements de l'intima.
- C. L'association variable de remaniements de l'adventice.
- D. L'association variable de remaniements des trois couches

14- Choisir la ou les réponses justes :

- ☒ A. La plaque athéromateuse simple est le résultat de phénomènes inflammatoires locaux responsables de l'athérome.
- ☒ B. L'athérosclérose se développe particulièrement au niveau des zones de force mécanique.
- ☒ C. La médiacalcosse : surcharge calcique au niveau de la média
- ☒ D. La prévention primaire de l'athérosclérose repose sur Les modifications du mode de vie.

15- Cochez la ou les réponses justes :

- A. L'asthme est défini comme une dyspnée sifflante, paroxystique, irréversible spontanément.
- ☒ B. Plus de la moitié des asthmes ont une origine allergique.
- C. Prick test : Test par injection intradermique d'une dose importante des allergènes.
- D. Aucune de ces réponses n'est juste.

16- Choisir la ou les réponses fausses :

- A. L'allergie survient sur un terrain génétiquement prédisposé.
- ☒ B. IgE spécifiques sont positifs si l'allergie est localisée.
- ☒ C. La phase de sensibilisation : c'est la phase de reconnaissance de l'allergène par l'organisme
- D. La réaction allergique c'est une phase de réaction contre l'allergène.

17- L'OAP se caractérise cliniquement par la présence :

- A. Dyspnée++râles sibilants
- B. Dyspnée + hémoptysie.
- ☒ C. Dyspnée + râles crépitants.
- D. Aucune de ces réponses est juste

18- Dans l'OAP on trouve :

- A. Une hypoxie+ hypercapnie + alcalose métabolique.
- B. Une hypoxie +alcalose respiratoire + alcalose métabolique
- ☒ C. Une hypoxie + hypercapnie + acidose métabolique.
- D. Aucune de ces réponses est juste

19- Choisir la ou les réponses justes :

- ☒ A. IRAF : diminution de la filtration glomérulaire par diminution de la pression artérielle : hémorragie, etc....
- ☒ B. Signes de rétention hydro-sodée :HTA +œdèmes.
- C. On parle d'une anurie quand la diurèse est inférieure à 500cc/24h
- D. Épuration rénale(Hémodialyse) est contre indiquée en cas d'IRA.

20- Dans l'IRA on trouve :

- A. Hypercréatininémie, hypoazotémie ++, hyperuricémie ++
- ☒ B. Hypercréatininémie, hyperazotémie ++, hyperuricémie ++
- C. Hypercréatininémie, hyperazotémie ++, hypouricémie ++
- D. Aucune de ces réponses n'est juste.

$$1 + 0,5 + 0,5 + 1 + 1 + 1 + 0,66 + 1 + 1 + 1$$
$$0,33 + 1 + 1 + 0,66 + 1 + 1$$
$$13,65$$



# EXAMEN DE 2EME ANNEE DE PHARMACIE /PHYSIO-PATHOLOGIE EMD2 2015-2016

Date de l'épreuve : 30/05/2016

Corrigé Type

| N° | Rép. |
|----|------|
| 1  | AD   |
| 2  | ABC  |
| 3  | A    |
| 4  | ABCD |
| 5  | D    |
| 6  | AD   |
| 7  | BD   |
| 8  | C    |
| 9  | C    |
| 10 | B    |
| 11 | BC   |
| 12 | AC   |
| 13 | B    |
| 14 | CD   |
| 15 | AB   |
| 16 | B    |
| 17 | C    |
| 18 | C    |
| 19 | AB   |
| 20 | B    |
| 21 | X    |
| 22 | X    |
| 23 | X    |
| 24 | X    |
| 25 | X    |
| 26 | X    |
| 27 | X    |
| 28 | X    |
| 29 | X    |
| 30 | X    |
| 31 | X    |
| 32 | X    |
| 33 | X    |
| 34 | X    |
| 35 | X    |

| N° | Rép. |
|----|------|
| 36 | X    |
| 37 | X    |
| 38 | X    |
| 39 | X    |
| 40 | X    |

