

2^{ème} contrôle de sémiologie de Pharmacie Durée : 50 min

2

1/ Concernant l'hématémèse toutes les assertions suivantes sont justes sauf une laquelle ?

- A. C'est un rejet par la bouche, au cours d'efforts de vomissement, de sang rouge
- B. Elle peut être d'origine broncho pulmonaire
- C. Elle peut être confondue avec des épistaxis dégluties
- D. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital
- E. Une endoscopie digestive haute est l'examen complémentaire de première intention.

3

2/ Toutes les pathologies suivantes peuvent être responsables de rectorragies sauf une laquelle ?

- A. Hémorroïdes
- B. Cancer du rectum
- C. Œsophagites
- D. Rectites infectieuses
- E. Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

3/ Les nouveaux critères diagnostic du diabète sucré sont :

- A. Glycémie à jeun : $> 1,16$ g/l
- B. Glycémie casuelle ≥ 2 g/l
- C. Glycémie à jeun : $> 1,26$ g/l
- D. Glycémie postprandiale $> 1,60$ g/l
- E. Une glycosurie positive

ResiPharmaTM

4/ La pathogénie du diabète type 1 se traduit par la positivité des marqueurs suivants :

- A. Les anticorps ICA,
- B. Les anticorps anti-nucléaires
- C. Les anticorps anti GAD,
- D. HLA B5
- E. Les anticorps anti IA-2

5/ Au cours du diabète de type 2, l'hyperglycémie est en rapport avec :

- A. Une insulino-résistance
- B. Une hypersécrétion de catécholamines
- C. Une hyperglucagonémie
- D. Une augmentation de la glycogénolyse musculaire
- E. Une augmentation de la production hépatique du glucose

6/ Le déficit en incrétines chez le diabétique de type 2 se traduit par :

- A. Un déficit en GLP1
- B. Un déficit en DPP4
- C. Un déficit en pepsine
- D. Une réduction de la sécrétion d'insuline
- E. Une hyperglucagonémie

7/ Les insulines analogues ont les particularités suivantes :

- A. Insulines humaines purifiées
- B. Insulines monomères
- C. Peuvent être administrée à un diabétique de type 2
- D. Après injection elles présentent un pic d'action
- E. Utilisées en forme : rapide, prémix et lente.

- 8 / Une hématurie peut être confondue avec
- ☒ A - l'utilisation excessive d'ampicilline
 - ☒ B - la consommation de betteraves
 - ☒ C - la présence de porphyrie dans les urines
 - ☒ D - la prise de vitamine B12
 - ☒ E - une myoglobinurie

9 / Une protéinurie $>2\text{g}/24\text{h}$ est en faveur de :

- A- d'une tubulopathie aiguë
- B - d'un adénome de prostate
- C - d'une lithiase vésiculaire
- ☒ D - d'un syndrome glomérulaire
- E- d'une cystite.

ResiPharmaTM

10 / Les étiologies suivantes sont à l'origine d'une hématurie sauf une :

- A - tuberculose rénale
- B- anti coagulation orale
- ☒ C- infarctus splénique
- D- nécrose papillaire
- E- exercice physique soutenu

11/ Une hématurie associée à des caillots de sang peut se voir au cours de :

- ☒ A- atteinte glomérulaire
- ☒ B- lithiases urinaires
- ☒ C- prostatite
- D- glomérulonéphrite infectieuse
- E- syndrome néphrotique

12 / L'épreuve des 3 verres est :

- ☒ A- un examen d'orientation
- ☒ B- un examen nécessitant des précautions
- C- pose le diagnostic étiologique avec précision
- ☒ D- évalue la quantité de sang émise dans les urines
- E- permet d'exclure une hématurie

13/ Concernant la contraception quelles sont les propositions justes :

- ☒ A. Permet d'éviter la conception
- ☒ B. Augmente la probabilité de conception
- ☒ C. Ne comporte que des agents hormonaux
- ☒ D. Diminue la probabilité de conception
- ☒ E. Son action est locale ou générale

14/ Quel est le mode d'action des microprogestatifs:

- A. Inhibition de la sécrétion des gonadotrophines LH, FSH
- ☒ B. Effet sur l'endomètre qui devient peu apte à la nidation.
- ☒ C. Effet sur la glaire cervicale qui devient imperméable.
- D. Stimulation de la sécrétion des gonadotrophines FSH, LH
- E. Inhibition de l'ovulation.

15/ Parmi les contre-indications absolues de la contraception hormonale (estroprogestatifs), les propositions suivantes sont justes sauf une :

- ☐ A. Diabète compliqué.
- ☐ B. Accident vasculaire cérébrale.
- ☐ C. Tumeurs malignes du sein.
- ☐ D. Valvulopathies.
- ☒ E. Hypertension artérielle contrôlée.

16/ Lors de la délivrance de la contraception orale, le pharmacien doit :

- ☒ A. S'assurer de la bonne compréhension de la patiente
- ☐ B. Expliquer le respect de l'intervalle sans hormone
- ☐ C. Rappeler la nécessité de la prise quotidienne
- ☒ D. Ouvrir la boîte et montrer la plaquette.
- ☒ E. Détecter les effets indésirables.

ResiPharma TM

17/ Les dysménorrhées se définissent comme étant :

- ☒ A. Des douleurs de siège pelvien.
- ☒ B. Des douleurs du début du cycle menstruel.
- ☐ C. Des hémorragies génitales.
- ☐ D. Des douleurs lors de l'ovulation.
- ☐ E. Des douleurs lors de la ménopause

18/ A correspond le statut pondéral est défini par l'indice de masse corporelle(IMC) :

- ☒ A. Au rapport du poids sur le carré de la taille.
- ☐ B. Au rapport de la taille sur le carré du poids
- ☐ C. Au rapport du poids sur la taille.
- ☐ D. Au rapport de la taille sur le poids
- ☐ E. Aucune de ces réponses

19/ Le surpoids se définit comme un indice de masse corporelle (IMC):

- ☐ A. supérieur à 30 kg/m²
- ☐ B. supérieur à 35 kg/m²
- ☒ C. supérieur à 25 kg/m² et inférieur à 30 kg/m²
- ☐ D. inférieur à 40 kg/m²
- ☐ E. inférieur à 30 kg/m²

20/ La pression artérielle normale est :

- ☒ A. Inférieure à 140-90 mm Hg lorsqu'elle est mesurée au cabinet médical.
- ☒ B. Inférieure à 135- 85 mm Hg lorsqu'elle est mesurée à domicile.
- ☐ C. Fixe à tout moment de la journée
- ☒ D. Variable selon les situations
- ☒ E. Plus élevé chez le sujet âgé

21/ Les risques associés à l'hypertension artérielle sont les suivants :

- ☒ A. Accident vasculaire cérébral
- ☒ B. Encéphalopathie hypertensive
- ☒ C. Cardiopathies ischémiques
- ☒ D. Insuffisance rénale
- ☐ E. Artérite des membres inférieurs



22/ La mesure correcte de la pression artérielle dépend de :

- ☐ A. La taille du brassard
- ☐ B. La position du bras
- ☐ C. Le moment de la journée
- ☐ D. La marque du tensiomètre
- ☐ E. Du site de mesure : poignet plutôt que le pli du coude.

23/ Devant une douleur thoracique, l'orientation diagnostique initiale repose sur :

- ☐ A. Un interrogatoire minutieux
- ☒ B. La réalisation d'une épreuve d'effort
- ☒ C. Un examen clinique sommaire
- ☐ D. Un scanner thoracique
- ☒ E. Un électrocardiogramme.

24/ Les diagnostics à évoquer devant une douleur thoracique aigüe sont :

- ☒ A. Le reflux gastro-œsophagien
- ☐ B. Syndrome de Tietze
- ☒ C. Un infarctus du myocarde
- ☒ D. En embolie pulmonaire
- ☐ E. Douleur neurologique

ResiPharmaTM

25/ Le diagnostic des palpitations repose sur :

- ☒ A. L'anamnèse
- ☒ B. L'échocardiographie
- ☒ C. L'électrocardiogramme
- ☐ D. Un test thérapeutique à la digitaline
- ☒ E. Le holter tensionnel

N°	Rép.
1	B
2	C
3	BC
4	ACE
5	ACE
6	X
7	BCE
8	BCE
9	D
10	C
11	BC
12	A
13	ADE
14	BC
15	E
16	ABCDE
17	AB
18	A
19	C
20	AB
21	ABCD
22	ABD
23	AE
24	CD
25	AC