

Le 24/06/2019

Durée de l'épreuve : 50 min Cocher la ou les réponses justes

1/ Les dysménorrhées protoméniales:

- a) Précédent de 2 à 3 jours le flux menstruel
- ☒ b) Surviennent avec les premières gouttes du flux menstruel, maximales le premier jour et diminuant ensuite ;
- c) Précédent de 12 à 24 heures le flux menstruel
- d) Apparaissant au deuxième et troisième jour du cycle menstruel
- ☒ e) Peuvent se rencontrer dans une endométriose.

2/ Les caractères sémiologiques des dysménorrhées sont :

- ☒ a) Douleur hypogastrique
- b) Douleur épigastrique
- c) S'accompagnent de troubles urinaires
- ☒ d) S'accompagnent de troubles digestifs
- e) Nécessite des dosages hormonaux systématiques.

3/ Les dysménorrhées secondaires peuvent être dues à :

- a) Des malformations utéro-vaginales
- ☒ b) Une adénomyose
- c) Un dispositif intra-utérin
- ☒ d) Des séquelles d'infection génitale
- ☒ e) Une endométriose.

ResiPharmaTM

4/ Quelles sont les contre-indications de la contraception hormonale :

- ☒ a) Une Hépatopathie sévère
- ☒ b) Le Cancer du sein
- ☒ c) Une Thrombose veineuse
- d) Les Dysménorrhées
- ☒ e) Une HTA non contrôlée

5/ Parmi les causes des céphalées graves on retient:

- ☒ a) L'Hémorragie cérébrale
- ☒ b) Les accidents vasculaires cérébraux
- ☒ c) La Dissection d'une artère cervicale
- d) Les sinusites
- e) Les affections rhumatologiques.

6/ Au cours des méningites les céphalées peuvent s'accompagner :

- a) De troubles digestifs
- ☒ b) De fièvre
- c) D'une paralysie de la VI^{ème} paire crânienne.
- ☒ d) D'une raideur de la nuque
- e) De photophobies.

7/ Les céphalées aiguës :

- a) Surviennent surtout chez le sujet jeune
- ☒ b) Traduisent souvent une urgence neurologique
- c) Sont dans la grande majorité des cas bénignes
- ☒ d) Nécessitent un scanner ou une IRM cérébrale
- e) Ne nécessitent aucune exploration.

8/ Parmi les propositions suivantes comment définiriez-vous les hémorragies digestives :

- a) C'est un symptôme bénin
- ☒ b) C'est une urgence médico-chirurgicale
- c) L'hémorragie digestive est toujours extériorisée.
- d) Elles sont représentées uniquement par des hématomèses.
- ☒ e) Elles sont dues à une effraction vasculaire.

9/ Dans quelles circonstances est découverte l'hémorragie digestive :

- ☒ a) Rejet par l'anus de sang rouge.
- ☒ b) Lors de la mise en place d'une sonde ~~nasale~~ *gastrique*
- ☒ c) En cas d'anémie aigue.
- ☒ d) Rapportée par le patient et objectivée par le médecin
- e) Rejet de sang par la bouche lors d'une quinte de toux.

10/ Quels sont les diagnostics différentiels (à éliminer) devant une hématomèse ?

- ☒ a) Une hémoptysie
- b) Une hématurie.
- ☒ c) Des épistaxis dégluties.
- ☒ d) Des vomissements teintés par la Rifampicine.
- ☒ e) Une Hémosialémèse.

ResiPharmaTM

11/ Comment évaluer objectivement l'abondance de l'hémorragie digestive ?

- a) L'interrogatoire du patient suffit
- ☒ b) Par le retentissement clinique : prise de la tension artérielle et pouls
- c) Par l'examen des conjonctives.
- ☒ d) Grâce au bilan biologique : la NFS.
- ☒ e) Grâce à l'endoscopie digestive.

12/ Quels sont les causes des hémorragies digestives hautes.

- a) Les hémorroïdes
- ☒ b) La maladie ulcéreuse gastroduodénale.
- ☒ c) La rupture de varices œsophagienne.
- ☒ d) La prise d'AINS ou d'Aspirine.
- ☒ e) Un syndrome de Mallory-Weiss.

13/ Concernant les hépatites virales quelles sont les propositions justes:

- a) Le risque de passage à la chronicité de l'infection due au virus B est de l'ordre de 90 %
- ☒ b) les hépatites virales chroniques B et C peuvent se compliquer d'une cirrhose ou d'un carcinome hépatocellulaire
- ☒ c) le virus Delta (D) entraîne une hépatite seulement lorsqu'il est associé au virus de l'hépatite B
- ☒ d) Dépistage de l'Ag HBS chez la femme enceinte est obligatoire ✓
- e) les virus des hépatites A et E peuvent entraîner des hépatites chroniques

14/ Le virus de l'hépatite C:

- a) C'est un virus à ADN
- ☒ b) Il est transmis par voie parentérale
- c) L'infection virale devient chronique dans moins de 10% des cas
- d) L'infection peut être prévenue par la vaccination
- ☒ e) Le dépistage de l'infection se fait par la recherche d'anticorps anti-HVC.

15/ La responsabilité d'un médicament au cours d'une hépatite doit être envisagée:

- ☒ a) Si le médicament est connu pour être hépatotoxique
- ☒ b) Si le médicament est nouvellement mis sur le marché
- c) Si les autres causes des hépatites sont exclues
- d) Si l'arrêt du médicament suspecté est suivi d'une amélioration des symptômes
- ☒ e) Toutes les réponses sont justes.

16/ Concernant la toux quelles sont les propositions justes :

- ☒ a) C'est un acte réflexe de défense.
- ☒ b) La toux permet d'expulser un corps étrangers.
- ☒ c) La toux peut-être sèche ou humide.
- ☒ d) La toux peut s'accompagner d'une expectoration
- e) Il faut toujours prescrire un anti-tussif.

17/ La palpitation est une sensation désagréable produite par les contractions cardiaques, quelles sont les propositions justes concernant les palpitations :

- a) Elle peut-être physiologique due à un effort intense.
- b) Elle peut-être pathologique due à une cardiopathie.
- ☒ c) Un Electrocardiogramme (ECG) permet de l'identifier.
- ☒ d) Elle peut révéler un trouble du rythme cardiaque. ناي
- e) Aucune réponse n'est juste.

18/ L'hypertension artérielle se définit par :

- ☒ a) Une tension systolique ≥ 140 mm Hg
- b) Une tension systolique ≥ 160 mm Hg
- ☒ c) Une tension diastolique ≥ 90 mm Hg
- ☒ d) Une tension systolique ≥ 140 mm Hg et /ou Une tension diastolique ≥ 90 mm Hg
- e) Une tension systolique ≥ 160 mm Hg et /ou Une tension diastolique ≥ 90 mm Hg

ResiPharmaTM

19/ Concernant les conditions de prise de la tension artérielle cochez les confirmations justes :

- ☒ a) Mesurer la TA à distance des efforts physiques
- ☒ b) Mesurer la TA à distance des repas
- ☒ c) Mesurer la TA à distance des épisodes de douleurs
- ☒ d) Mesurer la TA à distance de la prise d'alcool
- ☒ e) Mesurer la TA à distance de la prise de café

20/ Cochez les substances ou médicaments qui peuvent augmenter la tension artérielle :

- ☒ a) La cocaïne et les amphétamines
- ☒ b) Les anti-inflammatoires non stéroïdiens
- ☒ c) Les décongestionnants nasaux
- ☒ d) Le contraceptif à base d'œstrogène
- ☒ e) La réglisse

21/ Le l'hypertension artérielle peut donner toutes les complications suivantes sauf une laquelle ?

- a) L'infarctus du myocarde ✓
- b) L'accident vasculaire cérébral ✓
- c) L'insuffisance rénale chronique ✓
- ☒ d) L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- ☒ e) L'insuffisance hépatique.

22/ Concernant l'eczéma quelles sont les propositions justes :

- ☒ a) C'est une dermatose prurigineuse.
- ☒ b) C'est une affection contagieuse.
- ☒ c) C'est une affection chronique
- ☒ d) L'eczéma peut-être de contact ou atopique.
- ☒ e) C'est une dermatose de l'adulte et de l'enfant.