

Contrôle de sémiologie

1- Les palpitations :

- ☒ A- sont définies par la perception des battements cardiaques anormaux
- B- Sont toujours secondaires à une pathologie cardiaque
- C- Peuvent s'installer brutalement ou progressivement
- ☒ D- Peuvent se voir après la prise d'un excitant comme le café ou le thé
- E- Peuvent se voir dans la névrose cardiaque

2- La douleur de l'infarctus de myocarde :

- A- Est souvent de siège en retro sternal
- B- elle est constrictive, atroce, angoissante
- ☒ C- Irradiation est souvent soit bilatérales et symétriques : membres supérieurs et mâchoire
- D- la douleur est accompagnée d'agitation, de malaise profond avec angoisse
- E- Est soulagée par la prise de Trinitrine

3- Les douleurs thoraciques d'origine non ischémique sont secondaires à :

- A- Angor d'effort stable
- ☒ B- Dissection aortique
- ☒ C- Embolie pulmonaire
- D- Infarctus de myocarde
- E- Syndrome coronarien aigu

4- La syncope est une perte de connaissance :

- A- D'installation progressive
- ☒ B- Brève
- C- En rapport avec une hypo perfusion cérébrale
- D- Précédée de signes prémonitoires
- E- S'accompagne souvent d'une chute traumatique

5- La lipothymie est une perte de connaissance :

- A- D'installation progressive
- B- La reprise de la conscience est rapide et complète
- ☒ C- Suivi souvent par un état de fatigue
- D- Précédée de signes prémonitoires
- ☒ E- S'accompagne souvent d'une chute traumatique

6- Dyspnée est :

- A / arrêt respiratoire
- B/ trouble du rythme cardiaque
- C/ difficulté à avaler
- D/ difficulté à respirer
- ☒ E/ gêne respiratoire

7- Toux émétisante est toute ces propositions sauf (la ou les réponses fausses)

- A/ s'observe au cours de la coqueluche
- ☒ B/ responsable d'une diarrhée
- ☒ C/ responsable d'une constipation
- D / une brusque, bruyante expiration à travers une glotte rétrécie
- E/ responsable de vomissement

8- La Bradypnée : est une (réponse juste)

- A/ fréquence respiratoire supérieure à 14 chez l'adulte
- B/ fréquence respiratoire supérieure à 14 chez l'enfant
- C / fréquence respiratoire inférieure à 30 chez l'adulte
- ☒ D/ fréquence respiratoire inférieure à 14 chez l'adulte
- E/ fréquence respiratoire supérieure à 22 chez l'enfant

9- LES DIURETIQUES, cochez les réponses justes :

- ☒ A Augmentent l'élimination urinaire de sodium en agissant au niveau des cellules du tubule rénal
- ☒ B entraînent une diminution de la volémie et de la surcharge sodique
- ☒ C il existe trois catégories en fonction du site d'action au niveau du tubule rénal
- D. les diurétiques de l'anse Inhibent la réabsorption du Na⁺ au Niveau du tubule distal
- E. Indapamide FLUDEX* est un diurétique de l'anse

ResiPharmaTM

10-LES INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC), cochez les réponses justes :

- ☒ A. entraînent l'inhibition de la synthèse de l'angiotensine II
- ☒ B. L'inhibition de la dégradation de la bradykinine est responsable de la baisse de la pression artérielle.
- ☒ C. Les Effets Indésirables fréquents sont l'hypotension artérielle, l'hyperkaliémie et une toux sèche
- D. Parmi les inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion : Valsartan TAREG*
- ☒ E. peuvent être utilisés dans le traitement de l'HTA

11-LES ANTAGONISTES DES RECEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II), cochez les réponses justes :

- ☒ A. Antagonistes soit compétitifs soit non compétitifs des récepteurs de l'angiotensine II
- B. entraînent une baisse de la pression artérielle
- ☒ C. Parmi les effets Indésirables : Hypotension Artérielle, Hyperkaliémie
- D. Parmi les ARAL : Périndopril COVERSYL* Enalapril RENITEC*
- E. peuvent être utilisés dans le traitement de l'HTA

12-Les chiffres tensionnels suivants sont pathologiques :

- A/PAS à 150 mm hg au cabinet médical
- B/PAS diurne à 138 mm hg à la MAPA
- ☒ C. PAS nocturne à 110 mm hg a la MAPA
- D/ PAS à 130 mm hg a l'automesure
- ☒ E. PAD nocturne à 75 mm hg a la MAPA

13-les symptômes neurosensoriels de l'HTA :

- ☒ A. sont spécifiques de l'HTA
- ☒ B. imposent un traitement urgent de l'HTA
- C/ leur absence permet d'écarter le diagnostic de l'HTA
- D/ ne sont pas corrélés a la gravité de l'HTA
- E/ sont étroitement corrélés aux chiffres tensionnels

14- le pallier 2 du traitement de l'HTA est une :

- A/ monothérapie pour tous patients
- B/ bithérapie pour la plupart des patients
- ☒ C. bithérapie pour tous les patients
- D/ trithérapie pour la plupart des patients
- E/ trithérapie pour tous les patients

15- la douleur de l'angor a les caractéristiques suivantes :

- ☒ A. douleur a type de point de coté
- B/ douleur rétrosternale
- C/ douleur constrictive
- ☒ D. douleur irradiant au bras gauche
- E/ douleur rythmée par les repas

16- la douleur thoracique de l'embolie pulmonaire est habituellement :

- A/ une douleur basithoracique
- B/ une douleur constrictive
- C/ une douleur soulagée par les dérivés nitrés
- ☒ D. accompagnée d'une dyspnée
- E/ une douleur irradiant au dos

17-une douleur thoracique transfixiante, violente a type de déchirure évoque en priorité :

- A/ une embolie pulmonaire
- B/ une ulcère gastrique
- C/ un IDM
- D/ une péricardite
- ☒ E. une dissection aortique

18- Parmi les propositions suivantes, une coloration rouge des urines peut être constatée au cours de :

- A. Myoglobinurie
- B. Lyzosymurie
- ☒ C. Amylasurie ?
- D. Porphyrurie
- E. Prise de certains médicaments, notamment la rifampicine

ResiPharmaTM

19- Devant une hématurie microscopique, découverte de façon fortuite à la bandelette, quels sont parmi les examens suivants celui ou ceux que vous allez prescrire ?

- A. Dosage quantitatif de la protéinurie
- ☒ B. uroscanner
- C. Créatininémie
- D. Biopsie rénale
- E. Examen cyto bactériologique des urines

20- Devant une hématurie, quel(s) élément(s) oriente(nt) vers une origine urologique ?

- A. Présence de cylindres hématiques (cytologie des urines)
- ☒ B. Présence de caillots dans les urines
- C. Douleur lombaire
- D. Présence d'hématies déformées (cytologie des urines)
- E. Insuffisance rénale

21- Toutes ces affections sont causes des céphalées aigues sauf une

- a) Hémorragie méningée
- b) Accident vasculaire cérébral
- c) Dissection d'une artère cervicale
- ☒ d) Arthrose cervicale
- e) Sinusite aiguë

22- Parmi les propositions suivantes quelles sont celles qui évoquent une céphalée grave :

- a) Céphalées unilatérales pulsatiles
- b) Céphalées accompagnées de fièvre
- c) Céphalées avec syndrome méningé
- d) Céphalées chez un patient sous anticoagulants
- ☒ e) Céphalées au cours d'une grossesse

23- Au cours de l'Hypertension intracrânienne :

- f) Les céphalées sont de sièges unilatérales
- g) Les céphalées sont diffuses
- ☒ h) Les céphalées sont accompagnées de nausées et de vomissements
- i) Le fond d'œil retrouve un œdème papillaire bilatéral
- j) Aucune exploration radiologique n'est nécessaire

24- Quels sont les caractéristiques sémiologiques à rechercher devant des douleurs abdominales des fosses iliaques ?

- ☒ a) Intensité de la douleur
- b) Type de douleur
- ☒ c) Ancienneté de la douleur
- d) Signes urinaires associés
- ☒ e) Troubles du transit associés

25- Chez un jeune patient âgé de 20 ans qui présente depuis 3 jours des douleurs abdominales aigues et intenses de la fosse iliaque droite irradiant vers l'hypogastre avec fièvre et vomissements ;

Quels sont les diagnostics à évoquer chez lui ?

- a) D'abord éliminer une grossesse extra-utérine
- b) Une appendicite
- ☒ c) Une salpingite droite
- d) Une pancréatite
- e) Une péritonite appendiculaire

26- Parmi les critères suivants quels sont ceux qui vous orientent vers une douleur abdominale d'origine organique ?

- ☒ a) L'ancienneté de la douleur.
- b) Un sujet très stressé
- c) Un amaigrissement
- ☒ d) L'absence de signes d'accompagnements
- e) La présence de signes d'accompagnements

27- la dysménorrhée primaire est caractérisée par :

- A. apparition postpubertaire précoce
- B. le plus souvent elle est essentielle
- C. apparition souvent après 30 ans chez une femme dont les règles étaient jusque-là indolores
- ☒ D. l'absence d'algies pelviennes chroniques entre les règles
- E. l'examen gynécologique est normal, non douloureux.

28- Les Contre-indication de la contraception Hormonale sont :

- ☒ A. Cancer du sein, cancer de l'endomètre
- ☒ B. HTA non contrôlée
- C. Thrombose artérielle, veineuse ou antécédent.
- ☒ D. Hépatopathie sévère
- E. Maladie rhumatismale

ResiPharmaTM

Département de Pharmacie - EMD2 de Semiologie - 3ème année

Date de l'épreuve : 30/05/2022

Page 1/1

Corrigé Type

5 question(s) retirée(s) - Barème par question : 0,80000000 (au lieu de 0,67)

N°	Rép.
1	CDE
2	ABCD
3	BC
4	BCE
5	ACD
6	DE
7	BC
8	D
9	ABC
10	ABCE
11	ABCE
12	ABE
13	D
14	E
15	BCD
16	AD
17	E
18	ADE
19	ACE
20	BC
21	D
22	BCDE
23	BCD
24	X
25	X
26	X
27	ABDE
28	ABCD
29	X
30	X



Signature
Dr. Samia
Interne
Pharmacie