

1/ L'histoire de la maladie, recherche :

- ☒ A/ la chronologie des symptômes.
- B/ les symptômes objectifs.
- ☒ C/ les symptômes fonctionnels principaux.
- ☒ D/ le symptôme douloureux.
- E/ les symptômes physiques.

2/ Un symptôme est :

- A/ une plainte exprimée par l'entourage familial
- B/ un signe recherché par la biologie.
- ☒ C/ un signe présent au niveau de l'organisme en réponse à une maladie.
- D / un signe présent lors de l'examen clinique.
- E/ un antécédent médical chez la fratrie.

3/ Une altération de l'état général, comprend tous ces signes :

- A/ amnésie
- ☒ B/ anorexie
- ☒ C/ amaigrissement
- ☒ D/ asthénie
- ☒ E/ perte pondérale involontaire

ResiPharmaTM

4-La douleur de l'embolie pulmonaire :

- A-Ressemble à la douleur de la péricardite
- B- Est souvent de siège précordial
- C-Est à type de brûlure
- ☒ D-S'accompagne fréquemment de dyspnée
- E- Soulagé par la position penchée en avant

5-L'angor d'effort ou angine de poitrine :

- ☒ A-Est la traduction clinique de l'ischémie myocardique
- B-Est en rapport avec un déséquilibre entre les apports et les besoins
- C-Est souvent secondaire à une diminution de diamètre de la lumière coronaire
- ☒ D-Augmente avec l'augmentation de l'effort
- E- Soulagé par la position penchée en avant

6- Quels sont les types d'angor qui font suspecter un syndrome coronarien aigu :

- A-Angor de novo
- B-Angor crechendo
- ☒ C- Angor de repos
- D-Angor d'effort stable
- E-Angor post-IDM

14- La définition d'une constipation correspond à :

- ☐ A- moins de 3 défécations par semaine
- ☐ B- un arrêt des matières et des gaz
- ☐ C- une évacuation incomplète des selles
- ☐ D- un poids moyen des selles < 35g/j
- ☐ E- une douleur anorectale

15- Les diarrhées chroniques motrices sont caractérisées par :

- ☐ A- la présence obligatoire de sang
- ☐ B- des selles fréquentes mais de faible volume
- ☐ C- la présence d'aliments digérés dans les selles
- ☐ D- leur horaire fréquemment matinal et postprandial précoce
- ☐ E- des selles fréquentes et de grand volume

16- La douleur gastrique ou duodénale :

- ☐ A- siège au niveau de l'hypogastre
- ☐ B- siège au niveau de l'épigastre
- ☐ C- est calmée par l'anteflexion
- ☐ D- est calmée par la prise d'aliments ou d'antiacides
- ☐ E- est rythmée par les repas

ResiPharmaTM

17- Une pancréatite aiguë entraîne une douleur :

- ☐ A- de grande intensité
- ☐ B- qui se calme par l'antéflexion
- ☐ C- d'intensité modérée
- ☐ D- de siège épigastrique
- ☐ E- qui se calme par le décubitus dorsal

18- Parmi les critères de gravité d'une douleur thoracique :

- ☐ A- Survenue chez une femme juste après un accouchement
- ☐ B- des douleurs ayant un début très brutal
- ☐ C- des douleurs qui irradient vers le bras, la gorge, le cou ou le dos
- ☐ D- des douleurs qui s'aggravent à l'effort.
- ☐ E- Association à des vomissements

19- Les critères de gravité de céphalées sont :

- ☐ A- Les céphalées de tension
- ☐ B- La survenue brutale
- ☐ C- Pâleur cutanée
- ☐ D- Présence de fièvre et sueurs
- ☐ E- Association à des douleurs articulaires

20- La progression du diabète en Afrique du Nord et au Moyen Orient est :

- ☐ A- La même que dans le reste du monde
- ☐ B- Quatre fois plus rapide qu'en Europe
- ☐ C- Moins rapide que le reste du monde
- ☐ D- La même qu'en Afrique
- ☐ E- Toutes les réponses sont justes

7-La douleur de l'infarctus de myocarde :

A-Est souvent de siège en retro sternal

☒ B- elle est constrictive, atroce, angoissante

C-Irradiation est souvent sont bilatérales et symétriques : membres supérieurs et mâchoire

☒ D- la douleur est accompagnée d'agitation, de malaise profond avec angoisse

E-Est soulagée par la prise de Trinitrine

8-Les palpitations :

A-Sont définies par la perception anormale ou désagréable des battements cardiaques

B- induites toujours par un effort violent inhabituel ou une forte émotion

C-Sont toujours spontanées

☒ D-Peuvent se voir après la prise d'un excitant comme le café

☒ E-Le rythme cardiaque reste régulier en cas de palpitation physiologiques

9-Veuillez cocher les propositions justes concernant les biguanides :

A. Ils augmentent la production hépatique du glucose (néoglucogénèse.

B. Principal effet secondaire : l'hypoglycémie.

☒ C. Ils améliorent la sensibilité à l'insuline.

D. Ils sont autorisés en cas d'insuffisance rénale terminale.

☒ E. Ils ne sont pas autorisés en cas de grossesse

10-Veuillez cocher les propositions justes concernant les sulfarnides :

A. Principal effet secondaire : les troubles digestifs.

☒ B. Ils sont contre indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère.

C. Principal effet secondaire : l'acidose lactique.

☒ D. Ils stimulent la sécrétion de l'insuline.

E. Ils sont autorisés en cas de grossesse.

11-Les caractéristiques de la biométrie doivent être : quelles sont les réponses justes

☒ A. universelle

☒ B. unique

C. multiples

D. variables

☒ E. mesurable

ResiPharmaTM

12-Les intérêts de la biométrie : les réponses justes

☒ A. La reconnaissance de l'individu

☒ B. La protection des consommateurs contre la fraude ou le vol

☒ C. La haute sécurité

D. Elle ne remplace pas les mots de passe

☒ E. Elle contribue à l'accélération des services

13-Les épreintes :

A- sont liées à un spasme du rectosigmoïde

B- sont des diarrhées glairosanglantes

C-sont des diarrhées aqueuses

D- sont des douleurs anales précédant des défécations

☒ E-des douleurs hypogastriques précédant des défécations

21-Parmi les réponses suivantes quelle est celle qui correspond aux caractéristiques du diabète de type 1 :

- A. Il s'agit d'un diabète n'atteignant que les enfants
- ☒ B. Il est d'origine auto immune et survient sur un terrain génétique prédisposé
- C. Il s'agit d'un diabète lié à une insulino résistance
- D. Il est dû à une pancréatite calcifiante
- E. Toutes les réponses sont fausses

22-Le diagnostic de diabète sucré peut être posé devant les critères suivants (cochez la réponse juste)

- A. Une glycémie a jeun entre 1,10 g/l et 1,26 g/l
- B. Une HbA1c > 6%
- ☒ C. Une glycosurie positive
- D. Une glycémie post prandiale supérieure à 1,26 g/l
- ☒ E. Une glycémie pratiquée à n'importe quel moment supérieur à 2 g/l

23-Dans le diabète de type 2, quels sont les mécanismes de l'hyperglycémie (cochez les réponses justes)

- A. Diminution de la réabsorption du glucose
- ☒ B. Dysfonctionnement des neurotransmetteurs
- ☒ C. Baisse de l'effet incrétine
- ☒ D. Hypersécrétion de glucagon
- E. Toutes les réponses sont justes

ResiPharmaTM

24-Dans l'histoire naturelle du diabète de type 2, avant même le diagnostic de la maladie on note :

- A. Des hyperglycémies post prandiales conjoncturelles
- ☒ B. Des glycémies à jeun supérieures à 1,26 g/l
- C. Acétonurie, HbA1c > 6,5%
- D. Glycosurie, HbA1c > 6,5%
- E. Toutes les réponses sont justes



Département de pharmacie - EMD1 de semiologie - 3 année

Date de l'épreuve : 17/01/2023

Corrigé Type

1 question(s) retirée(s) - Barème par question : 0,83333333 (au lieu de 0,80)

N°	Rép.
1	ACD
2	CD
3	BCDE
4	D
5	ABCD
6	ABCE
7	ABCD
8	ADE
9	CE
10	B
11	ABE
12	ABCE
13	AE
14	AD
15	BCD
16	BDE
17	ABD
18	ABCD
19	BD
20	B
21	B
22	E
23	BCD
24	A
25	X

