

Contrôle de séméiologie

1 / Les chiffres tensionnels suivants ne sont pathologiques :

- A- PAS à 145 mm hg au cabinet médical
- ☒ B- PAS diurne à 140 mm hg à la MAPA
- C- PAS nocturne à 110 mm hg a la MAPA
- ☒ D- PAS à 132 mm hg a l'automesure
- ☒ E- PAD nocturne à 75 mm hg a la MAPA

2/ les symptômes neurosensoriels de l'HTA :

- ☒ A- ne sont spécifiques de l'HTA
- B- nécessitent un traitement urgent de l'HTA
- C- leur présence permet de confirmer le diagnostic de l'HTA
- D- sont corrélés a la gravité de l'HTA
- E- sont corrélés aux chiffres tensionnels

3/ on parle d'HTA résistante quand :

- A- la monothérapie est inefficace
- B- la bithérapie est inefficace
- ☒ C- la trithérapie est inefficace
- D- le régime est inefficace
- E- toutes les réponses sont fausses

ResiPharmaTM

4- Les cibles tensionnelles d'un sujet hypertendu âgé de 63 ans sont:

- ☒ A- une PAS entre 120 et 130 mm hg
- B- une PAS entre 130 et 140 mm hg
- C- une PAS entre 110 et 120 mm hg
- ☒ D- une PAD entre 70 et 80 mm hg
- E- une PAD entre 80 et 90 mm hg

5- l'étiologie principale de de l'HTA est :

- A- HTA rénale
- ☒ B- HTA essentielle
- C- HTA endocrinienne
- D- HTA médicamenteuse
- E- HTA rénovasculaire

6- la douleur de l'angor a les caractéristiques suivantes :

- A- douleur est constrictive
- B- douleur basithoracique
- C- douleur en coup de poignard
- ☒ D- douleur irradiant au bras gauche
- E- douleur rythmée par les repas

7- la douleur thoracique de l'embolie pulmonaire est habituellement :

- A- une douleur basithoracique
- B- une douleur a type de point de coté
- C- une douleur soulagée par la position penché en avant
- ☒ D- / accompagnée d'une dyspnée
- E- une douleur irradiant au bras gauche

8/ une douleur thoracique transfixante, descendante évoque en priorité :

- A- une embolie pulmonaire
- B- un ulcère gastrique
- C- un IDM
- D- une péricardite
- ☒ E- une dissection aortique

9-La syncope est une perte de connaissance :

- ☒ A- D'installation brutale
- B- Brève
- C- En rapport avec une hypo perfusion cérébrale
- D- Précédée de signes prémonitoires
- E- Avec récupération progressive de la conscience

10-La lipothymie est une perte de connaissance :

- A- D'installation Brutale
- B- La reprise de la conscience est rapide et complète
- C- En rapport avec une hypo perfusion cérébrale
- ☒ D- Précédée de signes prémonitoires
- ☒ E- Suivi souvent par un état de fatigue

11- Les causes possibles d'une syncope sont:

- ☒ A- Troubles de rythme rapides (comme la tachycardie ventriculaire TV)
- ☒ B- Les troubles de la conduction auriculo ventriculaires (comme le bloc auriculo ventriculaire BAV)
- C- Hypertension artérielle orthostatique
- D- Hyper réflectivité de sinus carotidien
- E- Embolie pulmonaire

12-Parmi les signes suivants quels sont ceux qui évoquent une céphalée grave:

- a. Céphalées de siège temporale
- ☒ b. Céphalées accompagnées de fièvre
- ☒ c. Céphalées avec syndrome méningé
- ☒ d. Céphalées chez un patient sous anticoagulants
- ☒ e. Céphalées au cours d'une grossesse

13-Au cours de la migraine, les céphalées :

- a. sont unilatérales
- b. sont à types de décharge électrique
- ☒ c. évoluent par crises
- d. durent quelques minutes
- e. durent entre 4 heures et 72 heures.

14-Une hépatite virale peut se révéler par :

- a. Ictère
- b. Dyspnée
- c. Tachycardie
- ☒ d. Cytolyse hépatique
- ☒ e. Fièvre

15-la responsabilité d'un médicament au cours d'une hépatite doit être envisagé:

- ☒ a. Si le médicament est connu pour être hépatotoxique
- ☒ b. Si le médicament est nouvellement mis sur le marché
- c. Si une hépatite virale est associée
- ☒ d. Si l'arrêt du médicament suspecté est suivi d'une amélioration des symptômes
- e. Si les signes cliniques durent plus de six mois

ResiPharmaTM

16-Quels sont les caractéristiques d'une hématurie d'origine néphrologique :

- ☒ A. Elle est parfois macroscopique
- B. Elle ne contient pas des caillots de sang
- C. Elle n'est jamais associée à une protéinurie
- D. Elle survient en dehors de la miction
- E. Elle s'accompagne toujours de douleur.

17-Une hématurie initiale est :

- A. sans valeur localisatrice d'une origine
- ☒ B. d'origine souvent prostatique
- C. peut être d'origine urétrale
- D. survient pendant toute la miction
- E. Une hématurie microscopique.

18-Devant une hématurie macroscopique chez un sujet de 60ans on évoque :

- A. carcinome de la vessie
- B. glomérulonéphrite
- C. pyélonéphrite aigue
- D. cancer des voies urinaires
- ☒ E. syndrome d'Alport

19/ Dyspnée est :

- ☒ A/ difficulté à respirer
- ☒ B/ gêne à respirer
- C/ arrêt respiratoire
- D/ difficulté à avaler
- E/ gêne à avaler

ResiPharmaTM

20/ Toux émetisante est caractérisée par toutes ces propositions sauf:

- A/ s'observe au cours de la coqueluche
- B/ responsable de vomissement
- ☒ C/ responsable d'une diarrhée
- D/ une brusque, bruyante expiration à travers une glotte rétrécie
- ☒ E/ responsable d'une anosmie.

21/ La Bradypnée est une : (la ou les réponses justes)

- A/ fréquence respiratoire supérieure à 14 chez l'adulte
- B/ fréquence respiratoire supérieure à 14 chez l'enfant
- C/ fréquence respiratoire inférieure à 30 chez l'adulte
- ☒ D/ fréquence respiratoire inférieure à 14 chez l'adulte
- ☒ E/ fréquence respiratoire inférieure à 22 chez l'enfant

22--LES DIURETIQUES, cochez les réponses fausses :

- A. augmentent l'élimination urinaire de sodium en agissant au niveau des cellules du tubule rénal
- B. entraînent une diminution de la volémie et de la surcharge sodique
- C. il existe trois catégories en fonction du site d'action au niveau du tubule rénal
- ☒ D. les diurétiques de l'anse inhibent la réabsorption du Na⁺ au Niveau du tubule distal
- ☒ E. Indapamide FLUDEX* est un diurétique de l'anse

23--LES ANTAGONISTES DES RECEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II), cochez les réponses justes :

- ☒ A. Antagonistes soit compétitifs soit non compétitifs des récepteurs de l'angiotensine II
- ☒ B. entraînent une baisse de la pression artérielle
- C. Parmi les effets Indésirables : Hypokaliémie
- D. Parmi les ARAl : candesartan, valsartan
- ☒ E. peuvent être utilisés dans le traitement de l'HTA

24-l'insuffisance cardiaque, cochez la réponse fausse:

- A. peut se définir par l'incapacité du cœur à fournir un débit adapté aux besoins de l'organisme.
- B. C'est une pathologie de mauvais pronostic
- C. la dyspnée constitue le maître symptôme de l'insuffisance cardiaque gauche
- ☒ D. L'auscultation pulmonaire peut retrouver des râles crépitants en cas d'insuffisance cardiaque droite
- E. La tension artérielle peut être basse

25-l'insuffisance cardiaque (IC), cochez la réponse fausse:

- A. l'insuffisance cardiaque gauche est prédominante
- B. Plusieurs facteurs peuvent déstabiliser une IC
- C. parmi les symptômes de l'IC, la dyspnée et la toux
- ☒ D. L'écart de régime constitue le facteur le moins fréquent de décompensation cardiaque
- E. elle peut être chronique ou aiguë

26/Les examens à faire devant une dysménorrhée organique sont :

- A. Dosages hormonaux
- B. Examen gynécologique
- C. Echographie
- D. Hystérosalpingographie
- E. Coelioscopie

27- Les contre-indications de la contraception locale sont :

- a. Grossesse
- b. Infection génitale haute
- c. Trouble de la coagulation sanguine
- d. Cardiopathies valvulaires
- e. Anomalies de la cavité utérine

28-L'examen en dermatologie comprend trois temps :

- ☒ a- L'interrogatoire
- b- L'auscultation
- ☒ c- L'inspection
- d- La palpation
- ☒ e- La percussion

ResiPharmaTM

29-L'érythème est :

- a- une coloration rouge due à une vasodilatation des petits vaisseaux
- b- une vasoconstriction des petits vaisseaux
- c- une coloration bleutée des téguments
- ☒ d- une coloration rouge due à une augmentation du nombre de globules rouges
- e- un excès de mélanine

30-Le zona est caractérisé par :

- a- une éruption vésiculeuse
- b- une infection virale
- ☒ c- une éruption pustuleuse
- d- diffuse intéresse tout le corps
- e- Localisé de topographie radiaire

31-Quelles sont les signes radiologiques d'une arthrose :

- ☒ a- Pincement élastique, asymétrique
- b- Tuméfaction des parties molles
- ☒ c- Ostéophytes
- ☒ d- Condensation sous chondrale
- ☒ e- Géodes sous chondrales

32) L'épanchement articulaire de type mécanique est caractérisé par :

- a) présence de sang
- b) une augmentation du taux de glucose synoviale
- ☒ c) Cellularite < 1000/mm³,
- d) pourcentage des PNN < 50%
- e) viscosité accrue

33) La manœuvre du tiroir est positive elle témoigne :

- a) d'une lésion du ligament croisé postérieur
- b) d'une lésion du ligament méniscale
- c) d'une lésion du cartilage
- d) d'une lésion du ligament croisé antérieur
- ☒ e) toutes les réponses sont justes

34) Monoarthrite chronique est une monoarthrite évoluant :

- A-depuis moins de 03 semaines
- B-depuis moins de 1 mois
- ☒ C-depuis plus de 06 semaines
- D-depuis plus de 03semaine
- E- depuis moins de 06 semaines





Département de pharmacie - EMD2 de sémiologie - 3ème année

Date de l'épreuve : 19/04/2023

Page 1/1

Corrigé Type

3 question(s) retirée(s) - Barème par question : 0,62500000 (au lieu de 0,57)

N°	Rép.
1	CD
2	A
3	C
4	AD
5	B
6	AD
7	ABD
8	E
9	ABC
10	CDE
11	ABDE
12	ACDE
13	ACE
14	ADE
15	ABD
16	AB
17	BC
18	AD
19	AB
20	CE
21	DE
22	DE
23	ABDE
24	D
25	ABCE
26	X
27	X
28	ACD
29	A
30	AB
31	ACDE
32	CDE
33	AD
34	C
35	X



Pr. Bensalem Samia
Médecine Interne
Diabète
Constantine