

- ✓✓ 1- L'examen clinique du malade :
- A- Passe par 3 étapes : inspection, percussion et auscultation
 - ☒ B- La palpation permet la recherche d'une hépatomégalie, splénomégalie ou autres tuméfactions
 - C- L'auscultation permet de rechercher un souffle vasculaire
 - D- N'engage en aucun cas les organes de sens du médecin
 - E- Aucune réponse n'est juste
- ✓✓ 2- L'index de masse corporelle :
- A- Fait partie des signes fonctionnels que rapporte un malade
 - ☒ B- Permet d'interpréter le poids et la taille du malade
 - C- Un IMC inférieur à 18,5 kg/m² définit une obésité grade 1
 - D- Un IMC entre 25 et 30 kg/m² est normal
 - E- Fait partie des signes généraux
- ✓✓ 3- La fièvre se définit comme :
- ☒ A- Une élévation anormale de la température centrale en dessus de la normale
 - B- Une température en dessous de 35°C
 - C- Une température supérieure à 37 °C
 - D- Une température > 37°C le matin et > 37,5°C le soir
 - E- Toutes les réponses sont justes
- ✓✓ 4- Quelle est la définition de la dyspnée ?
- a) Douleur thoracique
 - ☒ b) Difficulté à respirer qui devient consciente et pénible
 - c) Augmentation du volume respiratoire
 - d) Expulsion brusque d'air
 - e) Toutes les réponses sont justes
- ✓✓ 5- La polypnée correspond à :
- a) Une diminution de la fréquence respiratoire
 - ☒ b) Une augmentation de la fréquence respiratoire > 22 cycles/min
 - c) Une respiration profonde et lente
 - d) Une absence de respiration
 - e) Augmentation de la fréquence cardiaque
- ✓✓ 6- La vomique eau de roche est caractéristique :
- a) De l'abcès pulmonaire
 - ☒ b) De la rupture d'un kyste hydatique
 - c) De la bronchite chronique
 - d) De l'asthme
 - e) De l'atélectasie pulmonaire
- ✓✓ 7/ Parmi les propositions suivantes, quels symptômes orientent vers une cause potentiellement grave de la douleur thoracique ?
- A) Douleur légère et intermittente
 - ☒ B) Douleur sévère, la pire vécue par le patient
 - C) Douleur qui s'améliore à l'effort
 - D) Douleur localisée uniquement à l'épaule droite
 - E) Douleur associée à une syncope ou une dyspnée progressive
- ✓✓ 8/ Quelle est la caractéristique principale d'une douleur pleurale ?
- A) Douleur persistante, comme un poids sur le thorax
 - ☒ B) Douleur soulagée en se penchant en avant
 - C) Douleur unilatérale, augmentée à l'inspiration profonde et à la toux
 - D) Douleur irradiant vers la mâchoire et les épaules
 - E) Douleur associée à des nausées et vomissements

ResiPharmaTM

✓✓ 9- Quel est le (s) critère(s) de gravité de céphalées ?

A) Céphalées de tension

B) Migraine

☒ C) Association à des vomissements

D) Céphalées liées au stress

E) Céphalées dues à la fatigue

✓✓ 10- Concernant les hémorragies digestives, quelles sont les propositions justes ?

☒ a) Elle témoigne d'un saignement provenant d'un point quelconque du tube digestif

b) Le traitement médical seul suffit dans tous les cas

c) C'est un saignement d'origine artérielle uniquement

☒ d) Elle constitue parfois une urgence

☒ e) Il peut s'agir d'une hémorragie non extériorisée qui se révèle par une anémie chronique

✓✓ 11- Quelles sont les propositions justes concernant les hématomèses ?

a) C'est le rejet par la bouche lors d'un effort de toux de sang rouge ou noirâtres

b) La lésion responsable du saignement se situe au-dessous de l'angle de Treitz

☒ c) Il faut rechercher à l'interrogatoire la prise d'AINS ou d'anticoagulants

☒ d) La notion de tabagisme ou d'éthylisme oriente vers une cause néoplasique de l'hémorragie

☒ e) La gravité de l'hémorragie dépend de son abondance et du terrain du patient

✓✓ 12- Quels sont les causes des rectorragies :

☒ a) Cancer ano-rectal

~~b)~~ Rectites ou colites inflammatoires

~~c)~~ Une métrorragie

~~d)~~ Une rupture de varices gastriques

☒ e) Les hémorroïdes

✓✓ 13- La progression du diabète en Afrique du Nord et au Moyen Orient est :

A. La même que dans le reste du monde

B. Moins rapide que le reste du monde

C. La même qu'en Europe

☒ D. Quatre fois plus rapide qu'en Europe

E. Moins rapide qu'en Europe

✓✓ 14- Parmi les réponses suivantes quelle est celle qui correspond aux caractéristiques du diabète de type 1 :

A. Il s'agit d'un diabète n'atteignant que les enfants

B. Il s'agit d'un diabète lié à une insulino-résistance

C. Il est dû à une pancréatite calcifiante

☒ D. Il est d'origine auto immune et survient sur un terrain génétique prédisposé

E. Toutes les réponses sont justes

✓✓ 15- Le diagnostic de diabète sucré peut être posé devant les critères suivants :

A. Une glycémie à jeun entre 1,10 g/l et 1,26 g/l

B. Une HbA1c > 6%

C. Une glycosurie positive

~~D.~~ Une glycémie post prandiale supérieure à 1,40 g/l

☒ E. Une glycémie pratiquée à n'importe quel moment supérieur à 2 g/l

✓✓ 16. les rhumatismes inflammatoires se caractérisent par :

☒ A. Douleur d'horaires inflammatoire

~~B.~~ La lésion élémentaire est la destruction cartilagineuse

C. Un syndrome inflammatoire constant

☒ D. Dérouillage matinal > 30 min

☒ E. Augmentation du volume articulaire

✓✓ 17- L'arthrose se manifeste par :

☒ A. Des douleurs mécaniques à la mise en charge

~~B.~~ Des douleurs inflammatoires insomniantes

~~C.~~ Des signes inflammatoires locaux

☒ D. Craquement à la mobilisation

☒ E. Elle peut rester longtemps asymptomatique

ResiPharmaTM

- ✓✓ 18- Arthrose secondaire :
- A. Tardif et moins sévère.
 - ☒ B. plus précoce et plus sévère
 - C. peut-être post traumatique
 - D. Due à un surmenage mécanique : professionnel ou sportif.
 - E. Dans certaines affections : hémochromatose, Wilson, acromégalie.
- ✓✓ 19- L'HTA grade 1 est définie par (cochez la bonne réponse) :
- ☒ a- Une PAS entre 140_159 mmhg et/ou une PAD entre 90_99 mmhg
 - b- Une PAS entre 120_129 mmhg et / ou une PAD entre 80_84 mmhg
 - c- Une PAS entre 140_159 mmhg et/ou une PAD entre 80_84 mmhg
 - d- Une PAS entre 140_159 mmhg et/ou une PAD $\geq$ à 110 mmhg
 - e- Une PAS $\geq$ à 180 mmhg
- ✓✓ 20- Parmi les propositions suivantes lesquelles représentent une indication de la MAPA :
- a- Suspicion d'une HTA effet « blouse blanche » au cabinet médical
 - ☒ b- Suspicion d'une HTA masquée au cabinet médical
 - ☒ c- Évaluation de l'HTA nocturne et du Statu Dipper
 - d- AVC ischémique
 - e- Aucune de ces réponses
- ✓✓ 21- Cochez les réponses justes qui comportent une classe thérapeutique pour le traitement médicamenteux de l'HTA :
- ☒ a- Les diurétiques
 - ☒ b- Les inhibiteurs calciques
 - c- Les corticoïdes
 - ☒ d- Les béta- bloqueurs
 - ☒ e- Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)
- ✓✓ 22- Veuillez cocher les propositions justes concernant les biguanides :
- A. Ils augmentent la production hépatique du glucose (néoglucogénèse).
 - ☒ B. Principal effet secondaire : troubles digestifs.
 - ☒ C. Ils améliorent la sensibilité à l'insuline.
 - D. Ils sont autorisés en cas d'insuffisance hépatique sévère.
 - ☒ E. Ils ne sont pas autorisés en cas d'insuffisance rénale terminale.
- ✓✓ 23- Veuillez cocher les assertions justes concernant les inhibiteurs des alpha-glucosidase :
- ☒ A. Principal effet secondaire : les troubles digestifs.
 - ☒ B. Ils sont contre indiqués en cas de maladie inflammatoire de l'intestin.
 - ☒ C. Principal effet secondaire : l'acidose lactique.
 - ☒ D. Ils stimulent la sécrétion de l'insuline.
 - E. Ils sont autorisés en cas de grossesse.
- ✓✓ 24- Veuillez cocher les propositions justes concernant le traitement du Diabète de type 2 ? quelles sont les classes thérapeutiques qu'on utilise dans ce cas ?
- A. Les diurétiques
 - B. Les bêtabloquants.
 - ☒ C. Les sulfamides.
 - ☒ D. Les incrélines
 - ☒ E. Les SGLT2.
- ✓✓ 25- Une hépatite peut se manifester cliniquement par :
- ☒ A. Une fièvre
 - B. Des troubles de la conscience
 - ☒ C. Un ictère cutanéomuqueux
 - ☒ D. Elle peut être asymptomatique, de découverte fortuite
 - E. Une protéinurie
- ✓✓ 26- Concernant l'hépatite médicamenteuse :
- ☒ A. Le diagnostic est suspecté si le médicament est connu pour être hépatotoxique
 - ☒ B. Si les autres causes des hépatites sont exclues
 - ☒ C. Les centres de pharmacovigilance doivent être contactés
 - ☒ D. L'atteinte hépatique se résorbe après l'arrêt de la prise du médicament
 - ☒ E. Toutes les réponses sont justes

ResiPharmaTM

✓✓27-Parmi les complications des hépatites on note :

- ☐ A. Cirrhose du foie
- ☒ B. Le carcinome hépatocellulaire
- ☐ C. Pancréatite aigue
- ☐ D. Thromboses veineuses
- ☐ E. Insuffisance rénale

✓✓28-Toutes ces affections sont causes des céphalées aigues sauf une

- ☐ A. Hémorragie méningée
- ☐ B. Accident vasculaire cérébral
- ☐ C. Dissection d'une artère cervicale
- ☒ D. Arthrose cervicale
- ☐ E. Sinusite aiguë

✓✓29-Parmi les propositions suivantes quelles sont celles qui évoquent une céphalée grave :

- ☐ A. Céphalées unilatérales pulsatiles
- ☒ B. Céphalées accompagnées de fièvre
- ☒ C. Céphalées avec syndrome méningé
- ☒ D. Céphalées chez un patient sous anticoagulants
- ☒ E. Céphalées au cours d'une grossesse

✓✓30. Quel est le rôle de la biométrie dans un essai clinique ?

- a. Administrer les médicaments aux patients
- ☒ b. Concevoir l'étude, analyser les données et interpréter les résultats
- c. Fabriquer les médicaments
- ☒ d. Recruter les patients pour l'étude
- e. Évaluer la couleur des médicaments

✓✓31. Les caractéristiques de la biométrie doivent être :

- ☒ a. universelle
- ☒ b. unique
- c. multiples
- ☒ d. invariables
- e. non mesurables

✓✓32- Les intérêts de la biométrie :

- a. Le non reconnaissance de l'individu
- ☒ b. La protection des consommateurs contre la fraude ou le vol
- c. La faible sécurité
- d. Elle ne remplace pas les mots de passe
- ☒ e. Elle contribue à l'accélération des services

ResiPharmaTM

Corrigé Type

3 question(s) retirée(s) - Barème par question : 0,62500000 (au lieu de 0,57)

N°	Rép./Alternatives 1&2		
1	BC		
2	BE		
3	AD		
4	B		
5	B		
6	B		
7	BE		
8	C		
9	C		
10	ADE		
11	CDE		
12	ABE		
13	D		
14	D		
15	E		
16	ACDE		
17	ABDE		
18	BCDE		
19	A		
20	ABC		
21	ABDE		
22	ABCE		
23	AB		
24	CDE		
25	ACD		
26	E	ABCD	
27	AB		
28	D		
29	BCDE		
30	B		
31	ABD		
32	BE		
33	X		
34	X		
35	X		

