

Examen de séméiologie 2020-2021 - Sétif

1- Au cours de diabète type 2 ?

- A- L'auto surveillance glycémique est indispensable.
- B- Le poids est un élément de surveillance capital.
- C- Les sulfamides hypoglycémisants sont contre indiqués en cas d'insuffisance respiratoire.
- D- Les biguanides agissent en faisant sécréter de l'insuline.

2- Concernant la contraception :

- A- Elle empêche la fécondation de façon réversible et temporaire.
- B- Elle empêche la fécondation de façon définitive.
- C- L'efficacité des différentes méthodes contraceptives est évaluée par l'indice de Pearl.
- D- Toutes les méthodes agissent en bloquant l'ovulation.

3- Au cours de la contraception :

- A- La pilule oestroprogestative agit en inhibant les gonadotrophines hypophysaires.
- B- La pilule macro progestative agit en bloquant l'ovulation.
- C- La pilule d'urgence est utilisée le plutôt possible, en continue jusqu'à la survenue des menstruations.
- D- Le dispositif intra utérin a une action anti-nidatoire.

4- Dans la prise en charge thérapeutique de l'HTA :

- A- Les β -bloqueurs sont contre indiqués chez la femme enceinte.
- B- Les diurétiques thiazidiques sont indiqués en première intention chez le diabétique de type 2.
- C- Les β -bloqueurs du système rénine sont contre indiqués à partir d'une clairance de créatinine à 20 ml/m.
- D- L'objectif thérapeutique chez le sujet âgé est de 150/90 mm Hg.

5- Les éléments en faveur d'une hypoglycémie organique sont :

- A- La survenue de l'hypoglycémie à jeun ou à l'effort.
- B- La survenue de l'hypoglycémie après le repas.
- C- La réponse favorable au résucrage.
- D- La non réponse au résucrage.

6- La polyarthrite :

- A- Est un symptôme.
- B- Peut-être secondaire à une maladie de système.
- C- Est une maladie dégénérative.
- D- Elle se manifeste par une douleur inflammatoire avec une importance fonctionnelle.

7- L'arthrose :

- A- Est une maladie dégénérative des membranes synoviales.
- B- L'atteinte primitive est cartilagineuse.
- C- Elle est fréquente chez les sujets jeunes.
- D- Elle se manifeste par un gonflement de l'articulation avec des signes inflammatoires locaux.

8- Le diagnostic du diabète sucré est posé sur la base :

- A- D'un syndrome polyuro-polydipsique.
- B- D'une glycosurie à la bandelette.

- C- Une glycémie casuelle 2 g/L.
- D- D'une glycémie capillaire sup à 1.26 g/L.

9- Quel est ou quels sont les caractéristiques de l'obésité androïde :

- A- Poids sup à 70Kg.
- B- Dépôt de tissus graisseux au niveau du tronc et abdomen.
- C- BMI sup à 30Kg/m².
- D- Est fréquente chez la femme.

10- L'automesure de la pression artérielle en ambulatoire (AMPA) est indiqués en cas de :

- A- Suspicion d'une HTA blouse blanche.
- B- Suspicion d'une HTA masquée.
- C- Fibrillation atriale.
- D- Sujet âgé.

11- Au cours d'une diarrhée aiguë :

- A- Le syndrome dysentérique secondaire à une entérotoxine.
- B- peut-être secondaire à la prise d'AINS.
- C- Les ténesmes sont faux besoins associé à des douleurs ombilicales.
- D- Les épreintes sont des faux besoins associé à des douleurs sphinctériennes.

12- Au cours du diabète de type 2 :

- A- La surcharge pondérale est à l'origine de l'insulinorésistance.
- B- La mise en route du traitement doit commencer par les sulfamides hypoglycémiants.
- C- L'insulinorésistance est souvent augmentée en valeur absolue.
- D- L'obésité est la conséquence di diabète.

13- La mesure continue du glucose est :

- A- Réservée aux patients sous pompe à insuline.
- B- Indiquée en cas d'hypoglycémies non ressenties.
- C- Mesure le glucose en intracellulaire.
- D- Est indiquée à tous les stades de la maladie.

14- L'altération de l'état général est :

- A- Un signe physique.
- B- Un signe fonctionnel.
- C- Un syndrome clinique qui associé une raideur de la nuque, céphalée et vomissement.
- D- Un syndrome qui associé une asthénie, amaigrissement, anorexie.

15- Concernant les hématuries macroscopiques quelle(s) affirmation(s) est (sont) exacte(s) :

- A- Est la présence de sang dans les urines.
- B- Elle nécessite une confirmation par une bandelette urinaire.
- C- Peut-être secondaire à une infection urinaire.
- D- Elle ne nécessite que rarement une imagerie.

16- Les signes de lutte respiratoire sont :

- A- Une diminution de la saturation en oxygène.
- B- Un tirage sus claviculaire.
- C- Une tachycardie.
- D- Un balancement thoraco-abdominal.

17- A la recherche d'une hépatomégalie :

- A- Le patient est installé en décubitus latéral gauche.
- B- Patient en décubitus dorsal genoux fléchis.
- C- La palpation recherche le bord sup de foie.
- D- La percussion recherche le bord inf du foie.

18- La bandelette urinaire :

- A- Est un examen para clinique réalisé au laboratoire.
- B- Est réalisé au lit de la maladie.
- C- Met en évidence une hématurie microscopique ou macroscopique.
- D- Est toujours pathologique en cas d'infection urinaire.

19- A l'interrogatoire :

- A- Une otorragie est un écoulement de sang par le nez.
- B- Une odynophagie est un gêne à la déglutition.
- C- Une otorragie est un écoulement de pus par le nez.
- D- L'hémoptysie est un saignement expectoré.

20- La toux ne peut être à l'origine :

- A- Syncope.
- B- Pneumothorax.
- C- Incontinence urinaire.
- D- Paralysie récurrentielle.

1	B	11	B
2	AC	12	AC
3	D	13	BD
4	D	14	D
5	BC	15	AC
6	BD	16	BD
7	B	17	B
8	C	18	BC
9	B	19	D
10	ABD	20	D